

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Распространенные лекарства, применяемые при трансплантации стволовых клеток у детей

В этом материале приводится перечень лекарств, которые часто применяются до, во время или после процедуры трансплантации стволовых клеток у детей. Ваш медицинский сотрудник обсудит с вами лекарства, которые вы принимаете, в том числе их наименования и то, чем обусловлена необходимость их приема. В этом материале слово «вы» относится к вам или вашему ребенку.

Пищевые добавки

- Фолиевая кислота: витамин, необходимый организму для выработки нормальных клеток крови.
- Хлорид калия / фосфат калия: калиевая добавка. Для надлежащей работы мышц (включая сердце) вашему организму необходим калий.

- Оксид магния / магниевая соль: магниевые добавки. Для надлежащей работы сердца вам необходим магний.
- Поливитамин: витаминная добавка, которая может содержать железо.
- Витамин К: витамин, необходимый организму для обеспечения свертываемости крови.

Предотвращение реакции «трансплантат против хозяина»

Эти лекарства используются для профилактики или лечения реакции «трансплантат против хозяина» (graft-versus-host disease, GVHD). Сюда входят:

- mycophenolate mofetil (CellCept®);
- cyclosporine (Neoral®);
- tacrolimus (Prograf®);
- sirolimus (Rapamune®);
- methotrexate (в небольших дозах).

Противовирусные препараты

Эти препараты применяются для предотвращения или лечения вирусных инфекций (например, ветряной оспы и опоясывающего лишая). Другие вирусные инфекции,

которые иногда наблюдаются при трансплантации, включают цитомегаловирус (cytomegalovirus, CMV), вирус герпеса человека (human herpes virus, HHV6), аденовирус и ВК-вирус. Сюда входят:

- acyclovir (Zovirax®);
- foscarnet (Foscavir®);
- ganciclovir (Cytovene®);
- cidofovir (Vistide®);
- letermovir (Prevymis®);
- valganciclovir (Valcyte®).

Противогрибковые препараты

Эти лекарства применяются для предотвращения или лечения грибковых инфекций. Сюда входят:

- fluconazole (Diflucan®);
- amphotericin (AmBisome®);
- voriconazole (Vfend®);
- micafungin (Mycamine®);
- posaconazole (Noxafil®);
- isavuconazonium (Cresemba®).

Препараты от тошноты

Эти препараты используются для предотвращения или лечения тошноты (ощущение приближающейся рвоты) и рвоты. Сюда входят:

- ondansetron (Zofran®);
- hydroxyzine (Vistaril®);
- metoclopramide (Reglan®);
- granisetron (Kytril®);
- lorazepam (Ativan®);
- dronabinol (Marinol®);
- fosaprepitant (Emend®);
- diphenhydramine (Benadryl®).

Антациды

Эти лекарства применяются для уменьшения выработки желудочного сока. Сюда входят:

- pantoprazole (Protonix®);
- lansoprazole (Prevacid®);
- ranitidine (Zantac®).
- omeprazole (Prilosec®);
- esomeprazole magnesium (Nexium®).

Обезболивающие лекарства

Эти лекарства используются для снятия боли и дискомфорта. Вы можете принимать их перорально (через рот), внутривенно (через вену) или трансдермально (с помощью кожных пластырей). Вы также можете получать обезболивающие препараты через специальную помпу, которая называется аппаратом для анальгезии, управляемой пациентом (patient-controlled analgesia, PCA). PCA позволяет вам безопасно ввести себе контролируруемую дозу лекарства. Примерами обезболивающих препаратов являются:

- Опиоиды, такие как morphine (DepoDur[®], Duramorph, MS Contin[®]), Hydromorphone (Dilaudid[®]) или fentanyl (Duragesic[®], Subsys[®])
- Нестероидные противовоспалительные препараты, такие как Acetaminophen (Tylenol[®])

Гормоны (для пациентов женского пола)

Эти лекарства применяются для предотвращения вагинального кровотечения при очень низком количестве тромбоцитов. Сюда входят:

- norgestrel (Ovral[®]);
- norgestrel и ethinyl estradiol (Lo-Ovral[®]);

- medroxyprogesterone acetate (Provera®);
- leuprolide (Lupron®);
- medroxyprogesterone acetate (Depo-Provera®).

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Commonly Used Medicine During Pediatric Stem Cell Transplants -
Last updated on November 27, 2024

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering
Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center