



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

О пластыре Flector®

Эта информация описывает пластырь Flector, в том числе способ его применения, рекомендации по использованию и побочные эффекты, на которые следует обратить внимание.

О пластыре Flector

Пластырь Flector (пластырь местного действия с diclofenac epolamine) — это обезболивающее лекарство. Он помогает снять боль и воспаление (отек) на небольшом участке тела, например при растяжении, напряжении, ушибе или артрите. Он содержит нестероидное противовоспалительное лекарство (nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID)).

Пластырь Flector наклеивается на кожу. Это значит, что NSAID всасывается через кожу, и лекарство попадает прямо в ту область, где возникла боль. В другие области лекарство не попадает в таком же количестве.

Перед наклеиванием пластыря Flector

- Убедитесь в том, что кожа чистая. Смойте грязь, лосьон или увлажняющее средство на том участке, куда вы будете наклеивать пластырь Flector. Они могут воспрепятствовать правильному прикреплению пластыря к коже.
- Если участок, на который вы будете наклеивать пластырь Flector, необходимо промыть, используйте мягкое мыло, ополосните участок водой и промокните его насухо.
- Если на участке, где вы будете наклеивать пластырь Flector, растут волосы, состригите их ножницами. Не брейте этот участок.

Как наклеить пластырь Flector

- Не используйте пластырь Flector на поврежденной коже, например там, где есть ожог, рана, заражение инфекцией, сыпь или экзема.
- Не используйте пластырь Flector на коже в области, подвергнутой облучению.

Чтобы приклеить пластырь Flector:

1. снимите с пластыря прозрачную пленку;
2. наложите пластырь на то место, где боль ощущается сильнее всего;
3. плотно прижмите пластырь рукой и удерживайте примерно 20–30 секунд, чтобы он полностью приклеился к коже;
4. вымойте руки.

Каждая упаковка содержит несколько пластырей Flector. Открыв упаковку, обязательно снова запечатайте ее. Это предотвратит высыхание оставшихся пластырей.

Храните пластыри при комнатной температуре. Не кладите их в холодильник и не подвергайте воздействию тепла.

После наклеивания пластыря Flector

- Следите за тем, чтобы пластырь был всегда сухим. Не принимайте душ или ванну с наклеенным пластырем.
- Не прикладывайте поверх пластыря теплый или холодный компресс.
- Не допускайте контакта пластыря с глазами. Если это произошло, сразу же промойте глаз водой и позвоните своему врачу.
- Если пластырь начал отклеиваться, закрепите его края клейкой лентой.

Используйте только то количество пластырей, которое назначил врач.

Как снять пластырь Flector

1. Отклейте пластырь от кожи.
2. Согните пластырь клейкой стороной внутрь.
3. Выбросьте пластырь в мусор, где его не достанут дети или домашние животные.
4. Вымойте руки.

Побочные эффекты использования пластыря Flector

Если у вас возникнут какие-либо из перечисленных ниже симптомов, сразу же снимите пластырь и промойте это место водой.

- Сыпь или кожная реакция возле места применения пластыря
- Головокружение
- Отек рук или ног
- Прибавка в весе
- Головная боль
- Повышение артериального давления
- Проблемы с почками, печенью или сердцем, которые усугубляются

Меры предосторожности

- Не используйте это средство, если ранее у вас были случаи возникновения сыпи, зуда, астмы или другой аллергической реакции после приема aspirin или других NSAID.
- Не принимайте пероральные NSAID, пока у вас наклеен пластырь, если на это нет специальных указаний врача. Примеры NSAID:
 - Ibuprofen (Advil[®], Motrin[®]);
 - Meloxicam (Mobic[®])
 - Celecoxib (Celebrex[®])

- Naproxen (Aleve[®], Naprosyn[®]);
- Diclofenac (Voltaren[®]).
- Сообщите своему врачу, если вы принимаете другие лекарства, например:
 - ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (ACE inhibitors) для контроля артериального давления;
 - стероиды;
 - aspirin;
 - диуретики (мочегонные таблетки);
 - литий;
 - метотрексат;
 - лекарства, разжижающие кровь (антикоагулянты);
 - обезболивающие лекарства.

Когда следует обращаться к своему медицинскому сотруднику

Позвоните своему медицинскому сотруднику, если у вас:

- возник любой из симптомов, перечисленных в разделе «Побочные эффекты»;
- меняется количество или цвет мочи;
- возник новый или необычный симптом;
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

Позвоните по номеру 911 или немедленно обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи, если у вас появилась боль в груди или проблемы с дыханием.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

About Flector® Patch - Last updated on April 29, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center