



Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

Как закупоривать нефроуретростомический катетер

Эта информация позволит вам узнать о том, как выполнить пробное закупоривание нефроуретростомического катетера.

Информация о пробном закупоривании

Ваш врач может порекомендовать вам выполнить пробное закупоривание нефроуретростомического катетера. Это позволяет убедиться в том, что путь от почек до мочевого пузыря открыт.

Закупоривание катетера способствует прохождению мочи по катетеру в мочевой пузырь.

Пока вы находитесь в больнице, ваш катетер может закупоривать медсестра/медбрат, но после выписки вам придется делать это самостоятельно.

Перед тем как вы закупорите катетер, моча должна стать прозрачно-желтой. В ней не должно быть крови. Если ваша моча не прозрачного желтого цвета, позвоните своему медицинскому сотруднику.

Как закупоривать нефроуретростомический катетер

1. Подготовьте все необходимое. Вам потребуется:

- спиртовая салфетка;

- колпачок безыгольного соединителя.

2. Отсоедините дренажную трубку от дренажного катетера (см. рисунок 1).




Рисунок 1. Отсоединение дренажной трубки от дренажного катетера.

3. Очистите конец дренажного катетера спиртовой салфеткой (см. рисунок 2).




Рисунок 2. Очистка конца дренажного катетера

4. Подсоедините безыгольный соединитель к концу катетера (см. рисунок 3).




Рисунок 3. Подсоединение безыгольного соединителя

При закупоренном катетере

Если вы закупорили нефроуретростомический катетер, вам необходимо следить за такими симптомами:

- температура 100,4 °F (38 °C) или выше;
- подтекание в месте установки катетера;
- боль над тазобедренным суставом или в пояснице;
- озноб.

Эти симптомы могут возникнуть в любое время после закупоривания катетера. Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, позвоните в отделение интервенционной радиологии (Interventional Radiology), а затем откупорьте катетер. Для этого снимите колпачок безыгольного соединителя с катетера и подсоедините катетер к новому дренажному мешку. Симптомы должны исчезнуть в течение 30–45 минут. Если это не произошло, позвоните в отделение интервенционной радиологии (Interventional Radiology).

Не закрывайте катетер вновь, не позвонив в отделение интервенционной радиологии.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Cap Your Nephroureterostomy Catheter - Last updated on March 10, 2021
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center