



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Как закупоривать нефроуретростомический катетер

Эта информация позволит вам узнать о том, как
выполнить пробное закупоривание
нефроуретростомического катетера.

Информация о пробном закупоривании

Ваш врач может порекомендовать вам выполнить
пробное закупоривание нефроуретростомического
катетера (см. рисунок 1). Это позволяет убедиться в
том, что путь от почек до мочевого пузыря открыт.




Рисунок 1.
Нефроуретростомический
катетер

Закупоривание катетера способствует прохождению мочи по катетеру в мочевой пузырь.

Медсестра/медбрат может закупорить ваш катетер, пока вы находитесь в больнице. Когда вы будете дома, вам придется делать это самостоятельно.

Перед проведением закупоривания убедитесь, что ваша моча прозрачного желтого цвета. В ней не должно быть крови. Если ваша моча не прозрачного желтого цвета, позвоните вашему медицинскому сотруднику.

Как закупорить катетер

1. Подготовьте все необходимое. Вам потребуется:

- спиртовая салфетка;
 - безыгольный соединитель.
2. Отсоедините дренажную трубку от нефроуретростомического катетера (см. рисунок 2).



Рисунок 2. Отсоединение дренажной трубки от катетера

3. Протрите конец нефроуретростомического катетера спиртовой салфеткой в течение 15 секунд (см. рисунок 3).




Рисунок 3. Очистка конца катетера

4. Подсоедините безыгольный соединитель к концу нефроуретростомического катетера (см. рисунок 4).




Рисунок 4. Подсоединение безыгольного соединителя к катетеру

Не забывайте менять безыгольный соединитель каждые 7 дней или при его загрязнении.

При закупоренном катетере

Если вы закупорили нефроуретростомический катетер, вам необходимо следить за такими симптомами:

- подтекание в месте установки катетера;
- температура 100,4 °F (38 °C) и выше или озноб;
- боль, зачастую над тазобедренным суставом, в пояснице или в месте установки катетера;
- невозможность помочиться в течение 8 часов после закупоривания катетера.

Эти симптомы могут возникать в любое время после закупоривания катетера. Если у вас появился какой-либо из этих симптомов, позвоните и сообщите об этом в отделение интервенционной радиологии

(Interventional Radiology). Затем откупорьте катетер. Для этого отсоедините безыгольный соединитель от катетера. Протрите катетер спиртовой салфеткой, продолжая делать это в течение 15 секунд, и подсоедините его к новому дренажному мешку. Симптомы должны исчезнуть в течение 30–45 минут. Если это не произошло, позвоните в отделение интервенционной радиологии для получения дальнейших инструкций.

Не закупоривайте катетер вновь, не позвонив сначала в отделение интервенционной радиологии.

Контактная информация

Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения, позвоните вашему врачу отделения интервенционной радиологии. Вы можете связаться с врачом с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. После 17:00, а также в выходные или праздничные дни звоните по номеру 212-639-2000. Позовите к телефону дежурного специалиста отделения интервенционной радиологии.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

How to Cap Your Nephroureterostomy Catheter - Last updated on February 9, 2023

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center