



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Acetaminophen

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

8 Hour Pain Reliever [OTC]; 8 HR Arthritis Pain Relief [OTC]; Acetaminophen 8 Hour [OTC]; Aminofen [OTC]; Apra [OTC]; Arthritis Pain Relief [OTC] [DSC]; Aurophen Childrens [OTC] [DSC]; BetaTemp Childrens [OTC]; Childrens Acetaminophen [OTC] [DSC]; Childrens APAP [OTC]; Childrens Non-Aspirin [OTC]; Childrens Silapap [OTC] [DSC]; CuraNOL [OTC]; Ed-APAP [OTC]; ElixSure Fever/Pain [OTC] [DSC]; FeverAll Adults [OTC] [DSC]; FeverAll Childrens [OTC]; FeverAll Infants [OTC]; FeverAll Junior Strength [OTC]; FT 8 Hour Pain Relief [OTC]; FT Arthritis Pain Reliever [OTC] [DSC]; FT Children's Pain/Fever [OTC]; FT Pain & Fever Childrens [OTC]; FT Pain & Fever Infants [OTC]; FT Pain Relief Adult Extra St [OTC];

FT Pain Relief Extra Strength [OTC]; FT Pain Relief [OTC]; FT Pain Reliever Adults [OTC]; FT Pain Reliever Children [OTC]; FT Pain Reliever Ex Str Adult [OTC]; FT Rapid Release Pain Relief [OTC]; GoodSense Pain & Fever Child [OTC]; GoodSense Pain & Fever Infants [OTC]; GoodSense Pain Relief Extra St [OTC]; Healthy Mama Shake That Ache [OTC]; Liquid Pain Relief [OTC]; M-PAP [OTC]; Mapap Acetaminophen Extra Str [OTC]; Mapap Arthritis Pain [OTC] [DSC]; Mapap Childrens [OTC]; Mapap [OTC]; Max Relief Jr Child Pain/Fever [OTC]; Max Relief Junior [OTC]; Non-Aspirin Extra Strength [OTC]; Non-Aspirin [OTC]; Ofirmev [DSC]; Pain & Fever Childrens [OTC]; Pain and Fever Relief Kids [OTC]; Pain Relief Childrens [OTC]; Pain Relief Extra Strength [OTC]; Pain Relief Regular Strength [OTC]; Pain Relief [OTC]; Panadol Childrens [OTC]; Panadol Extra Strength [OTC]; Panadol Infants [OTC]; Pharbetol Extra Strength [OTC]; Pharbetol [OTC]; Triaminic Fever Reducer [OTC]; Tylenol 8 Hour Arthritis Pain [OTC]; Tylenol 8 Hour [OTC]; Tylenol Childrens Chewables [OTC]; Tylenol Childrens Pain + Fever [OTC]; Tylenol Childrens [OTC]; Tylenol Dissolve Packs [OTC]; Tylenol Extra Strength [OTC]; Tylenol for Children + Adults [OTC]; Tylenol Infants Pain+Fever [OTC]; Tylenol [OTC]

Предупреждение

- При использовании ацетаминофена возникали проблемы с печенью. В некоторых случаях эти нарушения требовали трансплантации печени или приводили к смертельному исходу. В большинстве случаев проблемы с печенью возникали у людей, принимающих слишком большую дозу ацетаминофена в день. Также люди часто принимали более 1 препарата, содержащего ацетаминофен. Со всеми вопросами обращайтесь к вашему врачу.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для облегчения боли и понижения высокой температуры.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас заболевание печени.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Не рекомендуется применять другие лекарственные средства, содержащие ацетаминофен. Внимательно изучайте инструкции к лекарственным средствам. Прием ацетаминофена в чрезмерных количествах может приводить к нарушениям со стороны печени.

- Строго следуйте инструкциям. Не принимайте больше ацетаминофена в день, чем указано. Если вы не знаете, сколько ацетаминофена вы можете принимать в день, обратитесь к врачу или фармацевту. Немедленно обратитесь к врачу, если вы приняли слишком большую дозу ацетаминофена в течение дня, даже если вы чувствуете себя хорошо.
- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам и сотрудникам лабораторий о том, что Вы принимаете этот препарат.
- Если у Вас фенилкетонурия, проконсультируйтесь с врачом. В некоторых продуктах содержится фенилаланин.
- Дозы данного препарата, показанные для применения у детей, могут быть различными в зависимости от торговой марки. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо

будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь; крапивница; зуд; покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно, в сочетании с высокой температурой; свистящее или хрипящее дыхание; стеснение в груди или горле; затрудненное дыхание, глотание или речь; необычная хриплость; отечность в области рта, лица, губ, языка или горла. В редких случаях некоторые аллергические реакции носили угрожающий жизни характер.
- Признаки нарушений со стороны печени, такие как потемнение мочи, утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе, посветление кала, рвота, пожелтение кожи или глаз.

- Затруднение при мочеиспускании или изменение количества выделяемой мочи.
- Возможна тяжелая реакция со стороны кожного покрова (синдром Стивенса-Джонсона/токсический эпидермальный некролизис). Это может привести к тяжелым нарушениям здоровья, которые могут носить стойкий характер, и иногда к смерти. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении таких симптомов, как покраснение, отечность кожи с появлением волдырей или шелушения (на фоне или без высокой температуры), покраснение или раздражение глаз, изъязвления в полости рта, горле, носу или глазах.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Тошнота или рвота.
- Нарушения сна.
- Головная боль.

- Запор.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте

<https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все пероральные препараты:

- Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема пищи.

Жевательные таблетки:

- Перед проглатыванием тщательно разжуйте.

Таблетка для рассасывания:

- Положите на язык и дайте раствориться.

Таблетки пролонгированного действия:

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не раздробляйте.
- Принимайте данный препарат с полным стаканом воды.

Все жидкие препараты:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.

Жидкость (суспензия):

- Хорошо взболтайте перед применением.

Суппозитории:

- Примените свечку в прямую кишку.
- Мойте руки до и после применения.
- Если свечка мягкая, охладите ее в холодильнике или

подержите под холодной водой.

- Перед использованием свечи снимите обертку из фольги.
- Смочите свечу перед тем, как поместить ее в прямую кишку.
- Аккуратно надавливая, введите свечу заостренным концом вперед в прямую кишку. Не держите в руках слишком долго.

Инъекция:

- Для внутривенных инфузий.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Препараты для приема внутрь и свечи:

- Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Инъекция:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все пероральные препараты:

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.
- Храните в оригинальной упаковке для защиты от света.
- Держите крышку плотно закрытой.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

Суппозитории:

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Не замораживайте.
- Некоторые препараты можно хранить в холодильнике. Проконсультируйтесь с фармацевтом или прочитайте этикетку на упаковке.

Инъекция:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у

Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой,

фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения,

лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра
2025-11-18

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Acetaminophen - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center