Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Albuterol

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

ProAir Digihaler; ProAir HFA [DSC]; ProAir RespiClick; Proventil HFA; Ventolin HFA

Торговые наименования: Канада

Airomir; APO-Salbutamol HFA; DOM-Salbutamol; PMS-Salbutamol; TEVA-Salbutamol; TEVA-Salbutamol HFA; Ventolin; Ventolin Diskus; Ventolin HFA; Ventolin PF [DSC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для раскрытия дыхательных путей при заболеваниях легких, при которых спазмы

могут препятствовать дыханию.

- Используется для предотвращения нарушений дыхания, которые возникают при физической нагрузке.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?
Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если Вы принимаете другой препарат, похожий на этот. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Все сухие порошковые ингаляторы:

- Если у вас аллергия на молоко.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о

своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Не применяйте данный препарат в большей дозе или дольше назначенного врачом времени. Прием данного препарата в очень больших дозах приводил к летальному исходу. Проконсультируйтесь с врачом.
- Немедленно свяжитесь с врачом, если ваша обычная доза препарата не оказала нужного воздействия либо если вам приходится применять данный препарат чаще обычного.
- Если у вас повышенный уровень сахара в крови

(диабет), необходимо регулярно проверять уровень сахар в крови.

- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта,

лица, губ, языка или горла.

- Признаки повышенного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение зрения.
- Признаки пониженного содержания калия, такие как боли или слабость в мышцах, мышечные судороги либо ощущение нарушенного сердцебиения.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Данный препарат иногда может вызывать тяжелые нарушения дыхания. Это может быть опасным для жизни. При применении препарата в ингаляторе или в виде жидкости для ингаляций эти нарушения возникают, как правило, сразу же после применения препарата или при первом использовании нового картриджа или флакона. При появлении или усугублении нарушений дыхания или возникновении свистящего дыхания или кашля немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Все сухие порошковые ингаляторы:

- Боль при мочеиспускании.

- Непроходимость мочевыводящих путей.

Все пероральные препараты:

- Симптомы тяжелой кожной реакции (синдрома Стивенса — Джонсона, или многоформной эритемы), такие как покраснение, отек, появление пузырей или отслоение кожи (с повышением температуры тела или без него); кожная реакция с появлением кольцевидных высыпаний; покраснение или раздражение глаз; язвы в полости рта, глотке, носу или глазах.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Все формы выпуска:

- Нервное напряжение и возбужденность.
- Головокружение или головная боль.
- Тошнота или рвота.
- Тремор.

Все продукты для ингаляции:

- Першение в горле.
- Насморк.

Все сухие порошковые ингаляторы:

- Боли в спине.
- Слабые и сильные боли. В этом случаем может помочь болеутоляющее для несильных болей.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю

предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все ингаляционные препараты:

- Для ингаляции в легкие.
- Если вам назначены не 1, а несколько ингаляционных препаратов, уточните у врача, какой из них следует применять первым.
- Если вы принимаете данный препарат для предотвращения нарушения дыхания, вызванного физической нагрузкой, прием необходимо осуществлять за 15–30 минут до физической нагрузки.
- Точно следуйте инструкциям по очистке.
- После завершения приема дозы закройте колпачком.

Ингалятор (аэрозоль):

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Перед первым использованием ингалятор необходимо подготовить. Подготовка ингалятора также требуется в том случае, если он некоторое время не использовался. Вы должны точно знать, когда и как следует подготавливать ингалятор. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с

врачом или фармацевтом.

- Некоторые ингаляторы требуют подготовки, если их уронили. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Для облегчения пользования ингалятором он может применяться вместе со спейсером.
- Данный ингалятор может иметь счетчик доз, предназначенный для отслеживания оставшихся доз. При наличии такой функции выбросьте ингалятор, когда счетчик доз будет показывать 0.

Все сухие порошковые ингаляторы:

- Закрывайте устройство после каждого применения дозы. Не открывайте устройство до применения дозы.
- Не разбирайте устройство и не мойте его. Не использовать со спейсером. Не выдыхайте в аппарат.
- Очистите мундштук, протерев его сухой салфеткой или тканью. Не мойте водой и не погружайте в воду.
- В данном ингаляторе имеется счетчик доз, предназначенный для отслеживания оставшихся доз. Ингалятор следует выбросить, когда счетчик

доз будет показывать «0», через 13 месяцев после вскрытия пакета из фольги или после истечения срока годности, в зависимости от того, что наступит раньше.

Цифровой ингалятор сухого порошка:

- Этот ингалятор отслеживает информацию о дозах и может использоваться с приложением для смартфона. Этот ингалятор можно использовать без подключения к приложению для смартфона. Убедитесь, что вы знаете, как использовать этот ингалятор и приложение для смартфона. Придерживайтесь указаний врача. Подробная информация содержится в прилагаемой инструкции. Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

Раствор для ингаляций:

- Для ингаляции в легкие только в виде жидкости (раствора) с применением специального устройства (небулайзера).
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Не смешивайте другие лекарства в небулайзере.

Все пероральные препараты:

- Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема пищи.

Жидкость для полости рта:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Все ингаляционные препараты:

- Защищайте от холода.
- Если ингалятор находится в пакете из фольги, до применения его следует хранить в этом пакете из фольги.

Ингалятор (аэрозоль):

- Не подвергайте воздействию тепла и солнечного света. Не прокалывайте и не сжигайте, даже если он кажется пустым.
- После того как вы выполните максимальное количество распылений, выбросьте ингалятор, даже если вам кажется, что в емкости еще остался препарат.
- Храните вместе с загубником.

Все сухие порошковые ингаляторы:

- Берегите от жары.

Раствор для ингаляций:

- До использования храните неиспользованные контейнеры в саше из фольги.
- Проверьте длительность хранения флакона после вскрытия пакета.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для

пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю

понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2024-02-15

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you’re not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Albuterol - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center