Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Alprostadil

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Торговые наименования: США

Caverject; Caverject Impulse(2 Cartridge); Edex (2 Cartridge); Edex (6 Cartridge); Muse [DSC]; Prostin VR

### Торговые наименования: Канада

Caverject; Muse [DSC]; Prostin VR

### Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Препарат назначается для лечения эректильной дисфункции (ЭД).
- Некоторые препараты можно использовать в качестве вспомогательных средств для тестирования на предмет ЭД.

### Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом

**данного препарата?**

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если Вам было сказано, что Вы недостаточно здоровы для занятий сексом.
- Если у Вас деформирован пенис, установлен пениальный имплантат или существуют другие проблемы, связанные с половым органом.
- Если у Вас имеется любая из перечисленных проблем со здоровьем: полицитемия или тромбоцитемия.
- Если у Вас есть любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: лейкемия, множественная миелома, серповидноклеточная анемия или другие нарушения, повышающие риск болезненной эрекции, или эрекции, которая длится более 4 часов. Если Вы не уверены, спросите у своего врача.
- Если Вы женщина. Данный лекарственный препарат не одобрен для применения у женщин.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

**Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**
**Все формы выпуска:**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.

- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
- Этот препарат не защищает от инфекций, передающихся половым путем, таких как ВИЧ или гепатит. Для защиты от этих инфекций используйте латексный или полиуретановый презерватив.

**Уретральные суппозитории:**

- Если Ваша сексуальная партнерша в состоянии забеременеть, применяйте надежное противозачаточное средство для предотвращения беременности.
- Если Ваша половая партнерша беременна, используйте презерватив во время секса.
- Этот препарат не одобрен для применения у детей. Проконсультируйтесь с врачом.

**Инъекция:**

- Существует вероятность поломки иглы при проведении инъекции. Иглы ломались, а часть иглы оставалась в половом члене. Если игла поломалась, и Вы можете захватить сломанный конец, вытащите его и обратитесь к своему врачу. Если Вы не можете захватить сломанный конец, немедленно обратитесь к своему врачу.

- Данный лекарственный препарат содержит бензиловый спирт. У новорожденных и младенцев могут возникать серьезные побочные эффекты при приеме определенных доз бензилового спирта, в том числе при приеме с другими препаратами, содержащими бензиловый спирт. Данный лекарственный препарат не одобрен для применения у детей. Посоветуйтесь с врачом.

**О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Покраснение, наличие припухлостей, отек, болезненность или искривление полового члена во время эрекции.
- Раздражение в месте применения лекарственного препарата.
- Боль или давление в груди или учащенное сердцебиение.
- Головокружение или обморок.
- Сильная головная боль.
- Одышка.
- Любое необъяснимое образование кровоподтеков или кровотечение.
- Отечность вен на ногах.
- Немедленно свяжитесь с врачом, если у вас возникла болезненная эрекция, либо если эрекция длится более 4 часов. Это может произойти, даже если вы в это время не занимаетесь сексом. Если немедленно не принять меры, это может привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, и вы, возможно, не сможете заниматься сексом.

## Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты.

Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

**Уретральные суппозитории:**

- Боль в половом члене.
- Ощущение жара или жжения в уретре.
- Боль в половом члене, яичках, ногах или в области между половым членом и прямой кишкой.

**Инъекция:**

- Боль в половом члене.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте

https://www.fda.gov/medwatch.

**Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

**Уретральные суппозитории:**

- Этот препарат предназначен для применения в уретре (трубке, через которую проходит моча).
- Ваш лечащий врач научит вас тому, как правильно принимать этот препарат.
- Убедитесь, что Вы точно знаете, как применять данный препарат. Ознакомьтесь с инструкцией по применению, прилагаемой к препарату. Если инструкция по применению отсутствует или у Вас возникли вопросы о том, как использовать данный препарат, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Эффективность препарата повысится, если перед его применением Вы помочитесь.
- Мойте руки до и после применения.

**Инъекция:**

- Введите препарат в половой член сбоку, как предписано Вашим лечащим врачом или согласно инструкциям на листке-вкладыше в упаковке препарата.
- Мойте руки до и после применения.
- Не взбалтывайте.
- Перед каждой дозой следует устанавливать новую иглу.
- Не используйте изогнутую иглу. Не пытайтесь разогнуть согнутую иглу. Вероятность ее поломки повышается.
- После введения препарата слегка прижмите место инъекции, чтобы предупредить образование кровоподтека. Прижимайте место инъекции в течение 5 минут и до остановки кровотечения.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Каждый предварительно заполненный шприц или флакон предназначен исключительно для однократного применения. Всю оставшуюся порцию препарата после введения дозы следует выбросить.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных

острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Чередуйте стороны полового члена и вводите каждую дозу препарата в другой участок.

**Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

- Данный лекарственный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

**Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**
**Уретральные суппозитории:**

- Храните невскрытую упаковку из фольги в холодильнике.
- Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.
- Препарат следует хранить при комнатной температуре не дольше 2 недель после начала использования.

**Инъекция:**

- Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить в холодильнике. Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить при комнатной температуре. Если у Вас есть вопросы относительно хранения данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с фармацевтом.
- Некоторые препараты необходимо давать сразу после смешивания. Другие препараты можно хранить в течение некоторого времени после смешивания. Обязательно уточните, в течение какого времени препарат пригоден к использованию и как его хранить после смешивания. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

**Все формы выпуска:**

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных

препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в

токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования

лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

**Дата последнего пересмотра**
2026-06-01

**Авторское право**
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Alprostadil - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center