Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Apomorphine

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Apokyn; Kynmobi Titration Kit [DSC]; Kynmobi [DSC]; Onapgo

Торговые наименования: Канада

Kynmobi [DSC]; Movapo [DSC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения периодов «выключения» (когда препарат прекращает свое действие) у людей с болезнью Паркинсона.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас аллергия на сульфиты, проконсультируйтесь с врачом.
- Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: заболевание почек или заболевание печени.
- Если вы принимаете какой-либо из следующих препаратов: алосетрон, хлорпромазин, доласетрон, гранисетрон, галоперидол,

метоклопрамид, ондансетрон, палоносетрон, прохлорперазин или прометазин.

- Если Вы принимаете другие препараты, вызывающие у Вас сонливость. Существует много препаратов, которые могут оказывать такое воздействие. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Проходите анализы крови, контролируйте артериальное давление и частоту сердечных сокращений в соответствии с указаниями врача.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.

- Избегайте употребления алкоголя во время приема этого препарата.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением марихуаны, других форм каннабиса, рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Если вы принимаете нитроглицерин под язык при болях в груди, этот препарат может повысить риск снижения артериального давления. До и после приема нитроглицерина следует полежать. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.
- На фоне приема данного лекарственного препарата возникало опасное нарушение сердечного ритма (удлинение интервала QT на ЭКГ). У людей, принимающих данный препарат, в редких случаях также возникали боли в груди, инфаркт миокарда и внезапная смерть. Проконсультируйтесь с врачом.
- При приеме данного препарата повышается риск падений. Падения могут приводить к очень тяжелым нарушениям, таким как травма головы и переломы костей. Риск падений выше у лиц старшего возраста. Проконсультируйтесь с врачом.
- Лечение этим препаратом нельзя прекращать резко без согласования с врачом. У вас может быть повышенный риск тяжелых побочных эффектов, включая лихорадку, спутанность сознания или ригидность мышц. В случае необходимости прием данного лекарственного препарата нужно прекращать постепенно, в соответствии с предписаниями врача.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Картриджи и предварительно заполненные шприцы-ручки:

- Не делитесь шприцами-ручками или картриджами с другими лицами,

даже если была заменена игла. При обмене данными устройствами может происходить передача инфекций от одного человека другому. Это также касается инфекций, о наличии которых у себя Вы можете и не подозревать.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Гиперемия (румянец).
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.
- Сильное головокружение или обморок.
- Излишнее потоотделение.
- Спутанность сознания.
- Сильные желания, которые трудно контролировать (например, прием пищи, азартные игры, секс или трата денег).
- При появлении или усугублении проблем контролирования движений тела.

- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Изменение зрения.
- Некоторые люди засыпали во время управления автомобилем, приема пищи или беседой. Некоторые не ощущали сонливости и чувствовали себя бодро непосредственно перед тем, как заснуть. Эти случаи отмечались спустя 1 год после начала приема данного препарата. Если Вы засыпаете во время различных занятий, в день приема препарата откажитесь от вождения транспортных средств, а также прочих занятий или видов работ, требующих повышенного внимания. Если у Вас наблюдается повышенная сонливость, немедленно свяжитесь с врачом.
- Немедленно свяжитесь с врачом, если у вас возникла болезненная эрекция, либо если эрекция длится более 4 часов. Это может произойти, даже если вы в это время не занимаетесь сексом. Если немедленно не принять меры, это может привести к долгосрочным проблемам с эрекцией, и вы, возможно, не сможете заниматься сексом.
- Применение данного препарата сопровождалось возникновением тяжелого заболевания крови, известного как гемолитическая анемия. В некоторых случаях требовалась госпитализация. Если у вас появились спутанность сознания, сильное головокружение, утомляемость или слабость, немедленно свяжитесь с врачом. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появились боль в груди, учащенное сердцебиение, одышка, бледная кожа, темная моча, желтизна кожи или глаз, или высокая температура.

Все инъекционные продукты (кроме Онапго):

- Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или ургентные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части живота или в области таза.
- Такие признаки обезвоживания, как сухость кожи, слизистой оболочки ротовой полости или глаз, жажда, тахикардия, головокружение, учащенное дыхание или спутанность сознания.
- Синяки или темные пятна на коже.

Онапго:

- В месте введения препарата в организм может возникнуть раздражение и инфекция. Немедленно сообщите врачу, если у вас возникли покраснение, ощущение тепла, зуд, отек, твердая шишка, синяки, кровотечение, боль или любые другие необычные эффекты в месте введения этого препарата в организм.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Все формы выпуска:

- Тошнота или рвота.
- Насморк.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Головная боль.

Все инъекционные препараты:

- Раздражение в месте инъекции.

- Нарушения сна.

Все инъекционные продукты (кроме Онапго):

- Зевота.
- Боль в суставе.
- Боли в спине.
- Диарея или запор.
- Боль в руках или ногах.

Подъязычная пластинка:

- При применении этого лекарственного препарата часто возникает раздражение в области рта. Обратитесь к врачу, если у вас покраснение, отек или боль в области рта; язвы во рту; сухость рта, губ или языка; боль при глотании.
- Онемение или покалывание во рту.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все инъекционные продукты (кроме Онапго):

- Для подкожных инъекций.
- Данный препарат не предназначен для внутривенных инъекций. При введении данного препарата в вену отмечалось образование тромбов (в легких). Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Если Вы будете делать себе уколы, Ваш врач или медсестра научат Вас делать инъекции.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Мойте руки до и после применения.
- При каждой инъекции меняйте место укола.
- Не выполняйте инъекцию в участок кожи в радиусе 5 см (2 дюймов) от пупка.
- Не наносите на участки кожи с покраснением или раздражением.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Если с момента приема последней дозы прошло более 7 дней, проконсультируйтесь с врачом о том, как следует возобновить прием.

Онапго:

- Этот препарат вводят инфузионно в подкожную жировую прослойку непрерывно в течение определенного времени.
- Данный препарат вводят с помощью инфузионного насоса.
- Если вы будете делать инфузию самостоятельно, врач или медицинская сестра научат вас, как подготовить и сделать инфузию.

- Данный препарат не предназначен для внутривенных инъекций. При введении данного препарата в вену отмечалось образование тромбов (в легких). Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Мойте руки до и после применения.
- Изменяйте место введения этого препарата в соответствии с указаниями врача.
- Не выполняйте инъекцию в участок кожи в радиусе 5 см (2 дюймов) от пупка.
- Не вводите в участки кожи с покраснениями, раздражением, синяками, уплотнениями или шишками.
- Каждый картридж и держатель картриджа предназначены только для 1 использования. Выбросьте использованный картридж и держатель картриджа после введения дозы.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Подъязычная пластинка:

- Мойте руки до и после применения.
- Не прикасайтесь к препарату влажными руками.
- Не разрезайте и не разделяйте пленку. Не используйте поврежденную пленку.
- Пейте воду перед приемом этого препарата. Поместите пленку под язык и закройте рот. Дайте пленке раствориться. Не жуйте и не проглатывайте целиком. Не глотайте слюну и не говорите, пока пленка растворяется. Это может занять около 3 минут. Вы можете глотать

после того, как пленка растворится.

Все формы выпуска:

- Вместе с данным лекарственным препаратом могут назначаться другие препараты для предотвращения побочных эффектов.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Все инъекционные продукты (кроме Онапго):

- Данный лекарственный препарат следует принимать по мере необходимости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Онапго:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Подъязычная пластинка:

- Хранить в пакете из фольги до момента применения.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых

врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2026-01-16

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Apomorphine - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center