



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# BCG (Intravesical)

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

Tice BCG

## Торговые наименования: Канада

Oncotice; Verity-BCG

### Предупреждение

- БЦЖ в данном лекарственном препарате — это тип бактерий. Данный лекарственный препарат вводится в мочевой пузырь. БЦЖ может находиться в мочевыводящих путях в течение некоторого времени после введения препарата. В некоторых случаях применение данного лекарственного препарата сопровождалось развитием инфекций. В редких случаях они были опасными для жизни. Проконсультируйтесь с врачом.

### Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Используется для лечения или профилактики определенных видов рака мочевого пузыря.

# Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: примесь крови в моче, туберкулез (ТБ), инфекция мочевыводящих путей (ИМП), любая инфекция, заболевание, сопровождающееся высокой температурой, слабый иммунитет или заболевание, которое может угнетать иммунную систему, такое как ВИЧ.
- Если у Вас имеется или когда-либо наблюдалась реакция на БЦЖ.
- Если Вы получаете другое лечение, такое как лучевая или химиотерапия.
- При приеме антибиотиков необходимо проконсультироваться с врачом.
- Если Вы принимаете какой-либо из лекарственных препаратов, подавляющих функцию иммунной системы. Существует много лекарственных препаратов, которые могут оказывать такое воздействие. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Если у Вас отмечалось что-либо из перечисленного далее за последние 14 дней: биопсия, процедура, называемая трансуретральной резекцией (ТУР), или повреждение мочевыводящих путей после введения катетера.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со

здравьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- При индивидуальной аллергической реакции на латекс необходимо проконсультироваться с врачом.
- В течение первых 6 часов после получения этого лекарственного препарата необходима особая осторожность при мочеиспускании. Постоянно пользуйтесь одним и тем же туалетом дома. Для мочеиспускания садитесь на унитаз таким образом, чтобы избежать разбрызгивания мочи.
- Перед тем как смыть унитаз, добавьте к моче равное количество дезинфицирующего раствора. Подождите 15 минут, затем смойте унитаз. Это нужно делать в течение первых 6 часов после получения БЦЖ.
- Не следует избегать общения с близкими людьми, в том числе с проживающими совместно лицами, друзьями и лицами, осуществляющими за Вами уход. Однако не позволяйте никому прикасаться к Вашей моче.
- Возможно, Вам потребуется сдать анализ на туберкулез перед началом применения данного лекарственного препарата.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Вашему врачу или сотруднику лаборатории необходимо сообщить о том, что Вы применяете данный препарат.
- Применяйте надежное противозачаточное средство для

предотвращения беременности во время приема данного препарата.

- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

## О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки нарушений со стороны печени, такие как потемнение мочи, утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе, посветление кала, рвота, пожелтение кожи или глаз.
- Ухудшение боли или жжения при мочеиспускании или отсутствие исчезновения этих эффектов.
- Затруднение при мочеиспускании или изменение количества выделяемой мочи.
- Кровь в моче.
- Высокая температура с гриппоподобными признаками, которые делятся более 72 часов.
- Высокая температура — более 39,4 °C (103 °F).
- Повышенная температура тела выше 101,3 градуса F или 38,5 градусов C

дольше 48 часов.

- Боль в суставе.
- Кашель.
- Отек яичек.
- Боль в яичках.
- Чувство крайней усталости или слабости.

## Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Тошнота.
- У многих людей, применяющих этот лекарственный препарат, отмечается раздражение мочевого пузыря. В большинстве случаев раздражение мочевого пузыря начинается в течение 4–6 часов после приема этого препарата и может длиться 24–72 часа. Возможно более частое мочеиспускание или более частые позывы к немедленному мочеиспусканью. Обратитесь к врачу, если у вас возникло раздражение мочевого пузыря, которое беспокоит вас или не проходит в течение 72 часов.
- Часто отмечается чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспусканье, озноб, гриппоподобные симптомы, повышенная температура тела, утомляемость или слабость. Если какой-либо из этих признаков длится дольше 2 дней или ухудшается, обратитесь к врачу.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Препарат вводится через катетер в мочевой пузырь.
- Вам нужно будет постараться, чтобы данный препарат находился в Вашем мочевом пузыре до 2-х часов, но не дольше 2-х часов. Этот препарат выводится из организма с мочой.
- Пейте много жидкости, не содержащей кофеин, в течение нескольких часов после получения данного препарата за исключением случаев, когда в соответствии с указаниями Вашего врача Вам следует пить меньше жидкости. Это помогает вывести лекарственный препарат из мочевого пузыря.

## **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

## **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе,

лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

[https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.](https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms)

## Дата последнего пересмотра

2023-05-04

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.  
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

BCG (Intravesical - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center