



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Beclomethasone, Formoterol, and Glycopyrrolate

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Препарат используют для лечения астмы.
- Применяется для лечения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ).
- Не используйте этот препарат для лечения интенсивных обострений одышки. Используйте ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия). Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

**Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом
данного препарата?**

Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если Вы принимаете другой препарат, похожий на этот. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.
- Если Вы принимаете другие лекарственные препараты, называемые антихолинергическими препаратами, например ипратропий или оксibuтинин. Если Вы не уверены, являются ли препараты, которые Вы принимаете, антихолинергическими, проконсультируйтесь с врачом.
- Если вы принимаете дисульфирам или метронидазол. Некоторые формы выпуска могут содержать спирт.
- Если пациент ребенок. Не давайте данный препарат ребенку.

Ингалятор (порошок):

- Если у вас аллергия на молоко.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Для оптимального контроля и улучшения проблем с дыханием важно следить за тем, у вас всегда был запас этого препарата. Обязательно пополняйте запасы до того, как препарат закончится.
- Немедленно позвоните своему врачу, если проблемы с дыханием ухудшаются, если ваш ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия) слабо помогает или если вам

приходится чаще использовать ингалятор для быстрого купирования симптомов.

- Если у Вас повышенный уровень сахара в крови (сахарный диабет), этот препарат иногда может еще повысить уровень сахара в крови. Обсудите со своим врачом, как можно сохранить контроль над уровнем сахара в крови.
- Если Вы принимали данный препарат на протяжении нескольких недель, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как прекратить его прием. Возможно, что будет лучше постепенно прекратить прием этого лекарства.
- Не применяйте данный лекарственный препарат в большей дозе или дольше назначенного врачом времени. Применение лекарственного препарата этого типа в слишком больших дозах приводило к смерти. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- При попадании данного лекарственного препарата в глаза немедленно промойте глаза водой. При попадании данного лекарственного препарата в глаза, нечетком зрении, ухудшении течения глаукомы или боли в глазах немедленно обратитесь к врачу.
- При переходе с перорального стероида на другую

форму стероидов могут возникнуть очень серьезные, иногда смертельно опасные, побочные эффекты. Могут возникнуть такие симптомы, как слабость, ощущение сильной усталости, головокружение, тошнота, рвота, спутанность мышления, а также понижение уровня сахара в крови. При возникновении любого из этих симптомов немедленно свяжитесь с врачом. В случае серьезной травмы, хирургической операции или какой-либо инфекции Вам может понадобиться увеличение дозировки пероральных стероидов. Увеличение дозы стероидов поможет Вашему организму справиться с этими стрессами. Носите с собой карточку, в которой указано, что Вам в определенных случаях может понадобиться повышенная доза стероидов.

- Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вы контактировали с больным ветряной оспой или краснухой и при этом ранее не болели ветряной оспой и краснухой и не проходили вакцинацию от этих заболеваний.
- Люди, страдающие ХОЗЛ, имеют повышенный риск развития пневмонии. Данный лекарственный препарат может повысить риск развития пневмонии. Проконсультируйтесь с врачом.

- При длительном применении данный лекарственный препарат может вызвать ломкость костей (остеопороз). Если у вас увеличен риск повышенной ломкости костей или есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Пройдите обследование плотности костей согласно указаниям врача. Проконсультируйтесь с врачом.
- При длительном применении возрастает вероятность развития катаракты или глаукомы. Проконсультируйтесь с врачом.
- При длительном приеме препарата регулярно проверяйте глазное давление. Проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас

присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки пониженного содержания калия, такие как боли или слабость в мышцах, мышечные судороги либо ощущение нарушенного сердцебиения.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Признаки нарушения функции надпочечников, например сильная тошнота или рвота, сильное головокружение или потеря сознания, мышечная слабость, чувство сильной утомляемости, изменения настроения, снижение аппетита или потеря веса.
- Признаки синдрома Кушинга, например увеличение массы тела в верхней части спины или живота,

лунообразное лицо, сильная головная боль или медленное заживление.

- Признаки повышенного содержания сахара в крови, такие как спутанность мышления, сонливость, необычное чувство жажды и голода, учащенное мочеиспускание, гиперемия, учащенное дыхание, а также фруктовый запах изо рта.
- Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или urgentные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части живота или в области таза.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Тремор.
- Изменения зрения, боль в глазах или сильное раздражение глаз.
- Ореолы или радужные круги вокруг источников света перед глазами.
- Покраснение глаз.
- Затруднения или болезненность при мочеиспускании, выделение мочи в виде вялой струи или по каплям, учащение мочеиспускания.

- Боль в костях или суставах.
- Покраснение или белые участки в полости рта или горла.
- Депрессия и другие расстройства настроения.
- Этот препарат может вызвать тяжелые нарушения дыхания сразу после приема. В некоторых случаях это может представлять опасность для жизни. Если после применения этого препарата отмечаются проблемы с дыханием, затрудненное или свистящее дыхание, кашель, немедленно воспользуйтесь ингалятором для быстрого купирования симптомов (ингалятором быстрого действия) и обратитесь за медицинской помощью.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Раздражение носа или горла.
- Охриплость голоса.
- Головная боль.

- Мышечный спазм.
- Сухость во рту.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все ингаляционные препараты:

- Для ингаляции в легкие.
- Во время применения стойте или сидите прямо.
- Полощите рот после каждого приема. Не глотайте воду после полоскания. Сплюньте воду.
- Продолжайте применять этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача

или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.

- Очистите мундштук, протерев его сухой салфеткой или тканью. Не мойте водой и не погружайте в воду.
- Если вам назначены не 1, а несколько ингаляционных препаратов, уточните у врача, какой из них следует применять первым.

Ингалятор (аэрозоль):

- Перед первым применением распылите его 1 раз вдали от лица или в соответствии с указаниями вашего врача.
- Не жуйте и не кусайте загубник.
- Если доза превышает 1 ингаляцию, подождите 30 секунд перед повторным использованием. Держите ингалятор вертикально.
- После завершения приема дозы закройте колпачком.
- Для облегчения пользования ингалятором он может применяться вместе со спейсером.
- В данном ингаляторе имеется счетчик доз, предназначенный для отслеживания оставшихся доз. Выбросьте ингалятор через определенное время после его открытия, в соответствии с указаниями, или когда счетчик доз достигнет значения «0», в

зависимости от того, что наступит ранее.

- Если вы уроните ингалятор, произойдет распыление ингаляции и счетчик дозы уменьшится на единицу.

Ингалятор (порошок):

- Закрывайте устройство после каждого применения дозы. Не открывайте устройство до применения дозы.
- Не разбирайте устройство и не мойте его. Не использовать со спейсером. Не выдыхайте в аппарат.
- В данном ингаляторе имеется счетчик доз, предназначенный для отслеживания оставшихся доз. Выбросьте ингалятор, когда счетчик доз будет показывать «0», через 6 недель после вскрытия пакета или после истечения срока годности, в зависимости от того, что наступит раньше.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Ингалятор (аэрозоль):

- Неоткрытые упаковки следует хранить в холодильнике. Не замораживайте.
- После первого использования храните при комнатной температуре. Обязательно узнайте, в течение какого времени этот препарат может храниться при комнатной температуре, прежде чем его нужно будет выбросить. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с фармацевтом.
- Не подвергайте воздействию тепла и солнечного света. Не прокалывайте и не сжигайте, даже если он кажется пустым.

Ингалятор (порошок):

- Храните при комнатной температуре.
- Храните в защитном пакете до употребления.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные

препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом,

медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты

должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра
2024-06-27

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Beclomethasone, Formoterol, and Glycopyrrolate - Last updated on June 3, 2026

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center