ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Benzocaine

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Allevacaine [OTC]; Anacaine [DSC]; Anbesol Cold Sore Therapy [OTC]; Anbesol Maximum Strength [OTC] [DSC]; Baby Anbesol [OTC]; CankerMelts [OTC]; Cepacol INSTAMAX [OTC] [DSC]; GoodSense Oral Pain Relief [OTC]; HurriCaine One [OTC]; Hurricaine [OTC]; Hurricane Snap-n-Go [OTC] [DSC]; HurriPak Starter Kit [OTC] [DSC]; Instant Oral Pain Relief Max [OTC]; Ivy-Rid [OTC]; LolliCaine [OTC]; Medicaine/Sting & Bite Ampules [OTC]; Mucinex InstaSoothe Sore Thrt [OTC] [DSC]; Ora-film [OTC]; Zilactin Baby [OTC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?

Все средства для кожи:

- Применяется для облегчения боли, вызванной солнечным ожогом и раздражением кожи.
- Препарат применяется для облегчения зуда и боли вследствие укусов насекомых или раздражения кожи.

Все пероральные препараты:

- Этот препарат применяют для лечения ран в полости рта.
- Применяется для лечения афтозного стоматита.
- Этот препарат применяют для лечения раздражения в полости рта.
- Этот препарат применяют для успокоения боли в горле и в ротовой полости.

Для введения в прямую кишку:

- Применяется для лечения симптомов геморроя и раздражения прямой кишки.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?
Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о

том, как она проявлялась.

- Если в месте применения препарата инфекция.

Все пероральные препараты:

- Если пациент является ребенком, не достигшим 2-летнего возраста. Не давайте этот препарат детям младше 2 лет. Не применяйте данный лекарственный препарат при прорезывании зубов.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- При применении лекарственных препаратов, подобных этому, возникало тяжелое нарушение со стороны крови под названием «метгемоглобинемия». Риск этого нарушения может быть повышен у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФД) и с заболеваниями сердца или легких. Риск также может возрастать при применении некоторых других лекарственных препаратов, а также у младенцев в возрасте до 6 месяцев. Если у вас когда-либо обнаруживалась метгемоглобинемия, сообщите об этом врачу.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Все пероральные препараты:

- Не принимайте пищу, пока не пройдет чувство онемелости во рту. Вы можете нанести себе ущерб, прикусив язык.

Пастилка:

- Если у Вас высокий уровень сахара в крови (диабет), внимательно изучайте этикетки. В некоторых продуктах содержится сахар.

Спрей для полости рта:

- Не вдыхайте данный препарат. Вдыхание данного препарата может нанести вред или привести к летальному исходу.

Все препараты для введения в прямую кишку и нанесения на кожу:

- Предохраняйте одежду или ткань от появления пятен.
- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Спрей для кожи:

- Не вдыхайте данный препарат. Вдыхание данного препарата может нанести вред или привести к

летальному исходу.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки метгемоглобинемии, такие как синюшный или серый оттенок губ, ногтей или кожи; ощущение ненормального сердцебиения; судороги; тяжелое головокружение или потеря сознания; тяжелая головная боль; сильная сонливость; чувство

усталости или слабости; одышка. Такое действие возникает редко, но в случае развития может привести к смертельному исходу.

Для введения в прямую кишку:

- Сильное кровотечение из прямой кишки или боль в прямой кишке.

Все пероральные препараты:

- Сильная боль в полости рта.
- При лечении сильных болей в горле, если болевые ощущения длятся более 2 дней либо сопровождаются повышением температуры, головной болью, сыпью, тошнотой или рвотой.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Все формы выпуска:

- Раздражение в месте применения препарата.

Все пероральные препараты:

- Пощипывание во рту.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все средства для кожи:

- Не следует принимать этот препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза (возможен ожог).

- Мойте руки до и после применения. Если обрабатываемый участок находится на руке, не мойте руки после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Будьте осторожны при нанесении препарата на большие участки кожи или на участки с открытыми ранами. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты, повязки), если иное не предписано врачом.

Спрей для кожи:

- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

Все пероральные препараты:

- Не пейте и не принимайте пищу в течение не менее чем 1 часа после применения данного препарата.

Крем, гель, жидкость и мазь:

- Мойте руки до и после применения препарата.
- Нанесите тонкий слой на пораженный участок.
- Избегайте попадания в глаза.

Пероральная суспензия:

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.
- Прополощите препаратом рот, а затем выплюньте.
- Не проглатывайте данный препарат.
- Избегайте попадания в глаза.

Пастилка:

- Пососите пероральную таблетку. Не жуйте, не ломайте и не крошите. Не проглатывайте целиком.

Спрей для полости рта:

- Некоторые из данных лекарственных препаратов

необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.

Таблетка для рассасывания:

- Положите таблетку на язык и дайте ей раствориться. Запивать водой не нужно. Не проглатывайте таблетку целиком. Не разжевывайте, не разламывайте и не измельчайте таблетку.

Пероральные пластинки:

- Не прикасайтесь к препарату влажными руками.
- Дайте раствориться во рту. Запивать водой не нужно.

Для введения в прямую кишку:

- Этот препарат предназначен только для ректального применения. Не принимайте этот лекарственный препарат внутрь.
- Не вводите данный препарат в прямую кишку при помощи пальцев или аппликатора любого типа.

Придерживайтесь указаний врача.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком

годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Все средства для кожи:

- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.

Спрей для кожи:

- Не прокалывайте и не сжигайте, даже если он кажется пустым.

Все пероральные препараты:

- Берегите от жары.

Пероральная суспензия:

- Его можно охладить для улучшения вкуса.
- Выбросьте все неиспользованные порции препарата через 2 недели после приготовления смеси данного препарата.

Спрей для полости рта:

- Защищайте от воздействия тепла или открытого

огня. Не прокалывайте и не сжигайте, даже если он кажется пустым.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за

медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией

того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра
2023-12-04

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Benzocaine - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center