



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Carbidopa and Levodopa

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

Crexont; Dhivy; Duopa; Rytary; Sinemet

## Торговые наименования: Канада

AA-Levocarb CR; AG-Levocarb; APO-Levocarb; APO-Levocarb 100/25; APO-Levocarb 250/25; AURO-Levocarb; Duodopa; JAMP-Levocarb; MINT-Levocarb; PMS-Levodopa-Carbidopa; Pro-Lecarb; Sinemet 100/25 [DSC]; Sinemet 250/25 [DSC]; TEVA-Levocarbidopa

## Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения болезни Паркинсона.
- Применяется для лечения симптомов, таких как болезнь Паркинсона, вызванных другими проблемами со здоровьем.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

## Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о

вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

- Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: глаукома, нарост или уплотнение на коже, рак кожи в анамнезе.
- Если Вы принимаете один из следующих препаратов: Резерпин или тетрабеназин.
- Если вы принимаете любой из следующих препаратов: линезолид или метиленовый синий.
- Если на протяжении последних 14 дней вы принимали определенные препараты, показанные при депрессии, такие как изокарбоксазид, фенелзин или транилципромин. Прием данного препарата менее чем через 14 дней после последнего приема любого из вышеперечисленных препаратов может привести к резкому повышению кровяного давления.
- Если вы принимаете другой препарат, в состав которого входит это же лекарство.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты

и стоматологи.

- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам и сотрудникам лабораторий о том, что Вы принимаете этот препарат.
- Сдавайте анализ крови и проходите обследование глаз согласно рекомендациям врача.
- Если у вас диабет, это лекарство может изменить результаты тестов для контроля уровня глюкозы. Обсудите с лечащим врачом, какие тесты подходят вам наилучшим образом.
- Действие данного препарата может “прекратиться” ближе к времени приема следующей дозы. Если это происходит и беспокоит вас, проконсультируйтесь с врачом.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением алкоголя, марихуаны или других форм каннабиса, а также рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- У людей с болезнью Паркинсона возможно повышение риска развития одной из разновидностей рака кожи, известной как меланома. Может ли данный лекарственный препарат также увеличивать этот риск, неизвестно. Во время приема данного лекарственного препарата следует проходить обследования кожи. Проконсультируйтесь со своим врачом.
- Если у Вас фенилкетонурия, проконсультируйтесь с врачом. В некоторых продуктах содержится фенилаланин.

- Нельзя резко прекращать применение этого препарата или снижать дозу, не посоветовавшись с врачом. Могут возникнуть побочные эффекты. Некоторые побочные эффекты могут быть тяжелыми или даже приводить к смертельному исходу. Симптомы могут включать лихорадку, мышечные спазмы или скованность, головокружение, сильную головную боль, спутанность сознания, изменение мышления, тахикардию или нарушение сердечного ритма или сильное потоотделение. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас есть какие-либо из этих симптомов.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

## **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

### **Все формы выпуска:**

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие

как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.

- Появление или усугубление поведенческих или эмоциональных расстройств, таких как депрессия или мысли о самоубийстве.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Спутанность сознания.
- Сильные желания, которые трудно контролировать (например, прием пищи, азартные игры, секс или трата денег).
- Припухлости или разрастания кожи.
- Изменение цвета или размера родинки (бородавки).
- При появлении или усугублении проблем контролирования движений тела.
- Подергивание века.
- Мышечные судороги.
- Боль в животе, появление черного, дегтеобразного или кровавистого кала, рвотные массы с примесью крови или в виде «кофейной гущи».
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Повышение температуры, озноб, боль в горле; появление кровоподтеков и кровотечений по необъяснимым причинам; выраженное чувство усталости или слабости.
- Темная моча или пожелтевшая кожа или глаза.
- Изменения зрения, боль в глазах или сильное раздражение глаз.
- Одышка.
- Некоторые люди засыпали во время управления автомобилем, приема пищи или беседой. Некоторые не ощущали сонливости и чувствовали себя бодро непосредственно перед тем, как заснуть. Эти случаи отмечались спустя 1 год после начала приема данного препарата. Если

Вы засыпаете во время различных занятий, в день приема препарата откажитесь от вождения транспортных средств, а также прочих занятий или видов работ, требующих повышенного внимания. Если у Вас наблюдается повышенная сонливость, немедленно свяжитесь с врачом.

## **Энтеральная суспензия:**

- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Проблема в работе устройства или осложнение в месте введения дренажа.
- Отек рук или ног.
- На фоне применения данного препарата могут развиваться нарушения со стороны желудка или кишечника. Некоторые из этих нарушений могут вызвать необходимость в проведении оперативного вмешательства или привести к смертельному исходу. Среди них такие нарушения, как кровотечения из желудка или кишечника, непроходимость или язвы желудка или кишечника, инфекция или другие заболевания в месте введения дренажа, панкреатит. Если у Вас отмечается темный, дегтеобразный стул или стул с примесью крови, высокая температура, тошнота или рвота, продолжающийся запор либо боль в желудке, немедленно свяжитесь с Вашим врачом.

## **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

## **Все формы выпуска:**

- Кошмары.
- Запор.

- Чувство головокружения или сонливости.
- Сухость во рту.
- Головная боль.
- Нарушения сна.
- Некоторые препараты могут вызывать окрашивание слюны, мочи или пота в темно-красный, коричневый или черный цвет. Это не вредно, но может испачкать вашу одежду.

### **Все пероральные препараты:**

- Тошнота или рвота.

### **Энтеральная суспензия:**

- Боль в горле.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Все пероральные препараты:**

- Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема пищи.

### **Таблетки с немедленным высвобождением действующего вещества:**

- На некоторых таблетках могут быть линии разлома. При необходимости эти таблетки могут быть разделены по линии разлома.

### **Таблетки пролонгированного действия:**

- Проглотите целиком. Не жуйте и не крошите.
- Некоторые препараты можно разламывать пополам. Не жуйте и не размельчайте. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **Капсулы с замедленным высвобождением активного вещества:**

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не раздробляйте.
- Если вы не можете проглотить этот препарат целиком, некоторые продукты можно открыть и высыпать на яблочное пюре. Смесь нужно проглотить сразу, не разжевывая. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом, чтобы узнать, можно ли высыпать продукт на яблочное пюре.
- Проконсультируйтесь с врачом о том, как принимать данный препарат вместе с пищей. Врач может проинструктировать вас принять первую утреннюю дозу за 1–2 часа до еды. Если вы уже принимаете этот препарат, не меняйте способ его приема в отношении пищи, предварительно не посоветовавшись с врачом.
- Некоторые продукты нельзя принимать одновременно с алкоголем. Прием их одновременно с алкоголем может повысить риск побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем употреблять алкоголь в период лечения данным препаратом.

### **Таблетка для рассасывания:**

- Не прикасайтесь к препарату влажными руками.

- Извлекайте препарат из флакона непосредственно перед применением.
- Положите таблетку на язык и дайте ей раствориться. Запивать водой не нужно. Не проглатывайте таблетку целиком. Не разжевывайте, не разламывайте и не измельчайте таблетку.

## **Энтеральная суспензия:**

- Препарат вводят в виде инфузии через дренажную трубку, установленную в кишечник.
- Ваш лечащий врач научит вас тому, как правильно принимать этот препарат.
- Принимайте лекарственную форму данного препарата для перорального применения в соответствии с указаниями Вашего врача.
- Данный лекарственный препарат необходимо нагреть до комнатной температуры перед применением. Достаньте кассету из коробки и из холодильника за 20 минут до применения.
- Кассеты повторно использовать нельзя. Не используйте кассету дольше 16 часов, даже если осталось какое-то количество препарата.
- Если Вам необходимо отсоединить дозатор на короткое время (меньше 2 часов), соблюдайте указания Вашего врача или прочтите информацию, указанную в инструкции по применению. Если Вам необходимо отсоединить дозатор на более длительное время, дольше 2 часов, спросите указаний врача.

## **Все формы выпуска:**

- Если Вы принимаете препарат железа или поливитамин, содержащий железо, спросите своего врача или фармацевта, как его принимать вместе с данным лекарственным препаратом. Железо может снизить способность Вашего организма абсорбировать данный препарат.
- Диеты с высоким содержанием белков, жиров или калорий могут снизить способность вашего организма всасывать данный препарат. Употребление кислых продуктов также способствует этому.

Поговорите с врачом о вашей диете или о планируемом ее изменении.

- Продолжайте принимать этот препарат даже при отсутствии симптомов.
- Следует вести дневник с записями о симптомах.
- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня.

## **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

### **Все пероральные препараты:**

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

### **Энтеральная суспензия:**

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

## **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

### **Все пероральные препараты:**

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.

### **Энтеральная суспензия:**

- Храните в холодильнике. Не замораживайте.

- Храните в первичном контейнере.

## **Все формы выпуска:**

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

# Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## Дата последнего пересмотра

2025-05-13

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.  
Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Carbidopa and Levodopa - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

**Дата последнего обновления**

Декабрь 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).