



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Clonidine

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Catapres-TTS-1; Catapres-TTS-2; Catapres-TTS-3; Duraclon; Javadin; Kapvay [DSC]; Nexiclon XR; Onyda XR

Торговые наименования: Канада

JAMP-Clonidine; MAR-Clonidine; MINT-CloNIDine; MINT-Clonidine; Sandoz Clonidine; TEVA-CloNIDine

Предупреждение

Эпидуральный:

- Данный лекарственный препарат не предназначен для облегчения боли до, во время и после хирургического вмешательства. В большинстве случаев данный лекарственный препарат не применяется во время родов и после них. Пониженное кровяное давление и брадикардия, связанные с приемом данного лекарственного препарата, могут вызвать осложнения у таких пациентов. Проконсультируйтесь с врачом.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения повышенного кровяного давления.
- Применяется для лечения синдрома дефицита внимания с гиперактивностью.
- Применяется для уменьшения боли при спинномозговой инфузии.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если вы принимаете другой препарат, в состав которого входит это же лекарство.
- Если Вы принимаете любой из данных лекарственных препаратов: дигоксин, дилтиазем, верапамил или бета-блокатор, например метопролол или пропранолол.

Эпидуральный:

- Если у Вас кровотечения.
- Если у вас инфекция в том месте, куда будут делать укол.
- Если Вы принимаете антикоагулянты (для разжижения крови).

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими

лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- Измеряйте кровяное давление и частоту сердечных сокращений в соответствии с указаниями врача.
- Если вы принимаете данный препарат и у вас имеется повышенное кровяное давление, проконсультируйтесь с врачом перед приемом препаратов, отпускаемых без рецепта, которые могут повысить кровяное давление. К этим препаратам относятся лекарственные средства для лечения кашля и простудных заболеваний, таблетки для похудения, стимуляторы, нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), такие как ибупрофен или напроксен, а также некоторые препараты природного происхождения.
- Следует проявлять осторожность в жаркую погоду и во время активной деятельности. Пейте много жидкости для предотвращения обезвоживания.
- При использовании этого препарата может возникнуть сухость глаз. Если вы носите контактные линзы и у вас появилась сухость глаз или изменилось ощущение контактных линз в глазах, поговорите со своим

врачом.

- Если вы использовали пластырную форму этого препарата и у вас было раздражение кожи, проконсультируйтесь со своим врачом. При использовании любой формы этого препарата у вас может появиться сыпь на любой части тела.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Таблетки с медленным высвобождением и раствор для перорального применения (для лечения СДВГ):

- Избегайте употребления алкоголя, марихуаны или других форм каннабиса, а также рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.

Все прочие лекарственные формы:

- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением алкоголя, марихуаны или других форм каннабиса, а также рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.

Кожный пластырь:

- Пластырь может содержать металл, проводящий ток. Снимите пластырь перед проведением магнитно-резонансной томографии.
- Если вам предстоит пройти определенные процедуры для нормализации сердечного ритма (дефибрилляцию или кардиоверсию), побеседуйте с врачом. Убедитесь, что ваш врач знает, что вы принимаете данный лекарственный препарат.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Сильное головокружение или обморок.
- Учащенное, замедленное сердцебиение или нарушение сердечного ритма.

Кожный пластырь:

- Краснота.
- Ожог.
- Изменение цвета кожи.

Эпидуральный:

- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.
- Спутанность сознания.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Все формы выпуска:

- Сухость во рту.
- Запор.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Головная боль.
- Тошнота.

Таблетки пролонгированного действия:

- Нарушения сна.
- Кошмары.
- Пониженный аппетит.
- Боль в кишечнике.
- Чувство раздражительности.

Кожный пластырь:

- Кожное раздражение.

Эпидуральный:

- Излишнее потоотделение.
- Рвота.
- Звон в ушах.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных

эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все пероральные препараты:

- Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема пищи.
- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня.
- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Не прекращайте прием этого препарата внезапно, не посоветовавшись предварительно с врачом. При резком прекращении приема этого препарата может повыситься артериальное давление. Также могут развиваться симптомы абстиненции, такие как головная боль, тахикардия, тошнота, гиперемия или ощущение прилива крови, обморок, чувство стеснения в груди, нервозность или беспокойство. Если вам нужно прекратить прием этого препарата, нужно делать это постепенно, в соответствии с указаниями врача.
- Сообщите врачу, если у вас наблюдается рвота и вы не можете принимать данный препарат.

Таблетки с медленным высвобождением (для лечения СДВГ):

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не раздробляйте.
- Если у вас трудности с глотанием, проконсультируйтесь с врачом.

Таблетки с медленным высвобождением (для нормализации артериального давления):

- Можно разломать таблетку пополам. Не жуйте и не размельчайте.

Раствор для приема внутрь:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.
- Если вам предстоит операция, обсудите с врачом, как принимать этот препарат в день операции.

Кожный пластырь:

- Продолжайте применять этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Вначале удалите ранее прикрепленный пластырь.
- Мойте руки до и после применения.
- Не разрезайте и не разделяйте пластыри. Не используйте поврежденные пластыри.
- Наклейте пластырь на здоровую кожу грудной клетки или верхней части руки. Очистите участок водой с мылом и хорошо высушите перед тем, как наклеить пластырь. Каждый новый пластырь наклеивайте на другое место.
- Накладывайте пластырь на кожу без волос. Не накладывайте пластырь на кожу сразу после бритья.

- Не накладывайте на кожу сразу после нанесения масла, лосьона, увлажняющего крема или других косметических средств. Из-за этого пластырь может плохо прилипнуть.
- Не наносить на участки раздраженной или поврежденной кожи. Не наносить на участок кожной складки или кожи, которая будет натираться плотно прилегающей одеждой.
- Во время ношения пластыря вы можете принимать ванну, душ и плавать.
- К этому препарату прилагается фиксатор, который позволяет удерживать пластырь при ослаблении его контакта с кожей. Фиксатор пластыря не содержит никаких лекарственных веществ. Не используйте фиксатор без пластыря. При ослаблении контакта между пластырем и кожей, прикрепите фиксатор поверх пластыря в соответствии с полученными инструкциями.
- Если кожа под пластырем стала слегка раздраженной, вы можете снять пластырь и наложить новый в другом месте.
- После снятия пластыря согните его пополам, соединив между собой клейкие стороны. Выбрасывайте использованные пластыри туда, где они будут недоступны для детей и домашних животных.
- Этот препарат может причинить вред ребенку при случайном жевании, проглатывании или нанесении. Если это произойдет, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Не прекращайте прием этого препарата внезапно, не посоветовавшись предварительно с врачом. При резком прекращении приема этого препарата может повыситься артериальное давление. Также могут развиваться симптомы абстиненции, такие как головная боль, тахикардия, тошнота, гиперемия или ощущение прилива крови, обморок, чувство стеснения в груди, нервозность или беспокойство. Если вам нужно прекратить прием этого препарата, нужно делать это постепенно, в соответствии с указаниями врача.

Эпидуральный:

- Для введения в позвоночник.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Таблетки с медленным высвобождением (для лечения СДВГ):

- Пропустите забытую дозу и вернитесь к своему обычному графику.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Все другие препараты для приема внутрь:

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Кожный пластырь:

- Нанесите пропущенный пластырь как только сможете, предварительно сняв старый.
- Если наступило время для смены повязки, наложите новую.
- Начните новый график размещения пластырей после того, как вновь наложите пластырь.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

Эпидуральный:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все лекарственные препараты для перорального применения и кожный пластырь:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.

Все пероральные препараты:

- Держите крышку плотно закрытой.

Раствор для приема внутрь:

- После вскрытия упаковки выбросьте все неиспользованные порции по истечении 60 дней.

Эпидуральный:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь

с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования,

представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-04-28

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.

Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00. В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Clonidine - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center