



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Collagenase (Systemic)

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Xiaflex

Предупреждение

Болезнь Пейрони:

- Применение данного препарата может повлечь за собой повреждение каналов полового члена. Эти повреждения могут носить стойкий характер. Они могут привести к разрыву этих образований во время эрекции. Данный лекарственный препарат может также привести к разрыву кровеносных сосудов полового члена. Это может стать причиной подкожного скопления крови. Если это произойдет, возможен некроз кожи, в связи с чем может потребоваться хирургическое вмешательство. Немедленно обратитесь к врачу, если Вы вдруг потеряете способность удерживать эрекцию. При возникновении боли, кровоподтеков или воспаления в половом члене, появлении звука или ощущения хлопка в эрегированном половом члене, возникновении непроходимости мочевыводящих путей или появлении крови в моче немедленно свяжитесь с врачом.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Это лекарство используется для лечения сухожилий у пациентов с контрактурой Дюпюитрена.
- Применяется для лечения болезни Peyroni.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Для всех целей применения данного препарата:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас бывают кровотечения или вы принимаете препараты, разжижающие кровь.

Болезнь Peyroni:

- При наличии болезни Peyroni и наличии в уретре (канале, через который выводится моча) бляшки, нуждающейся в лечении.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Для всех целей применения данного препарата:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- У некоторых людей после приема этого препарата появлялось головокружение или предобморочное состояние. В большинстве случаев это происходило при сильной боли или после болезненных процедур. Если вы чувствуете головокружение или предобморочное состояние, лягте и дождитесь, пока эти проявления не исчезнут.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Болезнь Пейрони:

- Не рекомендуется вступать в половые контакты или совершать любые другие действия сексуального характера в течение по меньшей мере 4 недель после приема второй дозы и до полного исчезновения любой разновидности боли и воспаления.
- Во время лечения этим препаратом не пользуйтесь вакуумным устройством для достижения эрекции.
- При лечении этим препаратом избегайте действий, сопровождающихся напряжением мышц брюшной стенки. К ним относится натуживание во время опорожнения кишечника.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Для всех целей применения данного препарата:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки инфекции, такие как высокая температура, озноб, очень сильная боль в горле, ухе или в придаточных пазухах носа, кашель, увеличение количества мокроты или изменение ее цвета, боль при мочеиспускании, язвы в полости рта или незаживающая рана.
- Боль в груди.
- Головокружение или обморок.
- Сильный отек или боль в руках или ступнях.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Кровотечение.

Контрактура Дюпюитрена:

- Применение данного препарата сопровождалось повреждением сухожилий или связок, приводящим к ослаблению или разрыву сухожилия или связки. Для устранения этой проблемы может потребоваться хирургическое вмешательство. Если вы не в состоянии согнуть обработанный палец после спадания отека или если возникли какие-либо проблемы с обработанной рукой, немедленно обратитесь к врачу.
- Зафиксированы неврологические нарушения и другие тяжелые поражения руки. В ряде случаев отмечались разрывы и некроз кожной ткани. Может потребоваться хирургическое вмешательство, в том числе, ампутация пальца. Если у Вас отмечается онемение, покалывание, усиление боли или разрывы кожи на пальце или руке после получения инъекции или посещения врача, немедленно обратитесь к врачу.

Болезнь Пейрони:

- После инъекции появилась боль в спине. Боль в спине может распространяться на ноги, ступни, грудь и руки. Эти признаки обычно проходят в течение 15 минут, но могут длиться дольше. Немедленно сообщите врачу, если у Вас возникла резкая боль в спине, боли в груди или нарушение ходьбы после инъекции.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Для всех целей применения данного препарата:

- Раздражение или отек в месте укола.
- Боль в зоне инъекции.
- Гематома.

Контрактура Дюпюитрена:

- Воспаление лимфоузлов в локтевой или подмышечной области.
- Боль в подмышечной области.
- Отек, ощущение тепла или покраснение кожи.

Болезнь Пейрони:

- Легкая боль в половом члене. Может помочь обезболивающий препарат, отпускаемый без рецепта.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом

относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1- 800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Для всех целей применения данного препарата:

- Для инъекций.

Контрактура Дюпюитрена:

- Не сгибайте и не распрямляйте пальцы руки, подвергающейся лечению, без разрешения лечащего врача.
- Не пытайтесь распрямить палец, подвергающийся лечению.
- Держите кисть, подвергающуюся лечению, в приподнятом состоянии в течение первого дня после лечения, пока не ляжете спать.
- Через 1–3 дня после инъекции вам потребуется вновь прийти на прием к врачу.
- Вам выдадут лангету, которую вы будете носить на пальце, подвергающемся лечению, во время сна в течение 4 месяцев.
- Выполняйте упражнения для пальца каждый день.
- Не возобновляйте обычную активность кисти руки, подвергающейся лечению, без разрешения лечащего врача.

Болезнь Пейрони:

- Через 1–3 дня после второй инъекции в течение каждого цикла лечения вам потребуется вновь прийти на прием к врачу. Вы должны точно знать дату и время приема.
- Ваш врач даст Вам руководство для пациента, в котором объясняется, как вытягивать и формировать половой член в домашних условиях. Внимательно прочитайте это руководство.
- Следуйте рекомендациям врача, указывающим когда и как вытягивать половой член после каждого цикла терапии.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов,

проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или

лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-05-06

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Collagenase (Systemic - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center