



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Cyproterone and Ethinyl Estradiol

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: Канада

AMB-Cyproterone/Eth Estradiol; Cleo-35; Cyestra-35; Diane-35; TARO-Cyproterone/Eth Estradiol; TEVA-Cyproterone/Eth Estradiol

Предупреждение

- Данный лекарственный препарат может повышать риск тромбоза. Не принимайте данный препарат, если у Вас наблюдается тромбоз или отмечались случаи образования тромбов в прошлом. Проконсультируйтесь с врачом.
- Не принимайте этот препарат, если принимаете другой подобный препарат. Есть много других

препаратов, подобных этому. Поговорите со своим врачом, если вы не уверены.

- Данный лекарственный препарат не следует принимать в качестве противозачаточного средства. Тем не менее, при применении в соответствии с указаниями данный лекарственный препарат может действовать как противозачаточное средство.
Проконсультируйтесь с врачом.
- Продолжайте принимать данный лекарственный препарат, пока врач не разрешит прекратить применение.
- Не курите на протяжении периода применения данного лекарственного препарата. Курение повышает вероятность возникновения очень тяжелых нарушений со стороны сердца. Риск увеличивается с возрастом (для женщин старше 35 лет) и у заядлых курильщиков (15 сигарет в день и более).

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения угрей.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас когда-либо было любое из перечисленных ниже нарушений состояния здоровья: тромбы, нарушение свертываемости крови, рак молочной железы, боль в груди, вызванная стенокардией, депрессия, диабет с нарушением кровообращения, поражение артерий головного мозга, нарушения со стороны органов зрения или проблемы со зрением, заболевание сердца, инфаркт миокарда, повышенное кровяное давление, зуд всей поверхности тела, заболевание или опухоль печени, инсульт, сильная головная боль или мигрень, сильная боль в желудке, пожелтение кожи или глаз.
- Если у Вас были любые из перечисленных ниже заболеваний: рак эндометрия, шейки матки или влагалища, либо вагинальное кровотечение, причина которого неизвестна.
- Если у Вас когда-либо был гормоноиндуцированный рак.
- Если во время прошедшей беременности у Вас была

проблема со здоровьем, которая привела к потере слуха (отосклероз).

- При появлении желтухи во время беременности или применения эстрогенов, например в виде противозачаточных средств.
- Если вы принимали омбитасвир, паритапревир и ритонавир (с дасабувиром или без него) в течение последних 2 недель.
- Если вы принимаете аминокaproновую кислоту.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.
- Если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью.

Дети:

- Если у Вашей дочери не начались менструации.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных

препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи. Возможно, потребуются приостановить прием данного лекарственного препарата перед проведением определенных типов хирургических вмешательств в соответствии с указаниями Вашего врача. В случае приостановки лечения данным лекарственным препаратом Ваш врач сообщит Вам, когда можно будет возобновить прием данного препарата после проведения Вам хирургического вмешательства или процедуры.
- Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- Если у вас повышенный уровень сахара в крови (диабет), необходимо регулярно проверять уровень сахар в крови.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам и сотрудникам лабораторий о том, что Вы принимаете этот препарат.
- Регулярно проходите обследование молочных желез и гинекологическое обследование. Также необходимо проводить самообследование молочных желез в соответствии с указаниями.
- Будьте осторожны, если у Вас имеются факторы риска развития заболеваний сердца (повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, избыточный вес, повышенный уровень сахара в крови или сахарный диабет, курение или иное употребление никотина, возраст старше 40 лет для мужчин, раннее развитие заболеваний сердца у других членов семьи, постменопаузальный период для женщин). Проконсультируйтесь с врачом.
- Прием данного лекарственного препарата сопровождался развитием тромбоза. Иногда тромбы, которые привели к развитию инсульта или инфаркта миокарда, были смертельно опасными.

Проконсультируйтесь с врачом.

- Проконсультируйтесь с лечащим врачом, если Вам предстоит долгое время находиться в неподвижном состоянии (длительные перелеты или переезды, постельный режим после операции или болезнь). Длительное пребывание в неподвижном состоянии может повысить риск образования тромбов.
- Применение лекарственных препаратов данного рода сопровождалось повышенным кровяным давлением. Контролируйте свое кровяное давление в соответствии с указаниями врача.
- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.
- Этот препарат не защищает от инфекций, передающихся половым путем, таких как ВИЧ или гепатит. Для защиты от этих инфекций используйте латексный или полиуретановый презерватив.
- Данный препарат может вызвать образование пигментных пятен на коже лица. Избегайте воздействия солнечных лучей, ламп солнечного света, не посещайте солярий. Используйте солнцезащитные крема, носите одежду, защищающую от солнца, и солнцезащитные очки.
- Некоторые исследования показали, что риск

развития рака молочной железы повышен у принимающих гормональные противозачаточные средства в течение длительного времени. Однако в других исследованиях этот риск не выявлен. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.

- Данный препарат не одобрен к применению в том случае, если у вас менопауза или постменопауза.
- При рвоте или диарее эффективность данного препарата по предотвращению наступления беременности может быть понижена. Используйте другие противозачаточные средства, например презерватив, пока не проконсультируетесь с Вашим врачом.
- Некоторые лекарства, растительные препараты или проблемы со здоровьем могут снижать эффективность гормональных противозачаточных средств. Обязательно сообщите своему врачу о том, какие препараты вы принимаете, а также о своих проблемах со здоровьем. Вам нужно узнать, следует ли вам дополнительно использовать негормональные противозачаточные средства, например презервативы.
- Если Вы не принимали данный лекарственный препарат в соответствии с указаниями, возможно, для предотвращения беременности Вам

понадобится применять негормональные противозачаточные средства, например презервативы. Проконсультируйтесь со своим врачом.

- Если хотите снова забеременеть после прекращения данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с лечащим врачом. Возможно, Вам потребуются предотвращать беременность в течение по меньшей мере 1 месячного (менструального) цикла. Обсудите с врачом, какой тип противозачаточных средств Вам использовать.
- Возможно неблагоприятное воздействие данного препарата на плод. Перед началом приема данного препарата вы пройдете тест на беременность, чтобы подтвердить, что вы НЕ беременны.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки нарушений со стороны печени, такие как потемнение мочи, утомляемость, отсутствие аппетита, тошнота или боль в животе, посветление кала, рвота, пожелтение кожи или глаз.
- Признаки нарушений со стороны желчного пузыря, такие как боль в верхней правой части живота, в правом плече или между лопатками, изменение кала, темный цвет мочи или желтая окраска кожи или глаз, повышение температуры тела с ознобом.
- Признаки повышенного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение зрения.
- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- Признаки проблем с поджелудочной железой

(панкреатита), такие как сильные боли в животе, сильные боли в спине, серьезное расстройство желудка и рвота.

- Учащенное дыхание.
- Тревожность.
- Депрессия и другие расстройства настроения.
- Сильная боль в животе.
- Нарушение или потеря зрения, экзофтальм или изменение ощущений при ношении контактных линз.
- Уплотнение в молочной железе или повышенная чувствительность груди.
- Нехарактерное вагинальное кровотечение.
- Изменение полового влечения.
- Вагинальный зуд или выделения.
- При проблемах контроля за движениями тела.
- Изменение цвета пальцев рук или ног.
- Изменение слуха.
- Данный препарат может вызывать отечность или задержку жидкости в организме. Поставьте в известность врача, если у вас наблюдается отечность, быстрое увеличение веса или трудности с дыханием.

- Немедленно обратитесь к врачу, если у вас появятся такие симптомы тромбов, как боль или давление в груди, плече, спине или челюсти, кровохарканье, онемение или слабость одной стороны тела, нарушение речи или мышления, изменение равновесия, опускание одной стороны лица, нарушение зрения, одышка, тревожность, аномальное потоотделение, ускорение или нарушение сердечного ритма, тошнота, рвота, изжога, ощущение удушья, головокружение или обморок, слабость, или отек, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Тошнота или рвота.
- Боль или спазмы в животе.
- Головная боль.
- Нервное напряжение и возбужденность.

- Увеличение или потеря веса.
- Изменения аппетита.
- Насморк или заложенность носа.
- Изменения в менструации. К ним относится чрезмерное кровотечение, выделение небольшого количества крови или кровотечение между менструальными циклами.
- Изменение роста волос.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня.

- При задержке менструаций более чем на 7 дней проконсультируйтесь с врачом. Не начинайте новую упаковку.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если после пропуска дозы прошло более 12 часов, не принимайте пропущенный препарат, а примите следующую дозу в обычное время.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных

препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в

токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования

лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-02-26

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Cyproterone and Ethinyl Estradiol - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center