Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Desmopressin

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

DDAVP; DDAVP Pf; Desmoda; Nocdurna [DSC]

## Торговые наименования: Канада

APO-Desmopressin; Bipazen; DDAVP; DDAVP Melt; Octostim; PMS-Desmopressin

## Предупреждение

- Данный препарат может привести к снижению уровня натрия. Очень низкий уровень натрия может быть опасным для жизни, приводить к судорогам, обморокам, затрудненному дыханию или смерти.
- Выполняйте анализы крови и другие лабораторные анализы в соответствии с указаниями врача.
- Если у вас инфекция, высокая температура, диарея или рвота, проконсультируйтесь с врачом. Проконсультируйтесь с врачом, если по тем или иным причинам вам предстоит находиться на сильной жаре, активно двигаться или изменить количество выпиваемой воды.
- Если Вы принимаете любые лекарственные препараты, способные увеличить риск снижения уровня натрия, проконсультируйтесь с врачом. Такое воздействие может оказывать большое количество лекарственных препаратов. В случае сомнений проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.

## Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для профилактики ночного недержания мочи.
- Применяется для лечения такой проблемы со здоровьем, как никтурия, которая вызывает необходимость вставать в ночное время для мочеиспускания.
- Применяется для лечения центрального несахарного диабета.
- Этот препарат применяют для лечения гемофилии.

- Этот препарат применяют для лечения болезни Виллебранда.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

## Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

### Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: заболевание почек, риск высокого давления в головном мозге, или если у вас когда-либо был низкий уровень натрия или непроходимость мочевыводящих путей.
- Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: сердечная недостаточность (ослабленное сердце), повышенное артериальное давление или заболевание под названием «синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона» (СНСАДГ).
- Если у вас болезнь фон Виллебранда типа IIB.
- Если у Вас есть проблемы со здоровьем, которые ведут к потере натрия, такие как заболевания надпочечников; понос; расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия; тошнота или рвота, которая не прекращается.
- Если количество выпиваемой Вами воды превышает норму.

### Все препараты для носа:

- Если у вас наблюдаются заложенность носа, рубцы на внутренней поверхности носа, затрудненное дыхание через нос или другие нарушения со стороны носа.
- Если у Вас недавно была какая-либо операция на носу, травма,

изъязвление или воспаление в полости носа, проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- Если Вы применяете для носа другой препарат.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

### Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Очень тяжелые аллергические реакции возникали редко. Иногда аллергические реакции заканчивались летальным исходом при применении данного препарата в форме инъекций. Проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

### Инъекции и назальный спрей (для использования при кровотечениях):

- При появлении любых необъяснимых кровоподтеков или кровотечения

немедленно обратитесь к врачу. Это может быть признаком того, что обычная доза не работает.

### Таблетки, принимаемые под язык (сублингвальные таблетки):

- Этот препарат не одобрен для применения у детей. Проконсультируйтесь с врачом.

### Все прочие лекарственные формы:

- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.

### Раствор для приема внутрь:

- Препараты, в состав которых входит бензиловый спирт, могут вызывать тяжелые и иногда летальные побочные эффекты у новорожденных или младенцев. Этот препарат содержит бензойную кислоту, которая является продуктом распада бензилового спирта. Применять с осторожностью у новорожденных и младенцев. Проконсультируйтесь с врачом.

## О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

### Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,

стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Признаки пониженного уровня натрия, такие как головная боль, проблемы с концентрацией внимания, нарушение памяти, спутанное мышление, слабость, судороги, проблемы с сохранением равновесия.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Тошнота или рвота.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Ощущение усталости или слабости.
- Беспокойство.
- Мышечная слабость.
- Мышечный спазм.
- Пониженный аппетит.
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Воспаление, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Кашель с кровью.
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.

## Инъекция:

- Раздражение или отек в месте укола.

- Боль в зоне инъекции.

## Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

### Все формы выпуска:

- Гиперемия (румянец).

### Таблетки, принимаемые под язык (сублингвальные таблетки):

- Сухость во рту.
- Головокружение.

### Все препараты для носа:

- Насморк или заложенность носа.
- Желудочные колики.
- Кашель.
- Носовое кровотечение.
- Боль в горле.
- Признаки простуды.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное

управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

## Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### Все формы выпуска:

- Во время лечения этим препаратом вам может потребоваться контролировать объем выпиваемой жидкости. Следуйте инструкциям врача относительно объема выпиваемой жидкости и интенсивности физических нагрузок. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, задайте их своему врачу.

### Раствор для приема внутрь:

- Принимайте данный лекарственный препарат натощак. Этот препарат следует принимать не позже чем за 1 час до и не раньше чем через 2 часа после еды.
- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.

### Все другие препараты для приема внутрь:

- Если вы принимаете данный препарат по поводу ночного недержания мочи или с целью предотвращения ночных пробуждений для мочеиспускания, вам следует опорожнять мочевой пузырь непосредственно перед сном. Не пейте алкогольные или кофеинсодержащие напитки перед отходом ко сну. Следуйте указаниям

врача относительно употребления жидкости незадолго до сна.

### Таблетки:

- Если этот препарат назначен как лечение ночного недержания мочи, его следует принимать перед сном.

### Таблетки, принимаемые под язык (сублингвальные таблетки):

- Принимайте этот препарат за 60 минут до сна.
- При вскрытии упаковки не выталкивайте таблетку из фольги.
- Извлекайте таблетку из упаковки только перед самым приемом данного препарата. Принимайте таблетку сразу после открытия блистерной упаковки. Не храните извлеченную таблетку для дальнейшего использования.
- Не прикасайтесь к препарату влажными руками.
- Положите под язык и дайте полностью раствориться. Не разжевывайте, не рассасывайте и не проглатывайте таблетку.

### Все препараты для носа:

- Не принимайте этот препарат через рот. Только для применения через нос. Следует избегать попадания в рот и глаза (возможен ожог).
- Перед применением следует очистить нос.
- Для некоторых препаратов могут существовать иные способы заполнения помпы. Некоторые помпы также возможно понадобится заполнять, даже если они не используются в течение разных периодов времени. Придерживайтесь инструкции по способу и времени заполнения.

### Инъекция:

- Для внутримышечных, внутривенных или подкожных инъекций.

## Что делать в случае пропуска приема дозы

## лекарственного препарата?

### Инъекция:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

### Все прочие лекарственные формы:

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

## Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

### Раствор для приема внутрь:

- Хранить в холодильнике или при комнатной температуре.
- Не замораживайте.
- Выбросьте все неиспользованные порции препарата через 120 дней после вскрытия упаковки.

### Все другие препараты для приема внутрь:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.

### Таблетки, принимаемые под язык (сублингвальные таблетки):

- Храните в первичном контейнере.

### Назальный спрей (для использования при кровотечениях):

- Хранить в вертикальном положении при комнатной температуре. Не замораживать.

- Некоторые марки этого препарата нужно выбросить через 90 дней после вскрытия. Некоторые марки нужно выбросить через 6 месяцев после вскрытия. Укажите дату вскрытия емкости на ее этикетке. Вы должны точно знать, как долго можно хранить препарат, прежде чем его потребуется выбросить.

### Препараты для носа (несахарный диабет):

- Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить в холодильнике. Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить при комнатной температуре. Если у Вас есть вопросы относительно хранения данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с фармацевтом.
- Проверьте продолжительность возможного хранения этого препарата до того, как Вам понадобится его выбросить.
- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.

### Инъекция:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

### Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту.

Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

## Дата последнего пересмотра

2026-03-10

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Desmopressin - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center