



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Dihydroergotamine

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

Brekiya; D.H.E. 45 [DSC]; Migranal [DSC]; Trudhesa

## Торговые наименования: Канада

DHE; Migranal

### Предупреждение

- Применение данного лекарственного препарата одновременно с некоторыми видами других лекарств (klarитромицин, эритромицин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, нелфинавир, ритонавир и тролеандомицин) сопровождалось нарушением кровотока в руках, ногах или тканях головного мозга. Такие эффекты могут быть очень тяжелыми или даже смертельно опасными. Не принимайте данный лекарственный препарат, если Вы применяете любой из этих препаратов. Такое воздействие может оказывать большое количество лекарственных препаратов. Удостоверьтесь в том, что применение данного лекарственного препарата безопасно в сочетании со всеми другими лекарствами, которые Вы уже принимаете.

## Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения мигрени.
- Некоторые препараты используются для лечения кластерной головной боли.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

## Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас аллергия на латекс, проконсультируйтесь с врачом. В некоторых продуктах содержится латекс.
- Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: повышенное кровяное давление или некоторые виды мигрени, например гемиплегическая или базилярная мигрень.
- Если у Вас есть любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: заболевание кровеносных сосудов, боль в груди или стенокардия, заболевание сердца, заболевание почек, заболевание печени, повышенное кровяное давление, нарушение кровотока, очень серьезная инфекция или недавно перенесенная операция на кровеносных сосудах.
- Если у Вас когда-либо был инфаркт миокарда.
- Если Вы принимали алмотриптан, элетриптан, фроватриптан, наратриптан, ризатриптан, суматриптан или золмитриптан в течение последних 24 часов.
- Если Вы принимали эрготамина, метисергид или аналогичные лекарственные препараты в течение последних 24 часов.
- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный

препарат во время беременности.

- Если Вы кормите ребенка грудью. Не кормите грудью во время лечения данным лекарственным препаратом и в течение 3 дней после приема последней дозы.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось повышенным кровяным давлением. Контролируйте свое кровяное давление в соответствии с указаниями врача.
- Перед началом приема этого препарата вам может понадобиться оценка функции сердца. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.
- Будьте осторожны, если у Вас имеются факторы риска развития заболеваний сердца (повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, избыточный вес, повышенный уровень сахара в крови или сахарный диабет, курение или иное употребление никотина, возраст старше 40 лет для мужчин, раннее

развитие заболеваний сердца у других членов семьи, постменопаузальный период для женщин). Проконсультируйтесь с врачом.

- Проконсультируйтесь с врачом, если вы часто пьете грейпфрутовый сок или едите грейпфруты.
- Этот препарат не предназначен для регулярного и ежедневного применения. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный препарат не предназначен для профилактики или снижения частоты возникновения мигренозных головных болей.
- Не применяйте более прописанного количества. Не применяйте чаще или дольше, чем рекомендовано врачом. Выполнение любых из этих действий может повысить риск развития очень серьезных побочных эффектов.
- Прием данного лекарственного препарата в большем количестве (более высокие дозы, более частое применение), чем назначено врачом, может привести к усилению головных болей.

## **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного кровяного давления, такие как очень сильная

головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение зрения.

- Изменение цвета кистей, стоп или других областей. Кожа может стать бледной, синюшной, серой, багровой или красной.
- Онемение, боль, покалывание или чувство холода в кистях или ступнях.
- Любые изъязвления или раны на пальцах рук или ног.
- Мышечная боль или слабость.
- Судороги или боль в ногах или в области бедер.
- Ощущение тяжести или напряжения в мышцах ног.
- Жжение или ноющая боль в стопах или пальцах ног.
- Воспаление.
- Диарея или запор.
- Сильная боль в животе или диарея с примесью крови в стуле.
- Боль в животе после еды.
- Высокая температура.
- Потеря веса.
- На фоне приема данного препарата отмечались тяжелые и иногда смертельные нежелательные явления со стороны сердца, такие как инфаркт миокарда и нарушения сердечного ритма. В случае появления чувства стеснения, боли, сдавления или тяжести в груди, горле, шее или в области нижней челюсти; необычной боли в руке, спине, шее, нижней челюсти или животе; одышки; холодного пота; тяжелой тошноты или рвоты; головокружения, а также потери сознания незамедлительно обратитесь к лечащему врачу.
- На фоне приема данного лекарственного препарата в редких случаях возникали очень тяжелые, иногда смертельно опасные нарушения со стороны сосудов головного мозга, например инсульт. Если у Вас отмечается слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, нарушение равновесия, опущение 1 стороны лица или нарушение зрения, немедленно обратитесь к врачу.

- Во время лечения этим препаратом в редких случаях регистрировалось поражение сердечных клапанов. При появлении таких симптомов, как учащенное сердцебиение (тахикардия) или непривычное ощущение сердечных сокращений, одышка, отеки рук или ног или значительная прибавка в весе, немедленно обратитесь к своему врачу.

## **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

### **Спрей для носа:**

- Тошнота или рвота.
- Раздражение носа или горла.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Носовое кровотечение.
- Насморк или заложенность носа.
- Ожог.
- Сухость в носу.
- Сонливость.

### **Назальный порошок:**

- Тошнота или рвота.
- Раздражение носа или горла.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Носовое кровотечение.
- Насморк или заложенность носа.

- Кашель.
- Чихание.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Инъекция (если вводится в подкожную жировую клетчатку):**

- Для подкожных инъекций.
- Если Вы будете делать себе уколы, Ваш врач или медсестра научат Вас делать инъекции.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Этот препарат прозрачный и бесцветный. Не используйте раствор, если он изменил цвет.
- Мойте руки до и после применения.
- При каждой инъекции меняйте место укола.
- Не выполняйте очередную инъекцию в участок кожи в радиусе 5 см (2 дюймов) от места предыдущей инъекции.

- Не вводите через одежду.
- Не наносите на родинки, рубцы, невусы или растяжки. Не допускайте попадания на кожу с покраснением, раздражением, ожогами, повышенной чувствительностью, синяками, затвердением или поврежденную кожу.
- При использовании ампулы выбросьте всю неиспользованную часть в течение 1 часа после вскрытия ампулы.
- Если головная боль вернулась или прошла не полностью, можно повторить прием дозы еще один или два раза, если это разрешил ваш лечащий врач. Если вам нужно принять еще одну дозу, не принимайте ее раньше, чем через 1 час после приема предыдущей дозы. Используйте новую ампулу или новый автоинжектор для каждой дозы.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

### **Инъекция (если вводится в мышцу или в вену):**

- Для внутримышечных или внутривенных инъекций.

### **Спрей для носа:**

- Только для носа.
- Принимайте данный препарат как можно раньше после начала приступа.
- Перед использованием данного препарата необходимо соединить его компоненты. После вскрытия флакона и соединения компонентов назального спрея используйте препарат в течение 8 часов. Если препарат не использован полностью в течение 8 часов, удалите остатки приготовленного спрея в отходы.
- Перед первым использованием подготовьте дозатор, распылив продукт 4 раза. После заполнения обязательно уточните, в течение

какого времени продукт пригоден к использованию. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом или фармацевтом.

- Вдохните одно впрыскивание в каждую ноздрю. Некоторые препараты нужно вводить повторно, распыляя еще по 1 разу в каждую ноздрю спустя 15 минут. Некоторые препараты нужно вводить повторно, распыляя еще по 1 разу в каждую ноздрю, только если головная боль появилась снова или если облегчение неполное. Делайте это, только если это разрешено или предписано Вашим лечащим врачом. Убедитесь, что Вы точно знаете, как применять данный препарат. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, задайте их своему врачу.
- Во время и сразу после впрыскивания препарата не запрокидывайте голову назад и не вдыхайте через нос.

## Назальный порошок:

- Только для носа.
- Убедитесь, что вы точно знаете, как применять данный препарат. Прочитайте инструкцию, вложенную в упаковку с этим препаратом. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.
- Принимайте данный препарат как можно раньше после начала приступа.
- Препарат не нуждается в проверке или подготовке перед применением.
- Снимите круглый синий язычок с синей насадки. Вставьте синюю насадку в одну ноздрю. Трижды сожмите белую воздушную помпу. Сжимайте помпу быстро и полностью. Не следует сжимать помпу медленно, частично или с задержками. Между сжатиями позвольте белой воздушной помпе вернуться к первоначальной форме.
- Если головная боль вернулась или если облегчение неполное, можно ввести еще 1 дозу, в случае если это разрешено Вашим лечащим врачом. Вторую дозу можно вводить только спустя 1 час после первой. Если требуется вторая доза, используйте новое устройство.
- На протяжении 24 часов следует применять не более 2 доз.

## Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Данный лекарственный препарат следует принимать по мере необходимости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

## Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

### Спрей для носа:

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.

### Назальный порошок:

- Храните при комнатной температуре.
- Не вынимайте этот лекарственный препарат из упаковки, пока не будете готовы его принять.

### Инъекция:

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.
- Предохраняйте от света.

### Ампулы:

- Берегите от жары.

### Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или

препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя

всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Дата последнего пересмотра**

2025-05-30

## **Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.  
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Dihydroergotamine - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center