



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Dronabinol

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Marinol; Syndros

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для улучшения аппетита.
- Применяется для лечения тошноты и рвоты.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас когда-либо диагностировали расстройство, связанное с употреблением алкоголя или наркотиков.
- Если у вас когда-либо были психические или поведенческие нарушения.
- Если Вы принимаете какие-либо лекарственные препараты (как рецептурные, так и отпускаемые без рецепта, натуральные препараты и витамины), которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом - например, некоторые лекарственные препараты для

лечения кашля или простуды, таблетки для похудения, препараты для лечения психических или эмоциональных нарушений, либо стимуляторы (такие как амфетамины). Существует большое количество лекарственных препаратов, которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом.

- Если вы беременны или можете забеременеть. Не принимайте данный препарат во время беременности.
- Если Вы кормите грудью или планируете кормить грудью. Вам может потребоваться прекратить грудное вскармливание. Если врач говорит, что вы можете кормить ребенка грудью, необходимо будет регулярно проверять вес ребенка.

Капсулы:

- Если у Вас аллергия на кунжутное масло.

Жидкость (раствор):

- Если у Вас аллергия на алкоголь или в течение последних 2 недель Вы принимали дисульфирам или метронидазол. Применение данного лекарственного препарата в течение 2 недель после приема дисульфирама или метронидазола может вызвать спазмы, тошноту или рвоту, головную боль и гиперемию.
- Если у Вас стоит зонд для искусственного питания. Этот лекарственный препарат не применяется с некоторыми типами зондов для искусственного питания.

Дети:

- Если Ваш ребенок не доношен. Этот лекарственный препарат не применяется при определенном возрасте недоношенных детей.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах,

которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- После начала приема данного препарата или после увеличения его дозы может наблюдаться повышенное или пониженное кровяное давление. Изменения кровяного давления могут повышать риск падения. Пожилые люди и люди с сердечными заболеваниями могут быть подвержены более высокому риску изменений кровяного давления и падения. Проконсультируйтесь с врачом.
- Измеряйте кровяное давление и частоту сердечных сокращений в соответствии с указаниями врача.
- Избегайте употребления алкоголя во время приема этого препарата.
- Не курите и не используйте другие формы конопли (марихуаны) во время приема данного лекарственного препарата. Проконсультируйтесь с врачом.

- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением марихуаны, других форм каннабиса, рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Проконсультируйтесь с врачом, если вы часто пьете грейпфрутовый сок или едите грейпфруты.
- В начале применения данный препарат может вызывать изменения настроения. Убедитесь, что у Вас есть кто-то, кому Вы можете доверять, если Вам понадобится помощь во время применения данного препарата.
- Данный препарат может вызвать привыкание при длительном применении.
- Если вы резко прекратите прием данного препарата, у вас могут возникнуть признаки синдрома отмены. Сообщите врачу, если у вас возникнут какие-либо нежелательные явления.
- Если данный лекарственный препарат был принят по ошибке, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Данный препарат не одобрен для применения у детей. Тем не менее врач может принять решение о том, что польза применения данного лекарственного препарата превышает связанные с ним риски. Если Ваш ребенок получал данный лекарственный препарат, узнайте у врача о преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом при возникновении вопросов по поводу применения данного лекарственного препарата Вашим ребенком.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- При применении во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод. Если Вы беременны или забеременеете в период приема данного препарата, немедленно свяжитесь с лечащим врачом.

Жидкость (раствор):

- Не принимайте дисульфирам или метронидазол в течение 7 дней после

приема последней дозы данного препарата.

- Данный лекарственный препарат содержит спирт и пропиленгликоль. У преждевременно родившихся детей есть повышенный риск очень тяжелых, иногда смертельно опасных побочных эффектов, вызываемых пропиленгликолем. Если у Вас имеются вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Учащенное сердцебиение.
- Нарушение или потеря памяти.
- Рассеянность внимания.

- Изменение баланса.
- Спутанность сознания.
- Судороги.
- При появлении или усугублении боли в желудке, тошноты или рвоты.
- Язвы во рту.
- Ожог.
- Гиперемия (румянец).

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Чувство головокружения или сонливости.
- При ощущении «кайфа» (смех и хорошее настроение без особой на то причины).

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный

препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:

- Если Вы применяете данный лекарственный препарат для повышения аппетита, принимайте этот препарат за 1 час до обеда или ужина либо согласно указаниям врача.
- Если Вы применяете данный лекарственный препарат для лечения тошноты и рвоты, следуйте указаниям врача относительно приема данного препарата во время еды или независимо от приема пищи.

Жидкость (раствор):

- Этот препарат упакован в пластик. Если при получении вы обнаружите, что этот препарат не упакован в пластик, проконсультируйтесь с фармацевтом.
- Используйте только дозатор, продающийся вместе с лекарством.
- Принимайте данный препарат с полным стаканом воды.
- Этот препарат могут применять пациенты с питательными трубками. Применяйте в соответствии с указаниями. После применения данного препарата промойте питательную трубку.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Капсулы:

- Храните в прохладном месте при температуре ниже 59 °F (15 °C) или в холодильнике. Не замораживайте.

Жидкость (раствор):

- Невскрытые флаконы следует хранить в холодильнике. Не замораживать.
- После вскрытия упаковки хранить при комнатной температуре или в холодильнике. Все неиспользованные остатки препарата следует утилизировать по истечении 6 недель.

Все формы выпуска:

- Держите крышку плотно закрытой.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните этот препарат в защищенном месте, невидимом и недоступном для детей, и вне доступа других людей. В качестве защищенного места хранения препарата может выступать ящик или помещение, которые закрываются на ключ. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.

- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или

лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-05-29

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Dronabinol - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Дата последнего обновления

Декабрь 12, 2022

Learn about our [Health Information Policy](#).