Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Dupilumab

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Dupixent

Торговые наименования: Канада

Dupixent

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения экземы.
- Препарат используют для лечения астмы.
- Препарат применяется для лечения длительно протекающих заболеваний придаточных пазух носа с образованием полипов в носовой полости.
- Используется для лечения эозинофильного эзофагита.
- Применяется для лечения узловатого пруриго.
- Применяется для лечения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ).
- Он используется для лечения определенного типа крапивницы у некоторых людей.
- Этот препарат используется для лечения буллезного пемфигоида (БП).

- Применяется для лечения аллергического грибкового риносинусита (АГРС).

Для бронхиальной астмы и ХОБЛ:

- Не используйте этот препарат для лечения интенсивных обострений одышки. Используйте ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия). Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если вы недавно получили живую вакцину.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Для всех целей применения данного препарата:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты

и стоматологи.

- Если возможно, убедитесь, что ваша вакцинация актуальна до лечения этим препаратом.
- Перед любой вакцинацией проконсультируйтесь с врачом. Применение некоторых вакцин с данным лекарственным препаратом может увеличить вероятность возникновения инфекции либо снизить эффективность вакцины.
- Не следует резко прекращать прием стероидного препарата при переходе со стероидного препарата на данный препарат. Возможно, понадобится постепенное снижение дозы стероидного препарата, чтобы избежать развития побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если у вас бронхиальная астма, не изменяйте и не прекращайте применение противоастматических препаратов без согласования с лечащим врачом.
- После приема данного препарата у некоторых людей, имеющих высокий риск возникновения паразитарных инфекций, наблюдалось возникновение данных инфекций. Лечащий врач может провести исследование вашего кала на предмет паразитарной инфекции. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Применяйте данный лекарственный препарат у детей с осторожностью. У них может появиться больше побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.
- Если вы использовали этот препарат будучи беременной, скажите об этом лечащему врачу вашего ребенка.

Для лечения астмы:

- Для оптимального контроля и улучшения проблем с дыханием важно следить за тем, у вас всегда был запас этого препарата. Обязательно

пополняйте запасы до того, как препарат закончится.

- Немедленно позвоните своему врачу, если проблемы с дыханием ухудшаются, если ваш ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия) слабо помогает или если вам приходится чаще использовать ингалятор для быстрого купирования симптомов.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Для всех целей применения данного препарата:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки герпетической инфекции, такие как герпес, опоясывающий лишай, сильная головная боль, спутанность сознания, изменение зрения, покраснение глаз или боль в глазах.
- Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или ургентные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части живота или в области таза.
- Учащенное сердцебиение.
- Распухание железы.

- Головокружение или обморок.
- Тошнота или рвота.
- Признаки новых или усугубляющихся проблем с глазами, таких как изменение зрения или боль в глазах.
- Сыпь или покраснение на лице.
- Впервые выявленный или прогрессирующий псориаз.
- При применении этого препарата возникала боль в суставах, включая боль, затрудняющую ходьбу. Некоторых пациентов потребовалась госпитализировать. Сообщите своему лечащему врачу, если во время приема этого препарата у вас появятся новые или усилятся имеющиеся боли в суставах.

Для лечения астмы:

- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- При появлении или усугублении затрудненного дыхания.
- Боль в груди.
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Высокая температура, которая не понижается.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Боль, покраснение, воспаление или реакция в месте инъекции.
- Раздражение глаз или век.

- Сухие глаза.
- Боль в горле.
- Герпес.
- Признаки простуды.
- Нарушения сна.
- Зубная боль.
- Боль или спазмы в животе.
- Диарея.
- Мышечная боль.
- Боли в спине.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Он вводится в виде укола в подкожный жир верхней части бедра или области живота.

- Этот препарат можно вводить во внешнюю область плеча, если его вводит кто-то другой.
- Если Вы будете делать себе уколы, Ваш врач или медсестра научат Вас делать инъекции.
- Мойте руки до применения.
- Если ваша доза состоит не из 1, а из нескольких инъекций, делайте их в 2 разных места.
- Если препарат хранится в холодильнике, перед применением дайте ему нагреться до комнатной температуры. Если вы пользуетесь шприцем или шприц-ручкой на 200 мг, оставьте его/ее при комнатной температуре на 30 минут. Если вы пользуетесь шприцем или шприц-ручкой на 300 мг, оставьте его/ее при комнатной температуре на 45 минут. Если вы не знаете точно, как долго нужно выдерживать препарат при комнатной температуре перед применением, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Не нагревайте препарат.
- Не взбалтывайте.
- Беречь от прямых солнечных лучей.
- Не выполняйте инъекцию в участок кожи в радиусе 5 см (2 дюймов) от пупка.
- Если вы уронили шприц на твердую поверхность или если шприц поврежден, не используйте его.
- Не наносите на чувствительную или поврежденную кожу, кожу с кровоподтеками, рубцами или заметными венами.
- Этот лекарственный препарат бесцветен или имеет светло-желтый цвет. Препарат также может быть прозрачным или слегка перламутровым. Не используйте раствор, если он изменил цвет, помутнел, протекает или содержит примеси.
- Не вводите через одежду.
- При каждой инъекции меняйте место укола.
- Каждая шприц-ручка и каждый предварительно заполненный шприц

предназначены исключительно для однократного применения. После введения дозы утилизируйте использованную шприц-ручку или шприц.

- Всю оставшуюся порцию препарата после введения дозы следует выбросить.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Дозировка один раз в неделю:

- Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом, и начните новый график с даты введения этой дозы.

Если Вы принимаете данный препарат каждые 2 недели:

- Примите пропущенную дозу как только сможете, а затем вернитесь к вашему регулярному графику.
- Если после пропуска дозы прошло более 7 дней, дайте пропущенную дозу и придерживайтесь нового графика с даты приема этой дозы.

Если вы принимаете данный препарат раз в месяц:

- Примите пропущенную дозу как только сможете, а затем вернитесь к вашему регулярному графику.
- Если после пропуска дозы прошло более 7 дней, дайте пропущенную дозу и придерживайтесь нового графика с даты приема этой дозы.

Для всех целей применения данного препарата:

- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- Если Вы пропустили прием препарата и не уверены в том, что нужно

делать, свяжитесь с лечащим врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Храните в холодильнике. Не замораживайте.
- Храните в оригинальной упаковке для защиты от света.
- При необходимости препарат можно хранить при комнатной температуре не выше 25 °C (77 °F) до 30 дней. Запишите дату, когда вы достали препарат из холодильника. Если препарат хранился при комнатной температуре и не использовался в течение 14 дней, его следует выбросить.
- Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником

здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2026-07-02

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center