



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Fluoride

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Clinpro 5000; Denta 5000 Plus; Denta 5000 Plus Sensitive; DentaGel; Easygel; Easygel [OTC]; Fluoridex; Fluoridex Daily Renewal; Fluoridex Enhanced Whitening; Fluoridex Sensitivity Relief; FluoriMax 5000; FluoriMax 5000 Sensitive; Fluoritab [DSC]; Fraiche 5000 Dental [DSC]; Fraiche Rinse [OTC] [DSC]; Gel-Kam [OTC]; Just for Kids [OTC]; Just Right 5000; NaFrinse Daily Acidulated [DSC]; NaFrinse Daily/Neutral [DSC]; NaFrinse Drops [DSC]; NaFrinse Weekly [DSC]; NaFrinse [DSC]; Omni Gel [OTC]; Parodontax [OTC]; PerioMed [OTC]; PreviDent; PreviDent 5000 Booster Plus; PreviDent 5000 Dry Mouth; PreviDent 5000 Kids; PreviDent 5000 Ortho Defense; PreviDent 5000 Plus; Sensodyne Complete Protection [OTC]; Sensodyne Pronamel Kids [OTC]; Sensodyne Rapid Relief [OTC]; Sensodyne Repair & Protect [OTC]; Sensodyne Sensitivity & Gum [OTC]; Sensodyne Sensitivity Gum-Enam [OTC]; SF; SF 5000 Plus; Sodium Fluoride 5000 Enamel; Sodium Fluoride 5000 Plus; Sodium Fluoride 5000 PPM; Sodium Fluoride 5000 Sensitive

Торговые наименования: Канада

Butler Prophy Paste

Для чего используется этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Данную добавку используют для предотвращения образования

полостей.

Паста с фторидом натрия или нитратом калия

- Применяется для снижения чувствительности зубов.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: проблемы с костями, суставами, проблемы с почками или язвы.
- Если содержание фтора в питьевой воде составляет 0,6 или более частиц на миллион.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.

- Если Ваши зубы потемнели или на них появились пятна, обратитесь к стоматологу.
- Тщательно заботьтесь о зубах. Регулярно посещайте зубного врача.
- При проглатывании большого количества данный лекарственный препарат может оказывать вредное воздействие. При проглатывании большого количества данного лекарственного препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Сильная тошнота или рвота.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом или обратитесь за медицинской помощью, если Вас беспокоят любые побочные эффекты, или если побочные эффекты имеют стойкий характер.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Жевательные таблетки, жидкость (капли) или таблетки:

- Принимать независимо от приема пищи. Примите с пищей, если лекарство вызывает тошноту.
- Применяйте данный препарат перед сном после чистки зубов, если иное не рекомендовано врачом.
- Некоторые препараты следует принимать каждый день, другие — 1 раз в неделю. Следуйте указаниям врача.
- Не принимайте антациды, содержащие магний или алюминий, одновременно с данным лекарственным препаратом. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

- Не принимайте данный препарат в течение 2 часов после употребления молочных продуктов или продуктов, содержащих кальций.

Жидкость (капли):

- Аккуратно отмеряйте дозы жидкости. Используйте мерную емкость, которая входит в комплект с лекарством.
- Капли некоторых торговых марок необходимо смешивать с водой или фруктовым соком. Изучите, как необходимо принимать препарат используемой Вами торговой марки.

Жевательные таблетки:

- Перед проглатыванием тщательно разжуйте.
- Препараты некоторых торговых марок можно также растворять во рту. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Крем и паста для полости рта

- Применяйте вместо обычной зубной пасты, если иное не рекомендовано врачом.
- Чистите зубы в соответствии с указаниями, после чего сплюньте.
- Не проглатывайте данный препарат.
- Не пейте и не принимайте пищу в течение не менее 30 минут после применения данного препарата.

Паста с фторидом натрия или нитратом калия

- Тщательно прополощите рот ополаскивателем и выплюньте его.

Гель:

- Применяйте вместо обычной зубной пасты, если иное не рекомендовано врачом.
- Нанесите небольшое количество геля размером с горошину и хорошо распределите щеткой. Подержите препарат на зубах в течение

1 минуты, затем сплюньте.

- Не проглатывайте данный препарат.
- Не пейте и не принимайте пищу в течение не менее 30 минут после применения данного препарата.

Ополаскиватель для полости рта:

- Подержите его во рту столько, сколько было указано, а затем выплюньте.
- Не проглатывайте данный препарат.
- Не пейте и не принимайте пищу в течение не менее 30 минут после применения данного препарата.
- Некоторые продукты необходимо смешивать перед использованием. Если продукт необходимо перемешать, не перемешивайте его до тех пор, пока вы не будете готовы использовать его. Препарат следует применить сразу же после смешивания.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и

домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Жидкость (капли):

- Предохраняйте от света.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и

ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/known/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2024-07-12

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Fluoride - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center