



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Follitropin Beta

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Follistim AQ

Торговые наименования: Канада

Puregon

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для повышения шанса беременности.
- Этот препарат применяют для увеличения выработки сперматозоидов.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: заболевание надпочечников, опухоль головного мозга, рак молочной железы или другой гормоноиндуцированный рак, заболевание гипофиза или щитовидной железы.

Женщины:

- Если у Вас имеются любые из перечисленных ниже заболеваний: опухоль женских органов, увеличение яичников или кисты яичников, вагинальное кровотечение, причина которого неизвестна.
- Если Ваши яичники больше не вырабатывают яйцеклетки (первичная недостаточность функции яичников).
- Если Вы не способны забеременеть из-за нарушений со стороны половых органов.
- Если Вы беременны или можете забеременеть. Данный препарат не разрешен для применения во время беременности. Перед началом приема данного препарата Вы пройдете тест на беременность, чтобы подтвердить, что Вы НЕ беременны.

Мужчины:

- Если Вы неспособны вырабатывать сперму или у Вас опухоль в половых органах.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Выполняйте анализы крови и другие лабораторные анализы в соответствии с указаниями врача.

Женщины:

- Во время применения данного препарата понадобится пройти ультразвуковое обследование. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Этот препарат может увеличить вероятность возникновения многоплодной беременности.
- Применение данного лекарственного препарата может увеличивать риск развития очень тяжелых побочных эффектов, таких как увеличение яичников, образование и разрыв кист яичников. В редких случаях такие эффекты были смертельно опасными. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Если Ваши яичники станут слишком большими, лечащий врач может сказать Вам о необходимости воздержания от половых контактов. Половой акт может привести к разрыву кисты яичника. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный лекарственный препарат может увеличивать риск перекручивания яичников (перекрут яичника) у людей, имеющих определенные проблемы со здоровьем. Это может стать причиной прекращения кровоснабжения яичника. Проконсультируйтесь с врачом.
- У некоторых людей может возрасти риск внематочной (эктопической) беременности. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом. Немедленно обратитесь за медицинской помощью при появлении таких признаков, как вагинальное кровотечение, тошнота или рвота, боль в животе, боль в области таза или прямой кишки, боль в плече или шее,

головокружение, потеря сознания, тахикардия, бледная, потная или липкая кожа, спутанность сознания или другие серьезные или необычные эффекты.

- Ограничьте тренировки во время прохождения курса стимуляции яичников. Проконсультируйтесь с врачом.
- Частота невынашивания беременности (выкидыша) выше у людей, применяющих лекарственные препараты такого рода, чем у людей с обычной беременностью. Неизвестно, был ли этот эффект обусловлен применением этих препаратов. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.
- В редких случаях у пациенток, которые проходили такие процедуры многократно, чтобы забеременеть, наблюдались опухоли яичника. Неизвестно, может ли этот препарат являться причиной подобных явлений. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы кормите грудью. Необходимо проконсультироваться, не представляет ли препарат какого-либо риска для ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или

горла.

- Бледная кожа.
- При применении этого препарата регистрировались случаи тяжелых нарушений со стороны легких. В редких случаях эти нарушения приводили к смерти. При появлении симптомов заболеваний легких, таких как одышка или затрудненное дыхание, кашель или повышение температуры тела, немедленно обратитесь к врачу.
- Прием данного лекарственного препарата сопровождался развитием тромбоза. Иногда такие тромбы были смертельно опасными. Если у вас появились боль или давление в груди, руке, спине, шее или челюсти, кашель с кровью, онемение или слабость с 1 стороны тела, нарушение речи или мышления, нарушение равновесия или зрения, одышка, отечность, ощущение тепла или боль в ноге или руке, немедленно обратитесь к врачу.

Женщины:

- Нехарактерное вагинальное кровотечение.
- Синдром гиперстимуляции яичников (СГЯ) является очень тяжелым побочным эффектом и может возникать у некоторых людей, которые принимают данный лекарственный препарат. Если этот эффект возникнет, он может быстро ухудшиться. Немедленно обратитесь к врачу, если у вас сильная боль в животе или вздутие живота, сильная тошнота, рвота или диарея, значительная прибавка в весе, одышка или изменение количества выделяемой мочи.

Мужчины:

- Увеличенная грудь.
- Уплотнение или боль в области яичек.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих

людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Раздражение в месте инъекции.
- Тошнота.
- Угри.
- Головная боль.
- Ощущение усталости или слабости.

Женщины:

- Тазовая боль.
- Боль в кишечнике.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1- 800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Для инъекций.
- Если Вы будете делать себе уколы, Ваш врач или медсестра научат Вас делать инъекции.
- Мойте руки до и после применения.
- Изменяйте место введения этого препарата в соответствии с указаниями врача.
- Если препарат хранится в холодильнике, перед применением доведите его до комнатной температуры.
- Не применяйте, если раствор мутный, протекает или содержит частицы.
- Не используйте, если раствор изменит цвет.
- Не наносите на участки с болезненностью, наличием кровоподтеков, покраснением или затвердением кожи.
- Эта шприц-ручка не предназначена для самостоятельного использования слабовидящими людьми. Если вы плохо видите, вам может потребоваться помощь другого человека для выполнения этой инъекции. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Во время приготовления дозы вы можете слышать щелчки. Не отмеряйте дозу путем подсчета щелчков. Это может привести к введению ошибочной дозы.
- Перед инъекцией снимите с иглы шприц-ручки все наконечники (их может быть 2). Если вы не уверены, к какому типу принадлежит игла шприц-ручки или как правильно использовать иглу, обратитесь за пояснениями к врачу.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иглолок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Не делитесь шприцами-ручками или картриджами с другими лицами, даже если была заменена игла. При обмене данными устройствами

может происходить передача инфекций от одного человека другому. Это также касается инфекций, о наличии которых у себя Вы можете и не подозревать.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Неоткрытые упаковки следует хранить в холодильнике. Не замораживайте.
- Невскрытые флаконы при необходимости можно хранить при комнатной температуре до 3 месяцев. Если препарат хранился при комнатной температуре и не применялся в течение 3 месяцев, его следует выбросить.
- Храните в картонной коробке для защиты от света.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Картриджи:

- После прокола резиновой мембраны иглой хранить в холодильнике или при комнатной температуре. Все неиспользованные остатки необходимо выбросить по истечении 28 дней.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны

проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-03-25

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Follitropin Beta - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center