



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Guaifenesin and Dextromethorphan

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Altarussin DM [OTC]; Chest Congestion Relief DM [OTC]; Coricidin HBP Congestion/Cough [OTC]; Cough & Chest Congestion DM [OTC]; Cough/Chest Congestion DM [OTC] [DSC]; CuraNEX DM [OTC]; Delsym Cgh/Chest Cong DM Child [OTC]; Delsym Cough/Chest Congest DM [OTC]; Fenesin DM IR [OTC]; FT Chest Congestion Relief DM [OTC]; FT Mucus Relief DM [OTC]; FT Tussin DM Adult [OTC]; FT Tussin DM Max Adult [OTC]; FT Tussin DM [OTC]; Geri-Tussin DM [OTC]; GoodSense Mucus Relief DM [OTC]; Guaiasorb DM [OTC]; Guaicon DMS [OTC] [DSC]; Guaifed-DM [OTC]; Max Tussin DM Cough&Chest Cong [OTC]; Maxi-Tuss G [OTC]; Maxi-Tuss GMX [OTC]; Mucinex

Childrens Freefrom [OTC] [DSC]; Mucinex Childrens [OTC]; Mucinex Cough & Chest Congest [OTC]; Mucinex Cough Childrens [OTC]; Mucinex Cough For Kids [OTC] [DSC]; Mucinex DM Maximum Strength [OTC]; Mucinex DM [OTC]; Mucinex Fast-Max DM Max [OTC]; Mucinex Fast-Max Severe Con/Cg [OTC]; Mucolyte-DM [OTC]; Mucus Relief Cough Childrens [OTC] [DSC]; Mucus Relief DM ER Max Str [OTC]; Mucus Relief DM Max [OTC]; Mucus Relief DM [OTC]; NeoTuss [OTC]; Pharinex-DM [OTC]; Refenesen DM [OTC]; Robafen DM Cgh/Chest Congest [OTC] [DSC]; Robafen DM Cough [OTC]; Robafen DM [OTC]; Robitussin Cough & Chest Adult [OTC]; Robitussin Cough & Chest Child [OTC]; Robitussin Cough+Chest Cong DM [OTC]; Robitussin Honey Cgh/Chest DM [OTC]; Siltussin DM DAS [OTC] [DSC]; Siltussin-DM Alcohol Free [OTC] [DSC]; Tussin Cough+Chest Cong DM SF [OTC] [DSC]; Tussin Cough+Chest Congest DM [OTC] [DSC]; Tussin DM Cough & Chest Conges [OTC]; Tussin DM Max [OTC]; Tussin DM [OTC]; Vanacof XP [OTC]

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Способствует разжижению слизи, поэтому она легко удаляется при кашле.
- Используется для облегчения кашля.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом

данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас кашель с большим количеством мокроты, продолжительный кашель, вызванный курением или вдыханием сигаретного дыма, а также такими нарушениями со стороны легких, как астма или эмфизема.
- Если на протяжении последних 14 дней вы принимали лекарственные препараты, применяемые при депрессии или болезни Паркинсона. К ним относятся изокарбоксазид, фенелзин, транилципромин, селегилин или разагилин. Может возникнуть эпизод очень высокого кровяного давления.
- Если вы принимаете любой из следующих препаратов: линезолид или метиленовый синий.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете

(как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Не принимайте более предписанного врачом количества. В противном случае может увеличиться риск возникновения тяжелых побочных эффектов.
- Не принимайте данный лекарственный препарат дольше предписанного врачом периода времени.
- Если Вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или бессолевой диеты, сообщите об этом врачу. Некоторые из этих препаратов содержат натрий.
- Если у Вас фенилкетонурия, проконсультируйтесь с

врачом. В некоторых продуктах содержится фенилаланин.

- Некоторые формы выпуска этого препарата могут быть не предназначены для применения у детей любого возраста. Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,

стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом или обратитесь за медицинской помощью, если Вас беспокоят любые побочные эффекты, или если побочные эффекты имеют стойкий характер.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:

- Принимать независимо от приема пищи. Примите с пищей, если лекарство вызывает тошноту.
- Пейте много жидкости, не содержащей кофеина, если только врач не указал пить меньше жидкости.

Таблетки и капсулы:

- Принимайте данный препарат с полным стаканом воды.

Жидкость:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.

Таблетки пролонгированного действия:

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не

раздробляйте.

- Принимайте данный препарат с полным стаканом воды.

Гранулы:

- Содержимое пакета следует высыпать на язык и проглотить. Во избежание появления неприятного привкуса — глотайте не разжевывая.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте.

Не хранить в ванной.

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не

должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра
2025-10-07

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Guaifenesin and Dextromethorphan - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center