



## ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Imiquimod

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Торговые наименования: США

Zyclara Pump; Zyclara [DSC]

### Торговые наименования: Канада

Aldara P; TARO-Imiquimod Pump; Vyloma; Zyclara

### Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения остроконечных кондилом.
- Применяется для лечения остроконечных кондилом в области заднего прохода.
- Применяется для лечения кожи, пострадавшей от воздействия солнечных лучей, и лечения некоторых видов рака кожи.

### Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом

## данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- При нарушении процесса заживления кожи после другого лечения или операции.
- Если Вы применяете другой препарат, в состав которого входит такое же действующее вещество.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

### **Для всех целей применения данного препарата:**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Пройдите осмотр кожных покровов в соответствии с указаниями врача.
- Вы может быстро обгореть. Избегайте прямого солнечного света, солнечных ламп и соляриев для загара. Используйте солнцезащитные зонты, носите одежду длинную одежду и солнцезащитные очки.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

### **Для лечения остроконечных кондилом в области половых органов или заднего прохода:**

- Данный лекарственный препарат не предназначен для лечения остроконечных кондилом в области половых органов и заднего прохода. Во время использования данного лекарственного препарата у Вас могут появиться новые кондиломы. Если Вы заметили появление новых кондилом,

проконсультируйтесь с врачом.

- Презервативы или диафрагмы не гарантируют стопроцентной защиты от беременности. Во время приема данного препарата применяйте другие противозачаточные средства.
- Избегайте любой сексуальной активности, пока этот препарат находится на коже вашей генитальной или анальной области.

### **Для актинического кератоза:**

- Если вы кормите грудью, проследите, чтобы этот препарат не попал в рот или глаза вашего ребенка. Не наносите этот препарат на участки, которые могут тереться о лицо вашего ребенка.

### **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

### **Для всех целей применения данного препарата:**

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Симптомы, напоминающие грипп. Включают головную боль, слабость, высокую температуру, лихорадку, боли и потливость.
- Кровотечение.
- Распухание железы.
- Во время применения этого препарата возможно развитие кожных реакций в месте нанесения препарата или вокруг него. К этим реакциям могут относиться жжение, образование корки, сухость, шелушение, зуд, мокнутие кожи, боль, покраснение, образование струпьев, пластинчатое шелушение, образование воспаленных ранок или язв и отечность кожи. Если эти реакции протекают очень тяжело, может понадобиться временная отмена лечения этим препаратом в соответствии с указаниями врача. Смойте препарат с пораженного участка мягким мылом и водой, а затем проконсультируйтесь с врачом.

- Немедленно свяжитесь с врачом в случае возникновения у Вас кожной реакции, которая Вас беспокоит, или если из-за такой реакции Вам трудно продолжать наносить этот лекарственный препарат на данный участок кожи. Немедленно обратитесь к врачу в случае возникновения у Вас кожной реакции, которая создает Вам трудности в повседневной жизни.

**Для лечения остроконечных кондилом в области половых органов или заднего прохода:**

- Вагинальная боль или воспаление.
- Непроходимость мочевыводящих путей.

**Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Изменение цвета кожи. Это изменение может быть необратимым.
- Головная боль.

- Тошнота.
- Ощущение усталости или слабости.
- Признаки простуды.
- Боль в придаточных пазухах носа.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

### **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Все формы выпуска:**

- Не применяйте в большей дозе или дольше, чем Вам назначено. Это может повысить риск очень тяжелой кожной реакции или другого побочного эффекта.
- Не следует принимать этот препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза (возможен ожог).
- Не вводите во влагалище или анус.
- Принимайте перед сном.
- Мойте руки до и после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Перед нанесением этого препарата убедитесь, что место нанесения хорошо просохло (в течение как минимум 10 минут).
- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Не наносите препарат на кожу с солнечными ожогами.
- Не наносите на порезы, царапины, ожоги, сыпь, а также на инфицированную или поврежденную кожу.
- Не наносите препарат на здоровую кожу, за исключением тех случаев, когда это назначено врачом.
- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты,

повязки), если иное не предписано врачом.

- После нанесения не принимайте ванну или душ и не занимайтесь плаванием.
- Оставьте на коже на указанный промежуток времени, после чего смойте водой.

### **Для лечения остроконечных кондилом в области половых органов или заднего прохода:**

- Если Вы мужчина, не прошедший процедуру обрезания, и у Вас имеются бородавки под крайней плотью, оттягивайте крайнюю плоть и очищайте область под ней каждый день.

### **Для актинического кератоза:**

- Прежде чем наступит улучшение, количество очагов может увеличиться. Продолжайте наносить препарат в соответствии с указаниями.
- Продолжайте использовать этот препарат в соответствии с указаниями вашего врача или другого медицинского работника, даже если участки кожи выглядят здоровыми.

### **Пакеты:**

- Выбросьте все неиспользованные порции из упаковки после применения.

## **Дозатор:**

- Подготовьте распылитель перед первым применением.
- Вам не нужно будет повторно заполнять помпу во время использования этого препарата.

## **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

- Пропустите забытую дозу и вернитесь к своему обычному графику.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

## **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

### **Все формы выпуска:**

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть

вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

### **Дозатор:**

- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.

### **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного

препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и

уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

**Дата последнего пересмотра**

2024-11-01

**Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Imiquimod - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center