Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Lidocaine (Topical

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

7T Lido [DSC]; Abreva Rapid Pain Relief [OTC]; Alocane Emergency Burn Max Str [OTC] [DSC]; Alocane First Aid Spray [OTC]; Alocane Max Emer Burn w/ Anti [OTC]; Alocane Max [OTC]; Alocane Plus [OTC]; AneCream [OTC]; AneCream5 [OTC]; AnievaLC Max St [OTC]; AnLido 24 [OTC] [DSC]; Asperflex Lidocaine [OTC]; Asperflex Max St [OTC] [DSC]; Asperflex Pain Relieving [OTC]; Astero; Bactine Max Dry Spray [OTC]; Bactine Max Spray [OTC]; Bactine Max [OTC]; Blue Tube/ Aloe [OTC] [DSC]; Bruselix; Burn Gel [OTC]; Cinthera [OTC]; Collavera; DermacinRx Lidocaine; DermacinRx Lidocaine [OTC]; DermacinRx Lidogel; Dr Butler Hemorrhoid-Fissure [OTC]; Eha; First Care Pain Relief [OTC] [DSC]; FT Pain Relief Max Strength

[OTC]; Gen7T [DSC]; Glydo; GoodSense Burn Relief [OTC]; HealthWise Pain Relief [OTC]; HurriCaine One (Lidocai-Benz) [OTC]; Jelcaine Sterile [OTC]; LDO Plus; LevigoSP [OTC]; Lidexa; LidexaGel; Lido King [OTC] [DSC]; Lido-Sorb; Lidocaine Max St 24 Hours [OTC]; Lidocaine Pain Relief Max St [OTC]; Lidocaine Pain Relief [OTC]; Lidocaine Pain Relieving [OTC]; Lidocaine Plus [OTC]; Lidocan; Lidocanna [OTC]; Lidocore [OTC]; Lidoderm; LidoDose Pediatric Bulk Pack [OTC]; LidoDose [OTC]; Lidoease [OTC]; Lidoflect [OTC]; LidoFore Flexipatch [OTC] [DSC]; LidoGuard [OTC]; LidoLite [DSC]; Lidomar [OTC]; Lidomax; Lidonumb [OTC]; Lidopin; LidoPure Patch; Lidorex; LidoRx; Lidoryx; Lidosol [DSC]; Lidosol-50 [DSC]; LidoSpra; Lidotral; Lidotral 1 [DSC]; Lidotral Roll-On; Lidotran; Lidotrode [OTC]; Lidovara; Lidovix L; Lidovyx [OTC]; Lidozall Plus [OTC]; Lidozall Pro [OTC]; Lidozall [OTC]; Lipocaine 5 [OTC]; LMX 4 Plus [OTC]; LMX 4 [OTC]; LMX 5 [OTC]; Lubricaine [OTC]; Lydexa; Medi-First Burn Spray [OTC]; Moxicaine [DSC]; Neurocaine [OTC]; Neurozyl; NumbCream [OTC] [DSC]; Numyra; Nuvexa; Pain Relief Max Str [OTC]; Pain Relief Maximum Strength [OTC]; Pharmacist Choice Lidocaine [OTC]; Pharmacist Choice Pain Relief [OTC] [DSC]; Premium Lidocaine [DSC]; Proxivol; RadiaGuard Advanced [OTC]; Re-Lieved Maximum Strength [OTC]; RectaEase [OTC]; Rectalief [OTC]; RectaSmoothe [OTC] [DSC]; RectiCare [OTC];

RectoProtect [OTC]; Relevea [OTC]; Salonpas Pain Relieving [OTC]; Solarcaine Burn Pain Relief [OTC]; Spravex; Sun Burnt Plus After-Sun [OTC]; Sun Burnt Plus [OTC] [DSC]; TheraCare Lidocaine Max Str [OTC]; TheraCare Pain Relief [OTC]; Theraworx Diabet Pain Roll-On [OTC]; Theraworx PM Pain Relf Roll-On [OTC]; Topicaine 5 [OTC]; Topicaine Ultra [OTC]; Topicaine [OTC]; Tridacaine II [DSC]; Tridacaine III; Trilocaine [DSC]; Trilogel [OTC]; True Lido [OTC] [DSC]; Ultra Lido [OTC] [DSC]; Venipuncture Px1 Phlebotomy; XeroBurn [OTC]; Xolido XP [OTC] [DSC]; Xolido [OTC] [DSC]; Xyliderm; Zingo [DSC]; Zionodil; Zionodil 100; ZTlido; ZyloRelief [OTC]; Zylotrol-L [OTC] [DSC]

Торговые наименования: Канада

Cathejell; Jelido; Lidodan; Lidodan Endotracheal; Xylocaine; Xylocaine Spray

Предупреждение
Вязкий лидокаин

- У детей младше 3 лет отмечались очень тяжелые нарушения (такие как судороги и остановка сердца) и случаи смерти. В этих случаях данный препарат применялся не так, как было рекомендовано. Не применяйте данный препарат для лечения младенцев и детей с болью при прорезывании зубов. Проконсультируйтесь с врачом.
- У детей младше 3 лет данный препарат следует применять только в тех случаях, когда применение других препаратов невозможно. В случае применения у ребенка младше 3 лет по другим показаниям, помимо боли при прорезывании зубов, следуйте инструкциям врача. Проконсультируйтесь с врачом.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для купирования боли.
- Применяется для лечения болезненных нервных заболеваний.
- Применяется для лечения симптомов геморроя и

раздражения прямой кишки.

- Применяется для облегчения боли, вызванной опоясывающим лишаем.
- Этот препарат применяют для лечения ран в полости рта.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?
Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

Ректальный крем, ректальный гель и все препараты для нанесения на кожу:

- Если в месте применения препарата инфекция.
- Если на участке, на котором будет применяться препарат, имеются повреждения кожи или открытые раны.
- Если кожа в области применения препарата воспалена, онемела или не воспринимает болевые

ощущения.

Все средства для кожи:

- В случае необходимости применения на большом участке поверхности кожи.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?
Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат.

Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.

- При применении лекарственных препаратов, подобных этому, возникало тяжелое нарушение со стороны крови под названием «метгемоглобинемия». Риск этого нарушения может быть повышен у пациентов с дефицитом глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы (Г6ФД) и с заболеваниями сердца или легких. Риск также может возрастать при применении некоторых других лекарственных препаратов, а также у младенцев в возрасте до 6 месяцев. Если у вас когда-либо обнаруживалась метгемоглобинемия, сообщите об этом врачу.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете

забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Ректальный крем, ректальный гель и все препараты для нанесения на кожу:

- Перед нанесением на кожу других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с врачом. Это касается и мыла.
- Не принимайте данный препарат дольше предписанного врачом периода времени.
- Не расчесывайте и не растирайте онемевшую кожу. Не допускайте сильного нагревания или охлаждения.
- Не наносите на порезы, царапины или поврежденные участки кожи, только если врач не рекомендовал иное.
- Откажитесь от использования источников тепла (например, ламп солнечного света, соляриев, грелок, электрических одеял, инфракрасных ламп, саун, джакузи, водяных матрасов с подогревом). Избегайте длительного приема горячих ван или солнечных ванн. Температура тела может повыситься, что приведет к проникновению в организм слишком большого количества препарата.

Ректальный крем, ректальный гель и препараты для

нанесения на кожу, кроме накожного пластыря и трансдермальной терапевтической системы:

- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Накожный пластырь и трансдермальная терапевтическая система:

- Если у Вас появилось жжение или другое раздражение в месте наложения этого препарата, снимите его. Подождите, пока не исчезнет раздражение, и наденьте его снова.
- Вы можете носить одежду поверх того места, куда нанесен этот препарат.
- Разжевывание или проглатывание этого препарата может причинить вред. Это также относится к использованным пластырям. В случае приема этого лекарственного препарата внутрь немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Кожный пластырь:

- Пластырь необходимо предохранять от влаги. В случае намокания он может не приклеиться. Во

время ношения пластыря нельзя купаться, плавать или принимать душ.

- Для некоторых из этих продуктов вам потребуется подождать не менее 1 часа после снятия пластыря перед купанием, приемом душа или плаванием. Вы также не должны накладывать пластырь сразу после ванны или душа. Убедитесь, что вы знаете, как правильно использовать этот продукт с водой.

Трансдермальная терапевтическая система (Bondlido):

- Пластырь необходимо предохранять от влаги. В случае намокания он может не приклеиться. Во время ношения пластыря нельзя купаться, плавать или принимать душ.

Трансдермальная терапевтическая система (ZTlido):

- Эту кожную систему на короткое время можно опустить в воду. Она позволяет принимать душ в течение 10 минут или купаться в течение 15 минут. После того, как она намокнет, высушите ее, мягко промакивая кожу. Не трите кожу или кожную систему.
- Пластырь можно прикреплять после умеренного нагревания, например на электрогрелке в режиме среднего нагрева в течение 15 минут. Во время

ношения пластыря также допустимы умеренные физические нагрузки, например езда на велосипеде в течение 30 минут.

Все пероральные препараты:

- Не принимайте пищу, пока не пройдет чувство онемелости во рту. Вы можете нанести себе ущерб, прикусив язык.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность

в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Симптомы повышения кислотности крови (ацидоза), такие как спутанность сознания, учащенное дыхание, тахикардия, нарушение сердцебиения, очень сильная боль в животе, тошнота или рвота, выраженная сонливость, одышка, повышенная утомляемость или слабость.
- Признаки метгемоглобинемии, такие как синюшный или серый оттенок губ, ногтей или кожи; ощущение ненормального сердцебиения; судороги; тяжелое головокружение или потеря сознания; тяжелая головная боль; сильная сонливость; чувство усталости или слабости; одышка. Такое действие возникает редко, но в случае развития может привести к смертельному исходу.
- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.
- Сильное онемение и покалывание.
- Головокружение, сонливость, спутанность сознания или нечеткость зрения.
- Судороги.
- Изменение зрения.
- Нервное напряжение и возбужденность.

- Головокружение или обморок.
- Звон в ушах.
- Тошнота или рвота.
- Чувство жара или холода.
- Тремор.
- Подергивание.
- Брадикардия.
- Боль в груди.

Все средства для кожи:

- Признаки кожной инфекции, такие как мокнутие, повышение температуры, отек, покраснение или боль.

Все лекарственные препараты для ректального применения:

- Боль в прямой кишке или ректальная боль.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные

эффекты вас беспокоят или не проходят:

Ректальный крем, ректальный гель и препараты для нанесения на кожу, кроме накожного пластыря и трансдермальной терапевтической системы:

- Раздражение в месте применения препарата.
- Воспаление.
- Краснота.
- Изменение цвета кожи.

Накожный пластырь и трансдермальная терапевтическая система:

- Во время и сразу после лечения часто регистрируются реакции со стороны кожных покровов в месте наложения лекарства. Это могут быть волдыри, синяки, жжение или необычные ощущения, изменение цвета, отек, покраснение, боль, зуд, отслаивание кожи, шелушение или высыпания. В большинстве случаев указанные реакции со стороны кожных покровов исчезают в течение нескольких минут или часов. Обратитесь к врачу, если у вас отмечается какая-либо реакция со стороны кожных покровов тяжелой степени, беспокоящая вас или длительно сохраняющаяся.

Данный список возможных побочных эффектов не

является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Ректальный крем и гель:

- Мойте руки до и после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Наносите данный препарат в соответствии с инструкциями врача или указаниями на этикетке.

Все средства для кожи:

- Не следует принимать этот препарат внутрь. Только для нанесения на кожу. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза (возможен ожог).
- Если препарат попал на какую-то из этих областей, хорошо смойте его водой.
- Мойте руки до и после применения. Если обрабатываемый участок находится на руке, не мойте руки после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.
- Наносите на чистую, сухую, здоровую кожу.
- Не накладывайте какие-либо покрытия (бинты, повязки), если иное не предписано врачом.

Жидкая форма для наружного применения и аэрозоль:

- Данный препарат способен к возгоранию. Не используйте вблизи открытого огня или во время курения.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

Аэрозоль:

- Некоторые продукты не предназначены для использования на лице. Если обрабатываемая область находится на лице, убедитесь, что вы знаете, можно ли использовать этот продукт на лице.
- При нанесении спрея на лицо попрыскайте лекарство на ладонь или марлю и приложите ее к лицу.

Накожный пластырь и трансдермальная терапевтическая система:

- Наносите на наиболее болезненные участки кожи.
- Отрежьте часть пластыря для покрытия пораженной кожи.
- Прикрепляйте пластырь приблизительно в одно и то же время дня.
- Различные продукты могут оставаться нанесенными на кожу в течение разных периодов времени. Убедитесь, что вы знаете, как долго этот лекарственный препарат должен оставаться нанесенным до снятия. Убедитесь, что вы знаете, какой должен быть перерыв перед наклеиванием нового пластыря или накожной системы. Не наносите препарат на больший срок, чем было назначено. При возникновении вопросов побеседуйте с врачом.

- Не наносите больше кожных пластырей или систем, чем вам назначил врач.
- Если кожная система или пластырь отклеиваются по краям, плотно прижмите края. Если он оторвется, попробуйте надеть его снова. Если вы не можете снова укрепить прежний кожный пластырь или систему, наденьте новый.
- После снятия пластыря или трансдермальной терапевтической системы согните его/ее пополам, соединив между собой клейкие стороны. Выбросьте использованный пластырь, систему и кусочки, оставшиеся после отрезания, в отходы, к которым не имеют доступа дети и домашние животные.
- Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не применяйте вблизи открытого огня или во время курения.

Все пероральные препараты:

- При использовании для полоскания рта следует полоскать ротовую полость как можно дольше. Следует проглотить или выплюнуть, в зависимости от рекомендаций.
- При использовании ватного тампона наносите препарат на поврежденный участок в соответствии с рекомендациями врача или указаниями в инструкции

по применению препарата.

- Воздержитесь от приема пищи в течение как минимум 60 минут (1 часа) после применения данного лекарственного препарата.

Жидкость для полости рта:

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Аккуратно отмеряйте дозы жидкости.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Если вы принимаете препарат регулярно, примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозу.
- В большинстве случаев данный препарат применяется по мере необходимости. Не применяйте препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Храните при комнатной температуре.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Все препараты для нанесения на кожу, кроме накожного пластыря и трансдермальной терапевтической системы:

- Не замораживайте.

Жидкая форма для наружного применения и аэрозоль:

- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.

Аэрозоль:

- Не протыкать.

Накожный пластырь и трансдермальная терапевтическая система:

- Храните данное средство в прилагаемом конверте, чтобы оно было недосягаемым для детей. Открывайте конверт непосредственно перед применением средства.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка

препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски

или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра
2026-09-10

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Lidocaine (Topical - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center