Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Naloxone

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

FT Naloxone HCl [OTC]; Kloxxado; Narcan [DSC]; Narcan [OTC]; Rextovy; Rezenopy; RiVive [OTC]; Zimhi [DSC]

Торговые наименования: Канада

Narcan; S.O.S. Naloxone Hydrochloride; TEVA Naloxone

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяют для предупреждения побочных эффектов некоторых препаратов.
- Данный препарат используется для лечения передозировки некоторых лекарств.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- У лиц с расстройствами, связанными с употреблением опиоидов, могут появиться признаки синдрома отмены опиоидов на фоне приема данного лекарственного препарата. Некоторые из этих признаков — потливость, тремор, высокая температура, озноб, диарея, тошнота, рвота, спазмы в животе, гусиная кожа, боли в теле, тревога, чувство раздражительности, зевота и учащенное сердцебиение.
- У новорожденных до 4 недель, регулярно получавших опиоидные препараты, внезапная отмена препарата может стать угрожающим жизни состоянием, если немедленно не начать лечение. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка появились судороги, либо он плачет больше обычного, либо у него отмечается повышение рефлексов.
- Проконсультируйтесь с врачом по поводу оптимальной формы этого препарата для приема у детей.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или

кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

- При применении во время беременности, препарат может вызывать синдром отмены у еще не родившегося ребенка. После применения данного препарата врач должен провести обследование еще не родившегося ребенка.

Продукция в инъекционной форме, отличная от автоматических медицинских шприцев и предварительно заполненных шприцев:

- Зарегистрированы случаи очень тяжелых побочных эффектов, когда данный лекарственный препарат применялся после хирургического вмешательства. Среди них повышенное или пониженное кровяное давление, нарушения сердечного ритма, а также некоторые другие нарушения со стороны легких или сердца. В некоторых случаях такие побочные эффекты приводили к нарушениям со стороны головного мозга, коме или смерти. Проконсультируйтесь с врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие

как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.

- Судороги.
- Одышка.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Перемены настроения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Спрей для носа:

- Мышечная боль.
- Мышечный спазм.
- Головная боль.
- Сухость в носу.
- Насморк или заложенность носа.
- Отек слизистой носа.
- Запор.
- Зубная боль.
- Сухая кожа.

- Боль в кишечнике.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Головокружение.
- Ощущение усталости или слабости.
- У некоторых людей могут быть такие симптомы, как потливость, тремор, тошнота или чувство гнева, когда они просыпаются после приема этого препарата. Это нормально.

Все инъекционные препараты:

- Тошнота или рвота.
- Головокружение.
- Раздражение в месте инъекции.
- Приливы.
- Гиперемия (румянец).

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Назальный спрей, автоматический шприц для инъекций и предварительно заполненные шприцы :

- Убедитесь, что вы знаете признаки передозировки и когда использовать этот препарат. Если вы не уверены, посоветуйтесь с врачом.
- Способ применения нужно изучить до возникновения неотложной ситуации. Прочитайте листок-вкладыш, содержащийся в упаковке с лекарством. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.
- Для введения этого препарата может понадобиться чья-то помощь. Убедитесь, что окружающие знают, где хранится данный препарат, а также как при необходимости его вводить.
- После введения этого препарата симптомы передозировки могут проходить и появляться снова. После применения данного препарата важно немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Каждое из приспособлений содержит только 1 дозу и не подлежит повторному использованию. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, используйте новое приспособление.
- Если срок годности этого препарата истекает, обратитесь за новым рецептом до того, как понадобится новая доза.

Спрей для носа:

- Только для носа.
- Для одного применения используется 1 распыление.
- При применении более 1 дозы каждую дозу нужно вводить в разный носовой проход.
- Не вынимайте этот препарат из упаковки или блистера, пока не будете готовы использовать его. Не заполняйте распылитель и не тестируйте его до использования.
- Если препарат был заморожен, некоторые торговые марки допускают

его оттаивание при комнатной температуре перед использованием. В неотложной ситуации не ждите оттаивания препарата. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предварительно заполненные шприцы и автоматические инъекторы:

- Для внутримышечных или подкожных инъекций.
- Делайте инъекцию прямо во внешнюю сторону бедра согласно инструкциям. Этот лекарственный препарат можно вводить через одежду, если необходимо. Введите и держите столько, сколько Вам сказали.
- Не применяйте данный препарат, если раствор изменил цвет, помутнел или содержит частицы. Возьмите новый.

Все остальные инъекционные препараты:

- Для внутримышечных, внутривенных или подкожных инъекций.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Спрей для носа:

- Хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре.
- Не храните при температуре выше 104 °F (40 °C).
- Не замораживайте.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.

Предварительно заполненные шприцы и автоматические инъекторы:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Храните в выданной вам коробке для защиты от света.

Все остальные инъекционные препараты:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие

информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2026-02-23

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Naloxone - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center