



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Peanut Allergen Powder

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Palforzia

Предупреждение

- При применении данного лекарственного препарата отмечалось возникновение аллергических реакций. Некоторые реакции изредка могут быть очень тяжелыми или угрожающими жизни. Проконсультируйтесь с врачом.
- При введении первой дозы и всякий раз, когда потребуется повысить дозу относительно прежнего уровня, пациент будет находиться в медицинском учреждении.
- Ваш врач назначит Вам другой лекарственный препарат (эпинефрин) для применения в случае развития аллергической реакции. Для выполнения инъекции может понадобиться чья-то помощь. Убедитесь, что Вы и другие люди, которым может понадобиться сделать инъекцию, знаете, как и когда ее выполнять. Некоторые лекарственные средства могут снижать эффективность эпинефрина или повышать риск развития побочных эффектов. К ним относятся некоторые лекарственные препараты, назначаемые для лечения депрессии, нарушений со стороны сердца или повышенного кровяного давления. Существует большое количество лекарственных препаратов, которые взаимодействуют с эпинефрином. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом и убедитесь в том, что применение эпинефрина вместе со всеми остальными Вашими лекарственными препаратами безопасно.
- Не принимайте этот лекарственный препарат, если у Вас очень тяжелая или неконтролируемая астма.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяется для снятия симптомов аллергии на арахис. Этот препарат не предназначен для лечения аллергических

реакций.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если вы когда-либо испытывали сильную аллергическую реакцию.
- Если у вас когда-либо был эозинофильный эзофагит или другое эозинофильное заболевание желудка или кишечника.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Придерживайтесь диеты, рекомендованной врачом.
- Продолжайте избегать арахиса, как вам сказал ваш врач.
- Если вы употребляете алкоголь, у вас диагностировано какое-либо заболевание, например вирусная инфекция, вы ограничиваете потребление пищи, ощущаете выраженную усталость или

недосыпание, у вас менструация или вы принимаете нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), например ибупрофен или напроксен, сообщите об этом врачу. Это может быть сопряжено с повышенным риском аллергических реакций.

- Не применяйте этот препарат в течение 3 часов до и 3 часов после физических нагрузок или горячего душа и горячей ванны. Если у вас наблюдаются чувство жара, потливость, учащенное дыхание или сердцебиение после физических нагрузок или горячего душа и горячей ванны, прежде чем принимать препарат, дождитесь, пока эти явления не исчезнут.
- Если у Вас астма и затрудненное дыхание, или Вашу астму все тяжелее удается контролировать, немедленно свяжитесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Затрудненное глотание или речь.
- Боль при глотании.

- Изжога.
- Боль или давление в груди, учащенное сердцебиение или обморок.
- Головокружение.
- Гиперемия (румянец).
- Одышка.
- Тяжелая диарея.
- Желудочные колики.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Боль в кишечнике.
- Тошнота или рвота.
- Зуд в ушах, на языке или во рту.
- Онемение или покалывание во рту.
- Першение в горле.
- Кашель.
- Насморк.
- Чихание.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное

управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Принимайте во время еды.
- Принимайте данный препарат приблизительно в одно и то же время дня. Препарат лучше всего принимать в вечернее время.
- Не проглатывайте капсулы и не вдыхайте порошок.
- Откройте капсулу или пакетик и добавьте содержимое к нескольким ложкам мягкой пищи, например яблочного пюре, йогурта или пудинга. Хорошо перемешайте. Не смешивайте препарат с жидкостями.
- Примите дозу сразу после смешивания. Не храните для дальнейшего использования.
- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.
- Всю оставшуюся порцию препарата после введения дозы следует выбросить.
- После применения помойте руки.
- Если у вас назначен визит к врачу для повышения дозы препарата, не принимайте препарат самостоятельно в этот день.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить в холодильнике или при комнатной температуре.
- Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Храните в первичном контейнере.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть

вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-04-11

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Peanut Allergen Powder - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center