



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

# Pramipexole

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

## Торговые наименования: США

Mirapex ER [DSC]

## Торговые наименования: Канада

ACT Pramipexole; APO-Pramipexole; Auro-Pramipexole; Mirapex; RATIO-Pramipexole; SANDOZ Pramipexole

## Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения болезни Паркинсона.
- Применяется для лечения синдрома беспокойных ног.

## Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас заболевание почек.
- Если вы принимаете другой препарат, в состав которого входит это же лекарство.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?**

### **Все формы выпуска:**

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Чтобы снизить риск головокружения или потери сознания, вставать из лежачего или сидячего положения следует медленно. Подниматься и спускаться по лестнице следует с осторожностью.
- Проверяйте уровень кровяного давления согласно указаниям.
- Нельзя прекращать прием данного лекарственного препарата без консультации с Вашим врачом. При прекращении приема этого препарата у Вас могут появиться признаки синдрома отмены. Если Вам необходимо прекратить прием данного препарата, проконсультируйтесь с Вашим врачом и следуйте его указаниям. Немедленно сообщите Вашему врачу, если у Вас появились какие-либо из перечисленных симптомов в результате снижения дозы или прекращения приема этого препарата: высокая температура,

спутанность сознания, выраженная ригидность мышц, апатия, тревожность, депрессия, чувство усталости, проблемы со сном, потливость или болевые ощущения.

- Избегайте употребления алкоголя во время приема этого препарата.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением марихуаны, других форм каннабиса, рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

### **Таблетки пролонгированного действия:**

- В кале можно увидеть что-то, похожее на таблетку. Если это происходит, проконсультируйтесь со своим врачом.

### **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.** В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Сильные желания, которые трудно контролировать (например, прием пищи, азартные игры, секс или трата денег).
- Высокая температура.
- Спутанность сознания.
- Ригидность мышц.
- Частое мочеиспускание.
- Сильное головокружение или обморок.
- Излишнее потоотделение.
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Изменение зрения.
- При появлении или усугублении проблем контролирования движений тела.
- Нарушение двигательных функций.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Нарушение или потеря памяти.
- Боль или слабость в мышцах, потемнение мочи, затрудненное мочеиспускание.
- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Некоторые люди засыпали во время управления автомобилем, приема пищи или беседой. Некоторые не ощущали сонливости и чувствовали себя бодро непосредственно перед тем, как заснуть. Эти случаи отмечались спустя 1 год после начала приема данного препарата. Если Вы засыпаете во время различных занятий, в день приема препарата откажитесь от вождения транспортных средств, а также прочих занятий или видов работ, требующих повышенного внимания. Если у Вас наблюдается повышенная сонливость, немедленно свяжитесь с врачом.

- У некоторых пациентов возникали неконтролируемые изменения осанки. Они могут включать наклон шеи или туловища вперед, отклонение туловища в стороны в положении сидя, стоя или при ходьбе. Изменения осанки могут возникать через несколько месяцев после начала лечения препаратом или после повышения его дозы. Если у вас появились изменения осанки, немедленно обратитесь к врачу.
- При внезапном прекращении применения данного препарата возникало тяжелое, а иногда и смертельно опасное заболевание — злокачественный нейролептический синдром (ЗНС). ЗНС также возникал при снижении дозы данного препарата. Немедленно свяжитесь с врачом в случае высокой температуры, появления мышечных судорог или скованности в мышцах, головокружения, тяжелой головной боли, спутанности сознания, изменений мышления, учащения или нарушения сердечного ритма, а также обильной потливости.

## **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Головная боль.
- Запор, диарея, тошнота или снижение аппетита.
- Нарушения сна.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Сухость во рту.
- Странные или необычные сны.
- Мышечный спазм.
- Потеря веса.

- Заложенный нос.
- Симптомы, напоминающие грипп.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

## **Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?**

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Все формы выпуска:**

- Принимать независимо от приема пищи. Примите с пищей, если лекарство вызывает тошноту.
- Продолжайте принимать этот лекарственный препарат в соответствии с указаниями Вашего врача или другого медицинского работника, даже если у Вас хорошее самочувствие.

### **Таблетки с немедленным высвобождением действующего вещества:**

- При синдроме беспокойных ног принимайте данный препарат за 2–3 часа до отхода ко сну.
- При синдроме беспокойных ног проконсультируйтесь с врачом, если симптомы ухудшились или стали появляться раньше в течение дня.

## **Таблетки пролонгированного действия:**

- Проглатывайте целиком. Не жуйте, не ломайте и не раздробляйте.

## **Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?**

### **Таблетки с немедленным высвобождением действующего вещества:**

- Пропустите забытую дозу и вернитесь к своему обычному графику.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- Если вы пропустили прием данного препарата в течение нескольких дней подряд, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как вновь начать прием лекарства.

### **Таблетки пролонгированного действия:**

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если прошло 12 или более часов с тех пор, как доза была пропущена, пропустите эту дозу и вернитесь к своему обычному графику.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.
- Если вы пропустили прием данного препарата в течение нескольких дней подряд, проконсультируйтесь с врачом перед тем, как вновь начать прием лекарства.

## **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или

препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя

всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Дата последнего пересмотра**

2024-10-17

## **Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.  
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Pramipexole - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center