



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Oxybate

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Lumryz; Lumryz Starter Pack; Хырем

Торговые наименования: Канада

Хырем

Предупреждение

- Данный препарат может вызывать тяжелые побочные эффекты. К ним относятся нарушения дыхания, снижение артериального давления, изменение концентрации внимания и обморок. Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Злоупотребление этим препаратом или его неправильное применение в качестве самостоятельного средства или в комбинации с некоторыми другими препаратами могут приводить к возникновению судорог, медленному или поверхностному дыханию, нарушению концентрации внимания, коме или смерти.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения внезапной потери мышечного тонуса (катаплексии) у пациентов с нарколепсией.
- Применяется для лечения избыточной сонливости в течение дня у больных с нарколепсией.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у Вас заболевание печени.
- Если у Вас недостаточность сукцинат-полуальдегида дегидрогеназы.
- Если Вы употребляете алкоголь или принимаете какие-либо средства, содержащие алкоголь.
- Если Вы принимаете лекарственные или натуральные препараты в качестве снотворных. Существует много препаратов, которые применяются в связи с нарушениями сна. В случае сомнений проконсультируйтесь со своим врачом или фармацевтом.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших

заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Длительное или регулярное применение этого препарата может приводить к зависимости. Внезапное прекращение применения этого препарата может привести к появлению так называемых симптомов «отмены». Проконсультируйтесь с врачом, прежде чем снизить дозу или прекратить прием этого препарата. Необходимо следовать указаниям врача. Если у вас возникнут какие-либо побочные эффекты, проконсультируйтесь с врачом.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих работ или занятий, требующих от Вас повышенного внимания, на протяжении, как минимум, 6 часов после приема данного препарата.

Избегайте таких занятий или видов работ, пока окончательно не придете в бодрствующее состояние.

- Избегайте употребления алкоголя во время приема этого препарата.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением марихуаны, других форм каннабиса, рецептурных или безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Многие лекарственные препараты взаимодействуют с данным лекарственным препаратом, что может привести к увеличению риска возникновения побочных эффектов, таких как смертельно опасные нарушения дыхания. Проконсультируйтесь с врачом и фармацевтом и убедитесь в том, что применение данного лекарственного препарата вместе со всеми остальными вашими лекарственными препаратами безопасно.
- Наиболее вероятно, что после приема препарата Вы очень быстро заснете (обычно в течение 5–15 минут). Время, которое необходимо для засыпания, может меняться от ночи к ночи. Если сон наступил внезапно в положении стоя или при подъеме с постели, это может привести к падению и

необходимости обратиться в больницу. Убедитесь, что принимаете данный препарат в постели, и ложитесь сразу после приема. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.

- Если Вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или бессолевой диеты, сообщите об этом врачу. Некоторые из этих препаратов содержат натрий.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Симптомы депрессии, мысли о самоубийстве, нервозность, эмоциональные подъемы и спады, искаженное мышление, тревожность или пониженный интерес к жизни.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Чувство спутанности сознания, неспособность сосредоточиться или изменения в поведении.
- Необъяснимые колебания веса.
- Изменения аппетита.
- Лунатизм.
- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.
- Нарушение дыхания во время сна (синдром ночного апноэ).
- Сильное головокружение или обморок.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Головокружение.
- Тошнота или рвота.
- Ночное недержание мочи.
- Тремор.
- Головная боль.
- Ненормальные сны, разговоры во сне или другие ненормальные эффекты во время сна.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Раствор:

- Принимайте 2 дозы каждую ночь.
- Препарат следует принимать натощак. Первая доза должна быть принята не раньше, чем через 2 часа после еды.
- Данный лекарственный препарат необходимо смешать перед приемом. Следуйте инструкциям врача в отношении смешивания препарата.
- Аккуратно отмеряйте дозы жидкости. Используйте мерную емкость, которая входит в комплект с лекарством.
- Используйте в течение 24 часов после смешивания препарата.

- Подготавливайте каждую дозу перед сном.
- Храните приготовленные дозы в дозирующих емкостях с защитой от вскрытия детьми, в безопасном месте.
- Принимайте в постели и ложитесь сразу после приема. После приема этого препарата оставайтесь в постели.
- Принимайте первую дозу перед сном, в постели.
- Делайте промежутки между дозами как минимум в 2,5–4 часа.
- Настройте будильник на время приема второй дозы.

Порошок для приготовления суспензии:

- Принимайте препарат перед сном, не ранее чем через 2 часа после еды.
- Смешайте этот препарат в прилагаемом стакане. Поместите количество, необходимое для вашей дозы, примерно в $\frac{1}{3}$ стакана (80 мл) воды. Вы можете добавить безкалорийную смесь для напитков или вкусовые добавки в воду. Не используйте горячую воду. Наденьте на стакан крышку и хорошенько потрясите его в течение как минимум 60 секунд. Примите препарат в течение 30 минут после смешивания.

- Приняв дозу препарата, налейте в стакан еще воды. Наденьте на стакан крышку и хорошенько потрясите его в течение как минимум 10 секунд. Выпейте, чтобы обеспечить прием полной дозы.
- Принимайте в постели и ложитесь сразу после приема. После приема этого препарата оставайтесь в постели.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Раствор:

- Если вы забыли принять вторую дозу, пропустите ее. Не принимайте еще одну дозу до следующей ночи.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Порошок для приготовления суспензии:

- Пропустите непринятую дозу. Не принимайте еще одну дозу до следующего дня перед сном.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить в оригинальной упаковке.

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните этот препарат в защищенном месте, невидимом и недоступном для детей, и вне доступа других людей. В качестве защищенного места хранения препарата может выступать ящик или помещение, которые закрываются на ключ. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для

пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в

качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2025-12-11

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Oxybate - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center