Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Phenylbutyrate

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Buphenyl; Olpruva; Pheburane

Торговые наименования: Канада

Pheburane

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяют для лечения нарушений мочеиспускания.
- Этот препарат не предназначен для лечения внезапно повысившихся уровней аммиака. Обязательно узнайте признаки высокого уровня аммиака. Внезапно повысившийся уровень аммиака требует неотложной медицинской помощи и может

быть смертельным. Посоветуйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?
Для всех пациентов, принимающих данный препарат:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеются редкие наследственные нарушения, такие как недостаточное всасывание глюкозы и галактозы, непереносимость фруктозы или дефицит сахаразы/изомальтазы. В некоторых из этих продуктов содержится сахароза.
- Если вы принимаете какой-либо из следующих лекарственных препаратов: дивальпроекс, галоперидол или вальпроевая кислота.

Дети:

- Если масса тела ребенка менее 44 фунтов (20 кг). Некоторые торговые наименования не предназначены для применения у детей с массой тела менее 44 фунтов (20 кг).

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного

препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Придерживайтесь диеты, рекомендованной врачом.
- Носите при себе информацию, позволяющую определить заболевание.
- Если Вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или бессолевой диеты, сообщите об этом врачу. Некоторые из этих препаратов содержат натрий.

- Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Если вы даете этот препарат вашему ребенку, вес которого меняется, обсудите это с врачом. Возможно, потребуется изменить дозу данного лекарственного препарата.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании

с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Симптомы повышения кислотности крови (ацидоза), такие как спутанность сознания, учащенное дыхание, тахикардия, нарушение сердцебиения, очень сильная боль в животе, тошнота или рвота, выраженная сонливость, одышка, повышенная утомляемость или слабость.
- Признаки электролитных нарушений, такие как перепады настроения, спутанность сознания, мышечная боль, судороги или спазмы, слабость, тремор, нарушения равновесия, аритмия, судорожные припадки, потеря аппетита, а также сильная тошнота или рвота.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Головокружение или головная боль.
- Тошнота или рвота.
- Сонливость.
- Спутанность сознания.
- Изменение слуха.
- Нарушение или потеря памяти.

- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Воспаление.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Пониженный аппетит.
- Нарушение вкусового восприятия. Это,
- Изменение запаха тела.
- Отсутствие менструаций или другие нарушения менструального цикла.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте https://www.fda.gov/medwatch.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Порошок и таблетка:

- Принимайте этот препарат с пищей.

Порошок:

- Перед употреблением взбалтывать.
- Смешайте порошок с жидкой или мягкой пищей.
- Используйте только прилагающуюся мерную ложечку для определения дозировки порошка.
- После смешивания с пищевыми продуктами примите дозу немедленно. Не храните препарат для дальнейшего применения. После смешивания с водой можно хранить при комнатной температуре или в холодильнике до 1 недели.
- Этот препарат могут применять пациенты с

питательными трубками. Применяйте в соответствии с указаниями. После применения данного препарата промойте питательную трубку.

Пеллеты для приема внутрь:

- Принимайте данный препарат с пищей.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- Используйте только дозатор, продающийся вместе с лекарством.
- Проглотите гранулы с напитком, например с водой, фруктовым соком или детской смесью, не содержащей белка. Вы также можете высыпать гранулы на ложку яблочного соуса или морковного пюре. Не разжевывайте гранулы. Не смешивайте гранулы и жидкость. Проглотите гранулы сразу.
- Если у вас установлена трубка для кормления, проконсультируйтесь со своим врачом перед приемом этого препарата.

Гранулы для приема внутрь (саше):

- Этот препарат поставляется в форме 2 саше на каждую дозу. В одном саше содержится вещество Mix-Aid, помогающее препарату растворяться в воде. В другом саше — сам препарат. Обязательно

узнайте, в каком саше находится Mix-Aid, а в каком — сам препарат.

- Чтобы смешать этот препарат, сначала высыпьте содержимое саше с веществом Mix-Aid в чашку с водой. Количество Mix-Aid и используемой воды зависит от дозы. Убедитесь, что вы знаете дозировку. Размешайте до полного растворения. Затем добавьте в чашку содержимое саше с самим препаратом и снова размешайте.
- Выпейте всю дозу в течение 5 минут после смешивания. После этого налейте в ту же чашку еще воды и выпейте, чтобы точно принять полную дозу препарата. Убедитесь, что вы знаете, сколько воды нужно использовать.
- Если вы не приняли этот препарат в течение 30 минут после смешивания, вылейте его.
- Если у вас установлен зонд для энтерального питания, проконсультируйтесь со своим врачом перед приемом этого препарата. Этот препарат не совместим с определенными типами зондов для энтерального питания.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Порошок и таблетка:

- Примите пропущенную дозу как только сможете, с едой.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- Примите пропущенную дозу сразу, как только вспомните, с пищей.
- Если до приема следующей дозы остается менее 3 часов, не принимайте пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Гранулы для приема внутрь (саше):

- Примите пропущенную дозу с пищей в тот же день, когда она была пропущена, как только вспомните об этом.
- Если Вы до следующего дня не вспомнили о пропущенной дозе, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Гранулы для приема внутрь (флакон), порошок и таблетки:

- Держите крышку плотно закрытой.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- После вскрытия упаковки выбросьте все неиспользованные порции по истечении 45 дней.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых

гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра
2025-11-03

Авторское право
© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Phenylbutyrate - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center