



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Phosphates

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Fleet Enema Extra [OTC]; Fleet Enema [OTC]; Fleet Pedia-Lax Enema [OTC]; GoodSense Enema [OTC]; LaCrosse Complete [OTC]; OsmoPrep [DSC]; We Care Enema [OTC]

Торговые наименования: Канада

Fleet Enema

Предупреждение

Таблетки:

- В редких случаях серьезные нарушения со стороны почек возникали у пациентов, принимавших препараты с фосфатом натрия внутрь перед обследованием кишечника. Иногда эти нарушения носили долгосрочный характер, и отдельным людям понадобился долгосрочный диализ. В большинстве случаев эти нарушения со стороны почек возникали в течение нескольких дней. Иногда нарушения со стороны почек возникали через несколько месяцев после приема этого препарата. Нарушения со стороны почек могут возникнуть у любого, кто принимает данный препарат, но вероятность их появления выше у пожилых людей или людей с низким объемом крови, замедленной перистальтикой кишечника,

непроходимостью кишечника, колитом или заболеванием почек. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

- Риск возникновения нарушений со стороны почек может возрасти, если Вы когда-либо принимали препараты, которые могут вызывать нарушение функции почек. Существует много лекарственных препаратов, которые могут вызывать такие проблемы. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Придерживайтесь указаний врача относительно режима приема данного препарата. Не принимайте более предписанной дозы.
- До, во время и после применения данного лекарственного препарата следует употреблять большое количество напитков без кофеина, если врач не рекомендовал Вам уменьшить количество потребляемой жидкости.
- Не принимайте данный препарат с другими препаратами, содержащими фосфат натрия. К ним относятся растворы для ректального введения.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяется для лечения запора.
- Применяется для очищения желудочно-кишечного тракта.
- Применяется для лечения и профилактики пониженного уровня фосфатов.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о

вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

- Если у Вас сердечная недостаточность (ослабленное сердце).
- Если у вас когда-либо были проблемы с почками.
- Если Вы применяете другой препарат, в состав которого входит такое же действующее вещество.

Таблетки и ректальная клизма:

- Если у Вас имеется любое из перечисленных ниже нарушений состояния здоровья: непроходимость кишечника, перфорация кишечника или другие нарушения со стороны кишечника, электролитные нарушения (такие как нарушения уровней натрия, калия, фосфатов), обезвоживание (дегидратация) или перенесенное хирургическое вмешательство на желудке или кишечнике.

Таблетки:

- Если Вы принимали этот лекарственный препарат в течение последних 7 дней.

Ректальная клизма:

- Если у Вас имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: непроходимость кишечника, боли в животе, тошнота, кровотечение из прямой кишки, рвота или изменения ритма опорожнения кишечника, которые сохраняются в течение более 2 недель.

Инъекция:

- Если у вас высокие уровни фосфатов, дефицит калия или высокий уровень натрия в организме.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных,

натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Если Вы придерживаетесь диеты с низким содержанием натрия или бессолевой диеты, сообщите об этом врачу. Некоторые из этих препаратов содержат натрий.
- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Различные формы выпуска этого препарата могут быть предназначены для применения у детей разного возраста. Прежде чем дать этот препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

Таблетки и ректальная клизма:

- Не применяйте другие слабительные средства или размягчители стула, если только врач не рекомендовал иное.
- Проконсультируйтесь с врачом относительно увеличения количества потребляемой жидкости и других способов профилактики обезвоживания. В случае сильного обезвоживания количество

побочных эффектов данного препарата может возрастать.

- Сообщайте врачу о случаях дегидратации, необычной потливости, рвоты, диареи, снижения аппетита или необычной жажды.
- Перед употреблением алкоголя проконсультируйтесь с врачом.

Ректальная клизма:

- Если после применения данного лекарственного препарата у Вас началось кровотечение из прямой кишки или отсутствует дефекация, проконсультируйтесь с врачом.
- При применении этого препарата для лечения запора в редких случаях развивались серьезные нарушения со стороны почек и сердца. В некоторых случаях это приводило к смерти. В большинстве случаев это происходило у людей, которые превышали назначенную дозу этого лекарственного препарата. На протяжении 24 часов следует принимать не более 1 дозы данного препарата. Если после приема дозы этого препарата у вас не было стула, то на протяжении 24 часов не следует использовать другой препарат, содержащий в своем составе фосфат натрия. За дальнейшими указаниями обратитесь к лечащему врачу.
- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Инъекция:

- Выполняйте анализы крови в соответствии с указаниями врача. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Данный лекарственный препарат может содержать алюминий. Существует риск алюминиевой токсичности, если Вы принимаете данный препарат продолжительное время. Риск выше, если Вы страдаете заболеваниями почек. Риск также выше у недоношенных детей. Проконсультируйтесь с врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно

сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки нарушения баланса жидкости и электролитов, такие как изменения настроения, спутанность сознания, мышечные боли или слабость, быстрый или нарушенный сердечный ритм, сильное головокружение или потеря сознания, сильная жажда, судорожные приступы, чувство сильной утомляемости или слабости, снижение аппетита, невозможность помочиться или изменение количества выделяемой мочи, сухость во рту, сухость глаз, сильная тошнота или рвота.
- Боль или давление в груди.

Таблетки и ректальная клизма:

- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- Очень сильные спазмы в животе или вздутие живота.
- Сильная боль в животе.
- Сильная головная боль.
- Черный, смолистый стул или стул с кровью.

- Боль в прямой кишке или ректальная боль.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

Таблетки и ректальная клизма:

- Боль в кишечнике.
- Тошнота или рвота.
- Вздутие.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Таблетки:

- Принимайте данный лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача. Строго следуйте всем инструкциям. К ним относятся режим приема данного лекарственного препарата, продукты питания и напитки, запрещенные к употреблению перед проведением обследования, а также время, за которое необходимо прекратить употребление пищи и напитков перед обследованием. Если у Вас имеются любые вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Пейте прозрачные напитки до, во время и после приема этого препарата. Не пейте жидкости, которые имеют фиолетовый или красный цвет. Не пейте молоко или алкогольные напитки.
- До, во время и после применения данного лекарственного препарата следует употреблять большое количество напитков без кофеина, если врач не рекомендовал Вам уменьшить количество потребляемой жидкости.
- При приеме данного препарата не употребляйте твердую пищу и молочные продукты, в том числе молоко.
- Не принимайте другие лекарственные препараты внутрь в течение 1 часа до или через 1 час после начала приема каждой дозы данного препарата.

Ректальная клизма:

- Клизма для ректального применения.
- Снимите крышку.
- Слегка надавив, введите наконечник клизмы в прямую кишку. Сильное давление недопустимо.
- Не принимайте другие лекарства в течение 2 часов после приема данного препарата.

Инъекция:

- Этот препарат вводят инфузионно внутривенно непрерывно в течение определенного времени.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Ректальная клизма:

- Данный лекарственный препарат следует принимать по мере необходимости. Не принимайте препарат чаще, чем назначено врачом.

Обследование прямой кишки и кишечника:

- Если Вы готовитесь к обследованию, примите пропущенную дозу как только сможете.

Инъекция:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Таблетки и ректальная клизма:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.

Инъекция:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы

относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту.

Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-10-19

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Phosphates - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center