



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Sulfate, Magnesium Sulfate, and Potassium Chloride

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Sutab

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для очищения желудочно-кишечного тракта.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.
- Если у вас имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: непроходимость кишечника, удлинённая толстая кишка, перфорация желудочно-кишечного тракта или замедленная перистальтика желудочно-кишечного тракта.
- Если у Вас нарушения электролитного баланса (например, натрия,

калия, фосфатов).

- Если вы принимаете что-либо из следующего: Бисакодил или натрия пикосульфат.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Не применяйте другие слабительные средства или размягчители стула, если только врач не рекомендовал иное.
- Избегайте употребления алкоголя во время приема этого препарата.
- Не принимайте другие лекарственные препараты внутрь в течение 1 часа до начала приема каждой дозы данного препарата. Прием некоторых препаратов может понадобиться перенести на другое время, чтобы отделить его от приема данного препарата более длительным промежутком времени. Проконсультируйтесь с лечащим врачом относительно того, как следует принимать другие лекарственные средства с этим лекарственным препаратом.
- При применении данного препарата возникали некоторые виды проблем с кишечником. В том числе наблюдались язвы в кишечнике

и ишемический колит. В некоторых случаях эти нарушения становились причиной госпитализации. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.

- Если вам 65 лет или больше, применяйте данный лекарственный препарат с осторожностью. У вас может появиться больше побочных эффектов.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, опухлость в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Отек живота.
- Рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной гущи.
- Черный, смолистый стул или стул с кровью.
- Боль в прямой кишке или ректальная боль.
- Этот препарат может вызвать обезвоживание организма и электролитный дисбаланс. В редких случаях они могут быть тяжелыми или смертельно опасными. Немедленно сообщите врачу, если у вас кружится голова, вы теряете сознание, чувствуете

усталость или слабость или испытываете трудности при мочеиспускании. Немедленно сообщите врачу, если у вас наблюдаются учащенное сердцебиение или нарушение сердечного ритма, судороги, головная боль, изменения настроения, спутанность сознания, мышечная боль или слабость, повышенная жажда, снижение аппетита, сухость во рту или глазах, сильная тошнота или рвота, изменение количества выделяемой мочи.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас беспокоят или не проходят:

- Боль в кишечнике.
- Рвота.
- При приеме этого препарата часто возникают тошнота, вздутие живота и спазмы желудка. Убедитесь, что Вы знаете, что делать в таком случае.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный

препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Принимайте данный лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача. Строго следуйте всем инструкциям. К ним относятся режим приема данного лекарственного препарата, продукты питания и напитки, запрещенные к употреблению перед проведением обследования, а также время, за которое необходимо прекратить употребление пищи и напитков перед обследованием. Если у Вас имеются любые вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- За день до процедуры вы можете съесть высокоусвояемый завтрак в соответствии с рекомендациями врача. К высокоусвояемым продуктам относятся яйца; белый хлеб, печенье или кексы (без пшеницы); кукурузные хлопья; творог; йогурт; манная каша; овсяная крупа; фрукты без кожицы или семян; кофе и чай. Попросите у своего врача список продуктов, которые вам разрешено съесть.
- После завтрака и до окончания процедуры вам можно только пить прозрачные напитки. Пейте прозрачные напитки до, во время и после приема этого препарата. Примерами прозрачных напитков являются кофе или чай (без молока или сливок), фруктовые соки (без мякоти), желатиновые десерты (без фруктов или топпинга), вода, куриный бульон или прозрачная газировка (например, имбирный эль).
- Не употребляйте твердую пищу и молочные продукты, в том числе молоко. Не пейте алкогольные напитки. Не пейте жидкости, которые имеют фиолетовый или красный цвет.
- Проглотите 1 таблетку, запив ее глотком воды. После того, как вы примете полную дозу, выпейте дополнительно 32 унции (946 мл) воды согласно рекомендациям вашего врача. Если вам стало некомфортно, принимайте таблетки и воду медленнее.
- Если вы не получили от врача иных инструкций, воздерживайтесь от

питья по меньшей мере 2 часа до проведения обследования.

- Если после первого приема препарата у Вас возникли сильная боль в животе или вздутие живота, не принимайте вторую дозу, пока не пройдут эти явления. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

- Если Вы пропустили прием препарата или не можете принять его дозу, проконсультируйтесь с врачом и выясните, что нужно делать.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- В каждом флаконе этого препарата может находиться поглотитель влаги, который сохраняет лекарство сухим. Не жуйте и не глотайте поглотитель влаги. Достаньте его и выбросьте.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие

лекарства.

- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К препарату прилагается отдельная инструкция для пациентов. Внимательно прочитайте эту информацию. Перечитывайте ее каждый раз при пополнении запаса препарата. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является

гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-11-27

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Sulfate, Magnesium Sulfate, and Potassium Chloride - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center