

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Desmopressin

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

DDAVP; DDAVP Pf; Desmoda; Nocdurna [DSC]; Stimate [DSC]

Торговые наименования: Канада

APO-Desmopressin; Bipazen; DDAVP; DDAVP Melt; Octostim; PMS-Desmopressin

Предупреждение

- Данный препарат может привести к снижению уровня натрия. Очень низкий уровень натрия может быть опасным для жизни, приводить к судорогам, обморокам, затрудненному дыханию или смерти.
- Следите за тем, чтобы ребенок проходил анализы крови и другие лабораторные анализы в соответствии с указаниями врача.
- Если у вашего ребенка инфекция, высокая температура, диарея или рвота, проконсультируйтесь с врачом. Проконсультируйтесь с врачом, если по тем или иным причинам вашему ребенку предстоит находиться на сильной жаре, активно двигаться или изменить количество выпиваемой воды.
- Если Ваш ребенок принимает любые лекарственные препараты, способные увеличить риск снижения уровня натрия, проконсультируйтесь с врачом. Такое воздействие может оказывать большое количество лекарственных препаратов. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка или фармацевтом.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для профилактики ночного недержания мочи.
- Применяется для лечения центрального несахарного диабета.
- Этот препарат применяют для лечения гемофилии.
- Этот препарат применяют для лечения болезни Виллебранда.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Таблетки, принимаемые под язык (сублингвальные таблетки):

- Данный препарат не одобрен для применения у детей. Тем не менее врач может принять решение о том, что польза применения данного лекарственного препарата превышает связанные с ним риски. Если Ваш ребенок получал данный лекарственный препарат, узнайте у врача о преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом при возникновении вопросов по поводу применения данного лекарственного препарата Вашим ребенком.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если у вашего ребенка было заболевание почек, риск высокого давления в головном мозге, или если у него когда-либо был низкий уровень натрия, или непроходимость мочевыводящих путей.
- Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: сердечная недостаточность (ослабленное сердце), повышенное артериальное давление или заболевание под названием «синдром неадекватной секреции антидиуретического гормона» (СНСАДГ).
- Если у Вашего ребенка болезнь фон Виллебранда, тип IIВ.
- Если у Вашего ребенка есть проблемы со здоровьем, которые ведут к потере натрия, такие как заболевания надпочечников; понос; расстройства пищевого поведения, такие как анорексия или булимия; тошнота или рвота, которая не прекращается.
- Если количество выпиваемой Вашим ребенком воды превышает норму.

Все препараты для носа:

- Если у вашего ребенка наблюдаются заложенность носа, рубцы на внутренней поверхности носа, затрудненное дыхание через нос или

другие нарушения со стороны носа.

- Если у Вашего ребенка недавно была какая-либо операция на носу, травма, изъязвление или воспаление в полости носа, проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- Если Ваш ребенок применяет для носа другой препарат.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Очень тяжелые аллергические реакции возникали редко. Иногда аллергические реакции заканчивались летальным исходом при применении данного препарата в форме инъекций. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

Инъекции и назальный спрей (для использования при кровотечениях):

- При появлении любых необъяснимых кровоподтеков или кровотечения немедленно обратитесь к врачу. Это может быть признаком того, что обычная доза не работает.

Раствор для приема внутрь:

- Препараты, в состав которых входит бензиловый спирт, могут вызывать тяжелые и иногда летальные побочные эффекты у новорожденных или младенцев. Этот препарат содержит бензойную кислоту, которая является продуктом распада бензилового спирта. Применять с осторожностью у новорожденных и младенцев. Проконсультируйтесь с врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

Все формы выпуска:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание,

стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Признаки пониженного уровня натрия, такие как головная боль, проблемы с концентрацией внимания, нарушение памяти, спутанное мышление, слабость, судороги, проблемы с сохранением равновесия.
- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Тошнота или рвота.
- Мышечная слабость.
- Мышечный спазм.
- Ощущение усталости или слабости.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Беспокойство.
- Пониженный аппетит.
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Воспаление, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Кашель с кровью.
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.

Инъекция:

- Раздражение или отек в месте укола.

- Боль в зоне инъекции.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

Все формы выпуска:

- Гиперемия (румянец).

Все препараты для носа:

- Насморк или заложенность носа.
- Желудочные колики.
- Кашель.
- Носовое кровотечение.
- Боль в горле.
- Признаки простуды.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с

предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:

- Во время лечения этим препаратом вам может потребоваться контролировать объем выпиваемой ребенком жидкости. Следуйте инструкциям лечащего врача ребенка относительно объема выпиваемой жидкости и интенсивности физических нагрузок. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, задайте их лечащему врачу ребенка.

Таблетки:

- Если ребенок принимает данный препарат по поводу ночного недержания мочи, ему следует опорожнять мочевой пузырь непосредственно перед сном. Не позволяйте ребенку пить кофеинсодержащие напитки перед отходом ко сну. Следуйте указаниям врача относительно употребления ребенком жидкости незадолго до сна.
- Если этот препарат назначен ребенку как лечение ночного недержания мочи, его следует давать перед сном.

Раствор для приема внутрь:

- Принимайте данный лекарственный препарат натощак. Этот препарат следует принимать не позже чем за 1 час до и не раньше чем через 2 часа после еды.
- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта средство для дозирования этого препарата.

Все препараты для носа:

- Не принимайте этот препарат внутрь (перорально). Применяйте только для носа. Избегайте попадания в рот и глаза ребенка (может получить ожог).

- Дайте ребенку высморкаться перед приемом препарата.
- Для некоторых препаратов могут существовать иные способы заполнения помпы. Некоторые помпы также возможно понадобится заполнять, даже если они не используются в течение разных периодов времени. Придерживайтесь инструкции по способу и времени заполнения.

Инъекция:

- Для внутримышечных, внутривенных или подкожных инъекций.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

Инъекция:

- Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход дальнейших действий.

Все прочие лекарственные формы:

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Таблетки:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.

Раствор для приема внутрь:

- Храните в холодильнике. Не замораживайте.
- Выбросьте все неиспользованные порции препарата через 120 дней после вскрытия упаковки.

Назальный спрей (для использования при кровотечениях):

- Хранить в вертикальном положении при комнатной температуре. Не замораживать.
- Некоторые марки этого препарата нужно выбросить через 90 дней после вскрытия. Некоторые марки нужно выбросить через 6 месяцев после вскрытия. Укажите дату вскрытия емкости на ее этикетке. Вы должны точно знать, как долго можно хранить препарат, прежде чем его потребуется выбросить.

Препараты для носа (несахарный диабет):

- Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить в холодильнике. Аналогичные препараты некоторых торговых марок следует хранить при комнатной температуре. Если у Вас есть вопросы относительно хранения данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с фармацевтом.
- Проверьте продолжительность возможного хранения этого препарата до того, как Вам понадобится его выбросить.
- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.

Инъекция:

- Если вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните

все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных

эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-03-10

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Desmopressin - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center