

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Dihydroergotamine

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Brekiya; D.H.E. 45 [DSC]; Migranal [DSC]; Trudhesa

Торговые наименования: Канада

DHE; Migranal

Предупреждение

- Применение данного лекарственного препарата одновременно с некоторыми видами других лекарств (кларитромицин, эритромицин, индинавир, итраконазол, кетоконазол, нелфинавир, ритонавир и тролеандомицин) сопровождалось нарушением кровотока в руках, ногах или тканях головного мозга. Такие эффекты могут быть очень тяжелыми или даже смертельно опасными. Не давайте данный лекарственный препарат ребенку, если он уже принимает любой из таких препаратов. Такое воздействие может оказывать большое количество лекарственных препаратов. Удостоверьтесь в том, что применение данного лекарственного препарата безопасно в сочетании со всеми другими лекарствами, которые Ваш ребенок уже принимает.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения мигрени.
- Данный препарат не одобрен для применения у детей. Тем не менее врач может принять решение о том, что польза применения данного лекарственного

препарата превышает связанные с ним риски. Если Ваш ребенок получал данный лекарственный препарат, узнайте у врача о преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом при возникновении вопросов по поводу применения данного лекарственного препарата Вашим ребенком.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: повышенное кровяное давление или некоторые виды мигрени, например гемиплегическая или базилярная мигрень.
- Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: заболевание кровеносных сосудов, боль или чувство сдавленности в груди, заболевание сердца, заболевание почек, заболевание печени, нарушение кровотока, очень серьезная инфекция или недавно перенесенная операция на кровеносных сосудах.
- Если у Вашего ребенка когда-либо был инфаркт

миокарда.

- Если Ваш ребенок принимал алмотриптан, элетриптан, фроватриптан, наратриптан, ризатриптан, суматриптан или золмитриптан в течение последних 24 часов.
- Если Ваш ребенок принимал эрготамин, метисергид или аналогичные лекарственные препараты в течение последних 24 часов.

Если Ваша дочь беременна:

- Не давайте данный лекарственный препарат своему ребенку во время беременности.

Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:

- Вашей дочери нельзя кормить грудью во время лечения данным препаратом и в течение 3 дней после применения последней дозы.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных

препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось повышенным кровяным давлением. Контролируйте кровяное давление Вашего ребенка в соответствии с указаниями врача.
- Перед началом приема этого препарата вашему ребенку может понадобиться оценка функции сердца. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.

- Будьте осторожны, если у вашего ребенка имеются факторы риска развития заболеваний сердца (повышенное артериальное давление, повышенный уровень холестерина, избыточный вес, повышенный уровень сахара в крови или сахарный диабет, курение или иное употребление никотина, раннее развитие заболеваний сердца у других членов семьи). Проконсультируйтесь с врачом.
- Проконсультируйтесь с детским врачом, если Ваш ребенок часто пьет грейпфрутовый сок или ест грейпфруты.
- Этот препарат не предназначен для регулярного и ежедневного применения. Проконсультируйтесь с врачом.
- Данный препарат не предназначен для профилактики или снижения частоты возникновения мигренозных головных болей. Проконсультируйтесь с врачом.
- Не превышайте предписанную врачом дозировку, давая препарат. Не давайте этот препарат чаще или дольше, чем было предписано. Выполнение любого из этих действий может повысить риск развития тяжелых побочных эффектов.
- Прием данного лекарственного препарата в

большем количестве (более высокие дозы, более частое применение), чем назначено врачом может привести к усилению головных болей у Вашего ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль, или

головокружение, или потеря сознания, или нарушение зрения.

- Изменение цвета кистей, стоп или других областей. Кожа может стать бледной, синюшной, серой, багровой или красной.
- Онемение, боль, покалывание или чувство холода в кистях или ступнях.
- Любые изъязвления или раны на пальцах рук или ног.
- Мышечная боль или слабость.
- Судороги или боль в ногах или в области бедер.
- Ощущение тяжести или напряжения в мышцах ног.
- Жжение или ноющая боль в стопах или пальцах ног.
- Воспаление.
- Диарея или запор.
- Сильная боль в животе или диарея с примесью крови в стуле.
- Боль в животе после еды.
- Высокая температура.
- Потеря веса.
- На фоне приема данного препарата отмечались тяжелые и иногда смертельные нежелательные явления со стороны сердца, такие как инфаркт

миокарда и нарушения сердечного ритма. В случае появления у ребенка чувства стеснения, боли, сдавления или тяжести в груди, горле, шее или в области нижней челюсти; необычной боли в руке, спине, шее, нижней челюсти или животе; одышки; холодного пота; тяжелой тошноты или рвоты; головокружения, а также потери сознания незамедлительно обратитесь к лечащему врачу.

- На фоне приема данного лекарственного препарата в редких случаях возникали очень тяжелые, иногда смертельно опасные нарушения со стороны сосудов головного мозга, например инсульт. Если у Вашего ребенка отмечается слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, нарушение равновесия, опущение 1 стороны лица или нарушение зрения, немедленно обратитесь к врачу.
- Во время лечения этим препаратом в редких случаях регистрировалось поражение сердечных клапанов. При появлении у ребенка таких симптомов, как учащенное сердцебиение или нарушение сердечного ритма, одышка, отеки рук или ног, значительная прибавка в весе, немедленно свяжитесь с его лечащим врачом.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

Спрей для носа:

- Тошнота или рвота.
- Раздражение носа или горла.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Носовое кровотечение.
- Насморк или заложенность носа.
- Ожог.
- Сухость в носу.
- Сонливость.

Назальный порошок:

- Тошнота или рвота.
- Раздражение носа или горла.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Носовое кровотечение.

- Насморк или заложенность носа.
- Кашель.
- Чихание.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Инъекция:

- Для внутривенных инъекций.

Спрей для носа:

- Только для носа.
- Давайте препарат как можно раньше после начала приступа.

- Перед использованием данного препарата необходимо соединить его компоненты. После вскрытия флакона и соединения компонентов назального спрея используйте препарат в течение 8 часов. Если препарат не использован полностью в течение 8 часов, удалите остатки приготовленного спрея в отходы.
- Перед первым использованием заполните дозатор, распылив продукт 4 раза. После заполнения обязательно уточните, в течение какого времени продукт пригоден к использованию. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Во время и сразу после впрыскивания препарата не позволяйте ребенку запрокидывать голову назад и резко вдыхать через нос.

Назальный порошок:

- Только для носа.
- Убедитесь, что вы точно знаете, как применять данный препарат. Прочитайте инструкцию, вложенную в упаковку с этим препаратом. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.

- Давайте препарат как можно раньше после начала приступа.
- Препарат не нуждается в проверке или подготовке перед применением.
- Снимите круглый синий язычок с синей насадки. Вставьте синюю насадку в одну ноздрю. Трижды сожмите белую воздушную помпу. Сжимайте помпу быстро и полностью. Не следует сжимать помпу медленно, частично или с задержками. Между сжатиями позвольте белой воздушной помпе вернуться к первоначальной форме.
- На протяжении 24 часов следует давать ребенку не более 2 доз.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Данный препарат применяется по мере необходимости. Не давайте ребенку препарат чаще, чем назначено врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Спрей для носа:

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.

- Не подвергайте воздействию тепла и света.

Назальный порошок:

- Храните при комнатной температуре.
- Не вынимайте этот лекарственный препарат из упаковки, пока ребенок не будет готов его принять.

Инъекция:

- Большинство Вы будете получать данный препарат в больнице или в кабинете врача. Если будете хранить дома, соблюдайте полученные у врача инструкции по хранению препарата.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим

источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical->

effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2025-05-30

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Dihydroergotamine - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center