ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Dupilumab

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Dupixent

Торговые наименования: Канада

Dupixent

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения экземы.
- Препарат используют для лечения астмы.
- Используется для лечения эозинофильного эзофагита.
- Препарат применяется для лечения длительно протекающих заболеваний придаточных пазух носа с образованием полипов в носовой полости.
- Он используется для лечения определенного типа крапивницы у некоторых людей.
- Применяется для лечения аллергического грибкового риносинусита (АГРС).
- Если Ваш ребенок получал данный лекарственный препарат по какой-либо другой причине, узнайте у врача о преимуществах и рисках. Проконсультируйтесь с врачом при возникновении вопросов или

опасений по поводу применения данного препарата Вашим ребенком.

Для лечения астмы:

- Не применяйте данный препарат для лечения приступов астмы. Используйте ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия). Если у вас возникнут вопросы, проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если Ваш ребенок недавно получил живую вакцину.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

Для всех целей применения данного препарата:

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок

принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.

- Если возможно, убедитесь, что ваша вакцинация актуальна до лечения этим препаратом.
- Перед получением ребенком каких-либо вакцин проконсультируйтесь с врачом. Применение некоторых вакцин с данным лекарственным препаратом может увеличить вероятность возникновения тяжелой инфекции либо снизить эффективность вакцины.
- Не следует резко прекращать давать Вашему ребенку стероидный препарат при переходе Вашего ребенка со стероидного препарата на данный препарат. Возможно, понадобится постепенное снижение дозы стероидного препарата, чтобы избежать развития побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если у ребенка бронхиальная астма, не изменяйте и не прекращайте применение противоастматических препаратов без согласования с его лечащим врачом.
- После приема данного препарата у некоторых людей, имеющих высокий риск возникновения паразитарных инфекций, наблюдалось возникновение таких инфекций. Врач может провести исследование кала Вашего ребенка на предмет паразитарной инфекции. Проконсультируйтесь с врачом.
- Применяйте данный лекарственный препарат у детей с осторожностью. У них может появиться больше побочных эффектов. Проконсультируйтесь с врачом.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.
- Если ваша дочь применяла данный препарат во время беременности, сообщите об этом лечащему врачу ребенка.

Для лечения астмы:

- Для оптимального контроля и улучшения проблем с дыханием у вашего ребенка важно следить за тем, у ребенка всегда был запас этого препарата. Обязательно пополняйте запасы до того, как у ребенка закончится препарат.
- Немедленно обратитесь к врачу, если у вашего ребенка ухудшаются проблемы с дыханием, если ингалятор для быстрого купирования симптомов (ингалятор быстрого действия) слабо помогает или если вашему ребенку приходится чаще использовать ингалятор для быстрого купирования симптомов.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

Для всех целей применения данного препарата:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки герпетической инфекции, такие как герпес, опоясывающий лишай, сильная головная боль, спутанность сознания, изменение зрения, покраснение глаз или боль в глазах.
- Признаки инфекции мочевыводящих путей, в т. ч. кровь в моче, чувство жжения или болевые ощущения при мочеиспускании, частые или

ургентные позывы к мочеиспусканию, жар, боль в нижней части живота или в области таза.

- Учащенное сердцебиение.
- Распухание железы.
- Головокружение или обморок.
- Тошнота или рвота.
- Признаки новых или усугубляющихся проблем с глазами, таких как изменение зрения или боль в глазах.
- Сыпь или покраснение на лице.
- Впервые выявленный или прогрессирующий псориаз.
- При применении этого препарата возникала боль в суставах, включая боль, затрудняющую ходьбу. Некоторых пациентов потребовалась госпитализировать. Сообщите своему лечащему врачу, если во время приема этого препарата у вашего ребенка появятся новые или усилятся имеющиеся боли в суставах.

Для лечения астмы:

- Признаки проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.
- При появлении или усугублении затрудненного дыхания.
- Боль в груди.
- Одышка, резкий набор массы тела или отек рук или ног.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Высокая температура, которая не понижается.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за

медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Боль, покраснение, воспаление или реакция в месте инъекции.
- Раздражение глаз или век.
- Сухие глаза.
- Боль в горле.
- Герпес.
- Признаки простуды.
- Нарушения сна.
- Зубная боль.
- Боль или спазмы в животе.
- Диарея.
- Мышечная боль.
- Боли в спине.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Он вводится в виде укола в подкожный жир верхней части бедра или области живота.

- Этот препарат можно вводить во внешнюю область плеча, если его вводит кто-то другой.
- Если вы будете сами делать уколы своему ребенку, врач вашего ребенка или медсестра научат вас делать инъекции.
- Мойте руки до применения.
- Если ваша доза состоит не из 1, а из нескольких инъекций, делайте их в 2 разных места.
- Если препарат хранится в холодильнике, перед применением дайте ему нагреться до комнатной температуры. Если вы пользуетесь шприцем или шприц-ручкой на 200 мг, оставьте его/ее при комнатной температуре на 30 минут. Если вы пользуетесь шприцем или шприц-ручкой на 300 мг, оставьте его/ее при комнатной температуре на 45 минут. Если вы не знаете точно, как долго нужно выдерживать препарат при комнатной температуре перед применением, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом. Не нагревайте препарат.
- Не взбалтывайте.
- Беречь от прямых солнечных лучей.
- Не выполняйте инъекцию в участок кожи в радиусе 5 см (2 дюймов) от пупка.
- Если вы уронили шприц на твердую поверхность или если шприц поврежден, не используйте его.
- Не наносите на чувствительную или поврежденную кожу, кожу с кровоподтеками, рубцами или заметными венами.
- Этот лекарственный препарат бесцветен или имеет светло-желтый цвет. Препарат также может быть прозрачным или слегка перламутровым. Не используйте раствор, если он изменил цвет, помутнел, протекает или содержит примеси.
- Не вводите через одежду.
- При каждой инъекции меняйте место укола.
- Каждая шприц-ручка и каждый предварительно заполненный шприц

предназначены исключительно для однократного применения. После введения дозы утилизируйте использованную шприц-ручку или шприц.

- Всю оставшуюся порцию препарата после введения дозы следует выбросить.
- Выкидывайте иглы в контейнер для использованных острых предметов/иголок. Иглы и другие предметы повторно использовать нельзя. Когда контейнер наполнится, утилизируйте его согласно местным правилам. Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

Дозировка один раз в неделю:

- Дайте пропущенную дозу, как только вспомните об этом, и начните новый график с даты введения этой дозы.

Если ваш ребенок принимаете данный препарат раз в 2 недели:

- Дайте ребенку пропущенную дозу как только вспомните, а следующую дозу — в обычное время.
- Если после пропуска дозы прошло более 7 дней, дайте пропущенную дозу и придерживайтесь нового графика с даты приема этой дозы.

Если ваш ребенок принимает данный препарат раз в месяц:

- Дайте ребенку пропущенную дозу как только вспомните, а следующую дозу — в обычное время.
- Если после пропуска дозы прошло более 7 дней, дайте пропущенную дозу и придерживайтесь нового графика с даты приема этой дозы.

Для всех целей применения данного препарата:

- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

- Если вы не уверены в том, что делать, если ваш ребенок пропустил дозу, свяжитесь с врачом.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Храните в холодильнике. Не замораживайте.
- Храните в оригинальной упаковке для защиты от света.
- При необходимости препарат можно хранить при комнатной температуре не выше 25 °C (77 °F) до 30 дней. Запишите дату, когда вы достали препарат из холодильника. Если препарат хранился при комнатной температуре и не использовался в течение 14 дней, его следует выбросить.
- Защищайтесь от воздействия тепла и солнечных лучей.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы,

касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Дата последнего пересмотра

2026-07-02

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Dupilumab - Last updated on December 12, 2022
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Memorial Sloan Kettering Cancer Center