

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И  
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

## Epinephrine (Systemic)

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Торговые наименования: США

Adrenalin; Adrenalin-NaCl; Auvi-Q; Epinephrine Professional; EPINEPHrinesnap; EpinephrineSnap-EMS; Epinephrinesnap-v; EpiPen 2-Pak; EpiPen Jr 2-Pak; EPIsnap [DSC]; Neffy; Symjepi [DSC]

### Торговые наименования: Канада

Adrenalin; Allerject [DSC]; Anapen Junior [DSC]; Anapen [DSC]; Emerade [DSC]; EpiPen; EpiPen Jr; Neffy

### Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения аллергической реакции.
- Применяется для лечения пониженного кровяного давления.

- Этот препарат применяют в хирургии глаза.
- Этот препарат применяют при остановке сердцебиения.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

### **Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?**

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием

или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

**Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?**

**Все формы выпуска:**

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Если у вашего ребенка аллергия на сульфиты, проконсультируйтесь с врачом. В некоторых продуктах содержатся сульфиты.
- Если у Вашего ребенка повышенный уровень глюкозы в крови (диабет), необходимо регулярно проверять уровень глюкозы в крови ребенка.

**Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:**

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

## **Все инъекционные препараты:**

- Не делайте инъекции в такие места, как пальцы и кисти рук, ступни. Такие действия могут привести к снижению кровотока в этих участках. Если данный лекарственный препарат был введен по ошибке, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

## **Офтальмологические продукты:**

- Яркий свет может вызвать у ребенка раздражение. Следите, чтобы Ваш ребенок носил солнцезащитные очки.

## **Спрей для носа:**

- Поговорите с врачом, если у вашего ребенка полипы в носу или если у ребенка когда-то были перелом костей носа, травма носа или операция на носу. Этот препарат может быть неэффективным.

**О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской

помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

### **Все формы выпуска:**

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Признаки повышенного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль, или головокружение, или потеря сознания, или нарушение зрения.
- Боль или давление в груди.
- Учащенное сердцебиение.
- Одышка.
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.

- Применение данного препарата сопровождалось серьезным нарушением сердечного ритма. Иногда такие случаи приводили к летальным исходам. Риск повышается, если у вашего ребенка уже есть нарушения со стороны сердца или он принимает определенные препараты. При появлении у ребенка нарушения сердечного ритма немедленно обратитесь к врачу.

### **Все инъекционные препараты:**

- Признаки пониженного содержания калия, такие как боли или слабость в мышцах, мышечные судороги либо ощущение нарушенного сердцебиения.
- Затруднение при мочеиспускании или изменение количества выделяемой мочи.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.

### **Инъекция (при аллергических реакциях):**

- В редких случаях в месте применения этого препарата развивались инфекции. Иногда такие инфекции могут быть очень серьезными. Немедленно обратитесь к врачу при появлении у вашего ребенка таких симптомов инфекции, как стойкое покраснение, местное повышение

температуры, отечность или болезненность.

### **Инъекция (в вену):**

- При вытекании из вены данный лекарственный препарат может вызвать повреждение тканей. Сообщите медсестре, если у Вашего ребенка возникнет покраснение, жжение, боль, отек, волдыри, язвы на коже или вытекание жидкости в месте введения препарата.

### **Спрей для носа:**

- Спутанность сознания.
- Нарушение или потеря памяти.

### **Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?**

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

### **Все формы выпуска:**

- Чувство тревоги, нервозность, возбудимость, шаткость при ходьбе или беспокойство.

- Тошнота или рвота.
- Излишнее потоотделение.
- Бледная кожа.
- Головная боль.

### **Инъекция:**

- Чувство головокружения, усталости или слабости.
- Гусиная кожа.

### **Спрей для носа:**

- Раздражение носа или горла.
- Носовое кровотечение.
- Ощущения покалывания.
- Ощущение тревоги.
- Насморк или заложенность носа.
- Сухость в носу или горле.
- Чихание.
- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Боль в кишечнике.
- Онемение в полости рта.
- Боль в деснах.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

### **Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?**

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

### **Инъекция (при аллергических реакциях):**

- Для внутримышечных или подкожных инъекций.
- Этот препарат нельзя вводить в вену.
- Способ применения нужно изучить до возникновения неотложной ситуации. Прочитайте листок-вкладыш, содержащийся в упаковке с лекарством. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.
- Всегда держите препарат при себе и давайте с собой вашему ребенку. Храните запас препарата на

работе, в школе и дома.

- Для введения этого препарата может понадобиться чья-то помощь. Убедитесь, что окружающие знают, где хранится данный препарат, а также как при необходимости его вводить.
- Ни в коем случае не прикасайтесь пальцами или руками к наконечнику.
- Проверьте устройство, перед тем как использовать его, чтобы убедиться, что предохранитель находится на месте и что устройство можно извлечь из корпуса. Не снимайте предохранитель до тех пор, пока не будете готовы к использованию.
- Снимите предохранительный колпачок. Сразу же после введения препарата предохранительный колпачок следует выбросить. Если ребенок или домашнее животное случайно проглотит предохранительный колпачок, у него может произойти удушье.
- Делайте инъекцию прямо во внешнюю сторону бедра согласно инструкциям. Этот лекарственный препарат можно вводить через одежду, если необходимо. Введите и держите столько, сколько Вам сказали.
- Не вводите в ягодицы.

- Во избежание травм при введении данного препарата Вашему ребенку держите его ногу неподвижно. Ограничьте движения Вашего ребенка перед инъекцией и после нее.
- После применения данного препарата немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Положите в контейнер.
- Возьмите с собой в больницу.
- Каждое из приспособлений содержит только 1 дозу и не подлежит повторному использованию. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, используйте новое приспособление.
- Если после применения этого препарата симптомы аллергической реакции не проходят или усиливаются, врач может порекомендовать вам использовать вторую дозу препарата. Важно соблюдать необходимый интервал между дозами. Проследите, чтобы у вашего ребенка при себе всегда были 2 устройства. Со всеми вопросами обращайтесь к врачу.
- Не применяйте данный препарат, если раствор изменил цвет, помутнел или содержит частицы. Возьмите новый.
- Если срок годности этого препарата истекает,

обратитесь за новым рецептом до того, как понадобится новая доза.

- Если устройство было активировано случайно, не используйте его в экстренных случаях. Замените устройство новым.

### **По другим причинам:**

- Врач Вашего ребенка даст ему данный препарат.

### **Спрей для носа:**

- Только для носа.
- Способ применения нужно изучить до возникновения неотложной ситуации. Прочитайте листок-вкладыш, содержащийся в упаковке с лекарством. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.
- Всегда держите препарат при себе и давайте с собой вашему ребенку. Храните запас препарата на работе, в школе и дома.
- Для введения этого препарата может понадобиться чья-то помощь. Убедитесь, что окружающие знают, где хранится данный препарат, а также как при необходимости его вводить.
- Не вынимайте этот лекарственный препарат из

контейнера, пока не будете готовы использовать его. Не заполняйте и не тестируйте этот препарат до использования.

- Каждое из приспособлений содержит только 1 дозу и не подлежит повторному использованию. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, используйте новое приспособление.
- Впрыскивайте аэрозоль в полость носа. Не распыляйте спрей на носовую перегородку или на внешнюю сторону носа.
- Если после приема этого препарата симптомы аллергической реакции не ослабнут или усилятся, вы можете дать вторую дозу через 5 минут после первой дозы по назначению врача. Если вам нужно будет ввести 2 дозы препарата, распылите вторую дозу в ту же ноздрю, что и первую дозу. Вашему ребенку рекомендуется всегда иметь при себе два устройства. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом.
- Попросите ребенка не вдыхать носом во время и сразу после впрыскивания препарата. Если ребенок случайно сделал вдох и симптомы не улучшились или же ухудшились, впрысните вторую дозу в ту же ноздрю через 5 минут после первой.

- После применения данного препарата немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Если срок годности этого препарата истекает, обратитесь за новым рецептом до того, как понадобится новая доза.
- Не следует намеренно замораживать этот препарат. Этот препарат можно использовать, если его заморозили и разморозили. В неотложной ситуации не ждите, пока препарат разморозится. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

### **Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?**

- Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

### **Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?**

#### **Инъекция (в вену):**

- Если вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, медсестры или фармацевта.

#### **Все остальные инъекционные препараты:**

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.
- Не подвергайте воздействию тепла, холода и света.

## **Инъекция (при аллергических реакциях):**

- Сохраните, в случае если Вам кто-то вводил.

## **Спрей для носа:**

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Храните этот препарат в блистерной упаковке до момента использования. Его также можно хранить в футляре, который поставляется с этим препаратом.

## **Все формы выпуска:**

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## **Общие сведения о лекарственных препаратах**

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю

понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-04-17

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Epinephrine (Systemic - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center