

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Naloxone

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

FT Naloxone HCl [OTC]; Kloxxado; Narcan [DSC]; Narcan [OTC]; Rextovy; Rezenopy; RiVive [OTC]; Zimhi [DSC]

Торговые наименования: Канада

Narcan; S.O.S. Naloxone Hydrochloride; TEVA Naloxone

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяют для предупреждения побочных эффектов некоторых препаратов.
- Данный препарат используется для лечения передозировки некоторых лекарств.
- Данный препарат можно давать детям и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

Сочетание этого препарата с некоторыми лекарствами и заболеваниями может быть неблагоприятно.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

Все формы выпуска:

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Если у вашего ребенка расстройство, связанное с употреблением опиоидов, у него могут появиться признаки синдрома отмены опиоидов на фоне приема данного лекарственного препарата. Некоторые из этих признаков — потливость, тремор, высокая температура, озноб, диарея, тошнота, рвота, спазмы в животе, гусиная кожа, боли в теле, тревога, чувство раздражительности, зевота и учащенное сердцебиение.
- У новорожденных до 4 недель, регулярно получавших опиоидные препараты, внезапная отмена препарата может стать угрожающим жизни состоянием, если немедленно не начать лечение. Немедленно обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка появились судороги, либо он плачет больше обычного, либо у него отмечается повышение рефлексов.
- Проконсультируйтесь с врачом по поводу оптимальной формы этого

препарата для приема у детей.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.
- При применении во время беременности, препарат может вызывать синдром отмены у еще не родившегося ребенка. После применения данного препарата врач должен провести обследование еще не родившегося ребенка.

Продукция в инъекционной форме, отличная от автоматических медицинских шприцев и предварительно заполненных шприцев:

- Зарегистрированы случаи очень тяжелых побочных эффектов, когда данный лекарственный препарат применялся после хирургического вмешательства. Среди них повышенное или пониженное кровяное давление, нарушения сердечного ритма, а также некоторые другие нарушения со стороны легких или сердца. В некоторых случаях такие побочные эффекты приводили к нарушениям со стороны головного мозга, коме или смерти. Проконсультируйтесь с врачом.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно

в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Признаки повышенного или пониженного кровяного давления, такие как очень сильная головная боль или головокружение, обморок или изменения со стороны зрения.
- Боль в груди, стенокардия, тахикардия или нарушение сердечного ритма.
- Одышка.
- Судороги.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Перемены настроения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

Спрей для носа:

- Мышечная боль.
- Мышечный спазм.
- Головная боль.
- Сухость в носу.
- Насморк или заложенность носа.

- Отек слизистой носа.
- Запор.
- Зубная боль.
- Сухая кожа.
- Боль в кишечнике.
- Изменение способности к восприятию вкуса.
- Головокружение.
- Ощущение усталости или слабости.
- У некоторых людей могут быть такие симптомы, как потливость, тремор, тошнота или чувство гнева, когда они просыпаются после приема этого препарата. Это нормально.

Все инъекционные препараты:

- Тошнота или рвота.
- Головокружение.
- Раздражение в месте инъекции.
- Приливы.
- Гиперемия (румянец).

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Назальный спрей, автоматический шприц для инъекций и предварительно заполненные шприцы :

- Если вы будете сами делать уколы своему ребенку, врач вашего ребенка или медсестра научат вас делать инъекции.
- Убедитесь, что вы знаете признаки передозировки и когда давать этот препарат. Если вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом ребенка.
- Способ применения нужно изучить до возникновения неотложной ситуации. Прочитайте листок-вкладыш, содержащийся в упаковке с лекарством. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом при возникновении вопросов по применению данного лекарственного препарата.
- Для введения этого препарата может понадобиться чья-то помощь. Убедитесь, что окружающие знают, где хранится данный препарат, а также как при необходимости его вводить.
- После введения этого препарата симптомы передозировки могут проходить и появляться снова. После применения данного препарата важно немедленно обратиться за медицинской помощью.
- Каждое из приспособлений содержит только 1 дозу и не подлежит повторному использованию. Если необходимо ввести еще одну дозу препарата, используйте новое приспособление.
- Если срок годности этого препарата истекает, обратитесь за новым рецептом до того, как понадобится новая доза.

Спрей для носа:

- Только для носа.
- Для одного применения используется 1 распыление.
- При применении более 1 дозы каждую дозу нужно вводить в разный носовой проход.
- Не вынимайте этот препарат из упаковки или блистера, пока не будете готовы использовать его. Не заполняйте распылитель и не тестируйте его до применения.

- Если препарат был заморожен, некоторые торговые марки допускают его оттаивание при комнатной температуре перед использованием. В неотложной ситуации не ждите оттаивания препарата. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Предварительно заполненные шприцы и автоматические инъекторы:

- Для внутримышечных или подкожных инъекций.
- Делайте инъекцию прямо во внешнюю сторону бедра согласно инструкциям. Этот лекарственный препарат можно вводить через одежду, если необходимо. Введите и держите столько, сколько Вам сказали.
- Не применяйте данный препарат, если раствор изменил цвет, помутнел или содержит частицы. Возьмите новый.

Все остальные инъекционные препараты:

- Для внутримышечных, внутривенных или подкожных инъекций.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Спрей для носа:

- Хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре.
- Не храните при температуре выше 104 °F (40 °C).
- Не замораживайте.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.

Предварительно заполненные шприцы и автоматические

инъекторы:

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Храните в выданной вам коробке для защиты от света.

Все остальные инъекционные препараты:

- Если вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у врача вашего ребенка, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим

работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2026-02-23

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Naloxone - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center