

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Palovarotene

Этот документ, предоставленный UpToDate® Lexidrug™, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Sohonos

Торговые наименования: Канада

Sohonos

Предупреждение

- Не давайте данный лекарственный препарат своему ребенку во время беременности. Использование препарата во время беременности может вызвать врожденные пороки развития или внутриутробную смерть плода.
- Если ваш ребенок находится в детородном

возрасте, то перед началом приема препарата и в период его применения необходимо проводить тесты на беременность, чтобы убедиться в ОТСУТСТВИИ беременности.

- Если ваш ребенок может забеременеть, он должен использовать противозачаточные средства в течение 1 месяца до начала приема данного препарата, во время лечения и в течение 1 месяца после приема последней дозы. Если ваш ребенок принимает этот препарат только в случае обострений, ему нужно будет использовать противозачаточные средства постоянно. Убедитесь, что ребенок знает, какой тип противозачаточных средств использовать и когда их использовать. Если вы не уверены, посоветуйтесь с врачом.
- Если Ваша дочь забеременеет в период приема данного лекарственного препарата или в течение 1 месяца после приема последней дозы, немедленно свяжитесь с врачом.
- Этот препарат может нарушить рост костей. Это может привести к прекращению роста ребенка. Во время лечения этим препаратом дети должны проходить регулярное измерение роста.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Он используется для замедления роста кости там, где она обычно не растет, у людей с прогрессирующей фиброзной остеодисплазией (FOP).

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: заболевание почек или заболевание печени.
- Если ваш ребенок применяет аналогичный препарат. В случае сомнений проконсультируйтесь с лечащим врачом вашего ребенка или фармацевтом.
- Если ваш ребенок принимает какие-либо препараты (как рецептурные, так и безрецептурные, препараты природного происхождения, витамины), которые нельзя принимать одновременно с данным препаратом, например некоторые препараты для лечения ВИЧ, инфекций, судорог и др. Существует множество препаратов, которые нельзя принимать

одновременно с этим препаратом.

Если Ваш ребенок ведет или может вести половую жизнь:

- Если Ваш дочь может забеременеть и не использует противозачаточное средство.

Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:

- Следите за тем, чтобы Ваша дочь не кормила ребенка грудью во время приема данного препарата и в течение 1 месяца после прекращения его приема.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного

препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Может возникнуть ухудшение ночного зрения. Это может случиться внезапно. Этот эффект может исчезнуть после прекращения приема вашим ребенком препарата, но иногда он сохраняется. Следите, чтобы ребенок был осторожен во время занятий, требующих четкого зрения.
- Этот препарат может сделать кости более хрупкими или ломкими. Это может увеличить риск перелома кости.
- Следуйте указаниям врача по отслеживанию результатов анализов крови и других лабораторных анализов ребенка. Сюда входят рентгеновские снимки позвоночника.
- Следите за тем, чтобы капсулы не попали к

беременным или тем, кто может забеременеть.

- Ваш ребенок в большей степени подвержен получению солнечного ожога. Избегайте длительного пребывания на солнце, использования солнечных ламп и горизонтальных соляриев. Пользуйтесь солнцезащитным средством и следите, чтобы ребенок носил защищающую от солнца одежду и солнцезащитные очки.
- При применении данного препарата часто возникает сухость глаз. Можно использовать препараты искусственной слезы, увлажняющие гели для глаз или другие продукты для предотвращения или лечения сухости глаз. При наличии вопросов проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.
- Не давайте Вашему ребенку грейпфрут или грейпфрутовый сок.
- Следите, чтобы ребенок не потреблял витамин А из других источников.
- Проконтролируйте, чтобы ваш ребенок не сдавал кровь в качестве донора, пока принимает данный препарат и в течение 1 недели после прекращения его приема.
- Этот препарат не предназначен для лечения детей. Прежде чем давать этот препарат ребенку,

проконсультируйтесь с врачом.

- Если у вашего ребенка изменяется масса тела, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, потребуется изменить прием данного лекарственного препарата.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.

- Признаки кожной инфекции, такие как мокнутие, повышение температуры, отек, покраснение или боль.
- Появление или усугубление поведенческих или эмоциональных расстройств, таких как депрессия или мысли о самоубийстве.
- Отек рук или ног.
- Изменение состояния ногтей.
- Костная боль.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Сухие глаза.
- Сухость во рту.
- Тошнота.
- Боль в спине, мышцах или суставах.
- Головная боль.

- Боль в руках или ногах.
- Ощущение усталости или слабости.
- При применении данного лекарственного препарата часто возникает раздражение кожи. Оно может выражаться как сухость кожи; сухие, шелушащиеся или потрескавшиеся губы; выпадение волос; зуд; покраснение кожи; сыпь; шелушение кожи и экзема. Он также может увеличивать риск развития инфекций кожи. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о способах профилактики или лечения раздражения кожи. Свяжитесь с врачом, если какой-либо из этих эффектов имеет тяжелое течение, беспокоит ребенка или не проходит.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте

всем инструкциям.

- Давайте данный препарат с пищей.
- Давайте данный препарат в одно и то же время дня.
- Попросите ребенка проглотить целиком. Попросите ребенка не жевать и не крошить.
- При необходимости вы можете открыть капсулу и высыпать содержимое на 1 чайную ложку (5 мл) мягкой пищи, такой как яблочное пюре, обезжиренный йогурт или теплая овсянка. Не смешивайте с грейпфрутом, помело и соками, в которых содержатся эти фрукты. Дайте своему ребенку проглотить смесь в течение 1 часа после приготовления. Не допускайте попадания на смесь прямых солнечных лучей и не храните ее для дальнейшего применения.
- Для обращения с этим лекарственным препаратом одевайте перчатки.
- Если вы открываете капсулу, используйте бумажные полотенца и герметичный контейнер (например запечатываемый пакет), чтобы собрать и выбросить любые отходы.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если задержка приема дозы составила более 6 часов, пропустите забытую дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не применяйте 2 дозы в один день.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните в картонной коробке для защиты от света.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья

Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.

- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты

диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2025-04-07

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Palovarotene - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center