

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Peanut Allergen Powder

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Palforzia

Предупреждение

- При применении данного лекарственного препарата отмечалось возникновение аллергических реакций. Некоторые реакции изредка могут быть очень тяжелыми или угрожающими жизни. Проконсультируйтесь с врачом.
- При введении первой дозы и всякий раз, когда потребуется повысить дозу относительно прежнего уровня, пациент будет находиться в медицинском учреждении.
- Врач назначит вам другой препарат (эпинефрин) для применения в случае развития аллергической реакции. Убедитесь, что Вы точно знаете, как и когда следует его применять. Некоторые лекарственные средства могут снижать эффективность эпинефрина или повышать риск развития побочных эффектов. К ним относятся некоторые лекарственные препараты, назначаемые для лечения депрессии, нарушений со стороны сердца или повышенного кровяного давления. Существует большое количество лекарственных препаратов, которые взаимодействуют с эпинефрином. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом и убедитесь в том, что применение эпинефрина вместе со всеми остальными лекарственными препаратами Вашего ребенка безопасно.
- Не давайте этот препарат, если у ребенка тяжелая или неконтролируемая астма.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяется для снятия симптомов аллергии на арахис. Этот препарат не предназначен для лечения аллергических реакций.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если ваш ребенок когда-либо испытывал сильную аллергическую реакцию.
- Если у вашего ребенка когда-либо был эозинофильный эзофагит или другое эозинофильное заболевание желудка или кишечника.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратов и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Следите за тем, чтобы ребенок придерживался диеты в соответствии с указаниями врача.

- Ваш ребенок должен продолжать избегать арахиса, как сказал врач.
- Алкоголь может взаимодействовать с данным лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
- Если у вашего ребенка диагностировано какое-либо заболевание, например вирусная инфекция, он ограничивает потребление пищи, чувствует выраженную усталость или недосыпание, у вашей дочери менструация или если ребенок принимает нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП), например ибупрофен или напроксен, сообщите об этом врачу. Это может быть сопряжено с повышенным риском аллергических реакций.
- Не давайте этот препарат ребенку в течение 3 часов до и 3 часов после физических нагрузок или принятия горячего душа и горячей ванны. Если у ребенка наблюдаются чувство жара, потливость, учащенное дыхание или сердцебиение после физических нагрузок или горячего душа и горячей ванны, прежде чем дать ему препарат, дождитесь, пока эти явления не исчезнут.
- Если у Вашего ребенка астма, которую все тяжелее контролировать, или если у Вашего ребенка затрудненное дыхание, немедленно свяжитесь с врачом.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего

ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Затрудненное глотание или речь.
- Боль при глотании.
- Изжога.
- Боль или давление в груди, учащенное сердцебиение или обморок.
- Головокружение.
- Гиперемия (румянец).
- Одышка.
- Тяжелая диарея.
- Желудочные колики.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Боль в кишечнике.
- Тошнота или рвота.
- Зуд в ушах, на языке или во рту.

- Онемение или покалывание во рту.
- Першение в горле.
- Кашель.
- Насморк.
- Чихание.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Давайте во время еды.
- Давайте данный препарат в одно и то же время дня. Препарат лучше всего принимать в вечернее время.
- Не допускайте, чтобы ребенок проглатывал капсулы или вдыхал порошок.
- Откройте капсулу или пакетик и добавьте содержимое к нескольким ложкам мягкой пищи, например яблочного пюре, йогурта или пудинга. Хорошо перемешайте. Не смешивайте препарат с жидкостями.
- Дайте ребенку дозу препарата сразу после смешивания. Не храните для дальнейшего использования.
- Продолжайте давать этот лекарственный препарат в соответствии с

указаниями врача Вашего ребенка или другого медицинского работника, даже если у Вашего ребенка хорошее самочувствие.

- Всю оставшуюся порцию препарата после введения дозы следует выбросить.
- После применения помойте руки.
- Если у ребенка назначен визит к врачу для повышения дозы препарата, не давайте ему препарат в этот день.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход дальнейших действий.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить в холодильнике или при комнатной температуре.
- Не замораживайте.
- Берегите от жары.
- Храните в первичном контейнере.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов.

Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2023-04-11

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2024. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Peanut Allergen Powder - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center