

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Phenylbutyrate

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Buphenyl; Olpruva; Pheburane

Торговые наименования: Канада

Pheburane

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Этот препарат применяют для лечения нарушений мочеиспускания.
- Этот препарат не предназначен для лечения внезапно повысившихся уровней аммиака. Обязательно узнайте признаки высокого уровня аммиака. Внезапно повысившийся уровень аммиака требует неотложной медицинской помощи и может быть смертельным. Посоветуйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.
- Если ваш ребенок получает лечение любым из следующих

лекарственных препаратов: дивальпроекс, галоперидол или вальпроевая кислота.

- Если у Вашего ребенка имеются редкие наследственные нарушения, такие как недостаточное всасывание глюкозы и галактозы, непереносимость фруктозы или дефицит сахаразы/изомальтазы. В некоторых продуктах содержится сахароза.
- Если масса тела ребенка менее 44 фунтов (20 кг). Некоторые торговые наименования не предназначены для применения у детей с массой тела менее 44 фунтов (20 кг).

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Часто сдавайте анализ крови вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка.
- Следите за тем, чтобы ребенок придерживался диеты в соответствии с указаниями врача.

- Следите, чтобы Ваш ребенок носил с собой медицинскую карточку с описанием своего заболевания и контактными данными.
- Если Ваш ребенок придерживается диеты с низким содержанием натрия или бессолевой диеты, проконсультируйтесь с врачом. Некоторые из этих препаратов содержат натрий.
- Если у вашего ребенка изменяется масса тела, проконсультируйтесь с врачом. Возможно, потребуется изменить прием данного лекарственного препарата.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Симптомы повышения кислотности крови (ацидоза), такие как спутанность сознания, учащенное дыхание, тахикардия, нарушение сердцебиения, очень сильная боль в животе, тошнота или рвота, выраженная сонливость, одышка, повышенная утомляемость или

слабость.

- Признаки электролитных нарушений, такие как перепады настроения, спутанность сознания, мышечная боль, судороги или спазмы, слабость, тремор, нарушения равновесия, аритмия, судорожные припадки, потеря аппетита, а также сильная тошнота или рвота.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Головокружение или головная боль.
- Тошнота или рвота.
- Сонливость.
- Спутанность сознания.
- Изменение слуха.
- Нарушение или потеря памяти.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Воспаление.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Пониженный аппетит.
- Неприятный вкус во рту у ребенка.
- Изменение запаха тела.

Если у Вашей дочери начался менструальный цикл:

- Отсутствие менструаций или другие нарушения менструального цикла.

Данный список возможных побочных эффектов не является

исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Порошок и таблетка:

- Давайте этот препарат во время приема пищи.

Порошок:

- Перед употреблением взбалтывать.
- Смешайте порошок с жидкой или мягкой пищей.
- Используйте только прилагающуюся мерную ложечку для определения дозировки порошка.
- После смешивания с пищевыми продуктами дайте дозу немедленно. Не храните препарат для дальнейшего применения. После смешивания с водой можно хранить при комнатной температуре или в холодильнике до 1 недели.
- Этот препарат могут применять пациенты с питательными трубками. Применяйте в соответствии с указаниями. После применения данного препарата промойте питательную трубку.

Пеллеты для приема внутрь:

- Давайте данный препарат с пищей.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- Используйте только дозатор, продающийся вместе с лекарством.
- Пусть ваш ребенок проглотит гранулы с напитком, например с водой, фруктовым соком или детской смесью, не содержащей белка. Вы также можете высыпать гранулы на ложку яблочного соуса или морковного пюре. Не позволяйте ребенку разжевывать гранулы. Не смешивайте гранулы и жидкость. Проследите, чтобы ребенок проглотил гранулы сразу.
- Если у вашего ребенка установлен зонд для энтерального питания, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем давать ему этот препарат.

Гранулы для приема внутрь (саше):

- Этот препарат поставляется в форме 2 саше на каждую дозу. В одном саше содержится вещество Mix-Aid, помогающее препарату раствориться в воде. В другом саше — сам препарат. Обязательно узнайте, в каком саше находится Mix-Aid, а в каком — сам препарат.
- Чтобы смешать этот препарат, сначала высыпьте содержимое саше с веществом Mix-Aid в чашку с водой. Количество Mix-Aid и используемой воды зависит от дозы. Убедитесь, что вы знаете дозировку. Размешайте до полного растворения. Затем добавьте в чашку содержимое саше с самим препаратом и снова размешайте.
- Дайте ребенку выпить всю дозу в течение 5 минут после смешивания. После этого налейте в ту же чашку еще воды и дайте ее выпить ребенку, чтобы он точно принял полную дозу препарата. Убедитесь, что вы знаете, сколько воды нужно использовать.
- Если ваш ребенок не принял этот препарат в течение 30 минут после смешивания, вылейте его.
- Если у вашего ребенка установлен зонд для энтерального питания, проконсультируйтесь с его врачом перед приемом этого препарата. Этот препарат не совместим с определенными типами зондов для энтерального питания.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы

лекарственного препарата?

Порошок и таблетка:

- Дайте пропущенную дозу при первой возможности во время приема пищи.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- Дайте пропущенную дозу сразу, как только вспомните, с пищей.
- Если до приема следующей дозы остается менее 3 часов, не принимайте пропущенную дозу и вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует давать двойную дозу одновременно или дополнительные дозы.

Гранулы для приема внутрь (саше):

- Дайте ребенку пропущенную дозу с пищей в тот же день, когда она была пропущена, как только вспомните об этом.
- Если вы не вспомнили о пропущенной дозе до следующего дня, не компенсируйте пропуск и дайте ребенку принять очередную дозу в обычное время.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Все формы выпуска:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните

все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Гранулы для приема внутрь (флакон), порошок и таблетки:

- Держите крышку плотно закрытой.

Гранулы для приема внутрь (флакон):

- После вскрытия упаковки выбросьте все неиспользованные порции по истечении 45 дней.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

2025-11-03

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026.
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Phenylbutyrate - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center