

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И
УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid

Этот документ, предоставленный Lexicomp[®], содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Clenpiq

Торговые наименования: Канада

Oral Purgative; Pico-Salax; Picodan; Picoflo; Purg-Odan

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для очищения желудочно-кишечного тракта.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты,

продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

- Если у вашего ребенка имеется любое из перечисленных нарушений состояния здоровья: непроходимость кишечника, обезвоживание, нарушения электролитного баланса (например, натрия, калия, фосфатов), удлинённая толстая кишка, перфорация ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) или замедленная перистальтика ЖКТ (желудочно-кишечного тракта).
- Если у Вашего ребенка заболевание почек.
- Если Ваш ребенок получает другие слабительные средства.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими

лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- При наличии у ребенка риска нарушения сердечного ритма проконсультируйтесь с врачом. Врач может назначить ребенку электрокардиографию до и после использования этого лекарственного препарата.
- Не давайте ребенку другие слабительные средства или размягчители стула, если это не рекомендовано его лечащим врачом.
- Алкоголь может взаимодействовать с данным лекарственным препаратом. Следите за тем, чтобы ребенок не употреблял алкоголь.
- У некоторых пациентов во время приема данного

лекарственного препарата возникали обезвоживание и потеря сознания. Обморок может привести к падению и серьезным травмам (например, травме головы или перелому костей). Ваш ребенок обязательно должен пить достаточное количество прозрачных напитков во время приема этого лекарственного препарата. Из сидячего или лежачего положения ребенку следует подниматься медленно. Подниматься и спускаться по лестнице ребенку следует с осторожностью.

Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов,

которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Вздутие.
- Отек живота.
- Желудочные колики.
- Рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной гущи.
- Черный, смолистый стул или стул с кровью.
- Боль в прямой кишке или ректальная боль.
- Затрудненное глотание.
- Этот препарат может вызвать обезвоживание организма и электролитный дисбаланс у вашего ребенка. В редких случаях они могут быть тяжелыми или смертельно опасными. Немедленно сообщите врачу, если у вашего ребенка кружится голова, он теряет сознание, чувствует усталость или слабость

или испытывает трудности при мочеиспускании. Немедленно сообщите врачу, если у вашего ребенка наблюдаются учащенное сердцебиение или нарушение сердечного ритма, судороги, головная боль, изменения настроения, спутанность сознания, мышечная боль или слабость, повышенная жажда, снижение аппетита, сухость во рту или глазах, сильная тошнота или рвота, изменение количества выделяемой мочи.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Тошнота или рвота.
- Боль в кишечнике.
- Головная боль.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к

врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Все формы выпуска:

- Давайте данный лекарственный препарат в соответствии с указаниями врача. Строго следуйте всем инструкциям. К ним относятся режим применения данного лекарственного препарата, продукты питания и напитки, запрещенные к употреблению перед проведением обследования, а также время, за которое Вашему ребенку необходимо прекратить употребление пищи и напитков перед обследованием. Если у Вас имеются любые вопросы, проконсультируйтесь с врачом.
- Не разрешайте ребенку употреблять твердую пищу и молочные продукты, в том числе молоко, во время приема этого препарата.

- После приема каждой дозы этого препарата ваш ребенок должен пить больше, чем обычно. Узнайте, какой объем жидкости вашему ребенку нужно выпивать после каждой дозы препарата.
- Вашему ребенку следует пить прозрачные напитки разных видов до, во время и после приема этого лекарственного препарата. Ваш ребенок не должен пить только простую воду. Убедитесь, что 1 прозрачный напиток представляет собой раствор электролитов, например спортивный напиток. Другими прозрачными напитками могут быть черный кофе или чай (без молока или сливок), прозрачный суп или бульон, прозрачный сок без мякоти, имбирный эль, другие газированные напитки, простое желе и фруктовый лед.
- НЕ позволяйте ребенку принимать жидкости, желе или фруктовый лед, которые имеют фиолетовый или красный цвет. Не давайте ребенку пить молоко или алкогольные напитки.
- Если вы не получили от врача иных инструкций, ребенку следует воздерживаться от питья по меньшей мере 2 часа до проведения обследования.
- Если после первого приема препарата у ребенка возникли такие симптомы, как сильная боль в животе, воспаление или вздутие живота, прием

второй дозы следует отложить до исчезновения данных явлений. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, задайте их лечащему врачу ребенка.

- Не давайте другие лекарственные препараты внутрь в течение 1 часа до начала приема каждой дозы данного препарата. Прием некоторых препаратов может понадобиться перенести на другое время, чтобы отделить его от приема данного препарата более длительным промежутком времени. Проконсультируйтесь с врачом вашего ребенка, как следует давать ему другие лекарственные препараты вместе с этим препаратом.

Порошок для приготовления раствора:

- Перед применением данного лекарственного препарата смешайте его с водой в соответствии с указаниями. Следите, чтобы ребенок не проглотил сухой порошок.
- Дайте ребенку дозу препарата сразу после смешивания. Не храните для дальнейшего использования.
- В раствор нельзя добавлять лед.

Жидкость (раствор):

- Этот препарат готов к приему. Этот препарат не

нужно разбавлять перед приемом.

- Раствор должен быть прозрачным, при этом вы можете заметить в нем несколько частиц. Это нормально.

Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?

- Свяжитесь с врачом Вашего ребенка, чтобы выяснить ход дальнейших действий.
- Если применение препарата не может быть завершено до обследования, свяжитесь с лечащим врачом ребенка.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Порошок для приготовления раствора:

- Храните при комнатной температуре.
- После смешивания не храните в холодильнике.

Жидкость (раствор):

- Храните при комнатной температуре. Не помещайте в холодильник или морозильник.

Все формы выпуска:

- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном

месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.

- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка

препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски

или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра
2025-03-05

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2026. Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Sodium Picosulfate, Magnesium Oxide, and Citric Acid - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center