

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

## Warfarin

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Торговые наименования: США

Jantoven

### Торговые наименования: Канада

APO-Warfarin; TARO-Warfarin

#### Предупреждение

- Данный препарат может вызвать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные кровотечения. Проконсультируйтесь с лечащим врачом.
- При возникновении у Вашего ребенка любого из этих симптомов кровотечений немедленно свяжитесь с врачом: образование синяков, черный, дегтеобразный или кровянистый стул, кровоточивость десен, кровь в моче, кашель с кровью, порезы, при которых долго не останавливается кровотечение, головокружение, ощущение очень сильной усталости или слабости, носовые кровотечения, боль или отечность, рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной гущи или очень сильная головная боль.
- Немедленно обратитесь к врачу, если у Вашего ребенка появилось

необычное вагинальное кровотечение или чрезмерно обильная менструация (менструальное кровотечение).

- Во время применения данного лекарственного препарата понадобится контролировать результаты анализов крови (показатели протромбинового времени/международного нормализованного отношения (ПВ/МНО)) Вашего ребенка. Это важно, чтобы убедиться в надлежащей эффективности лекарственного препарата, и для проверки наличия у Вашего ребенка риска возникновения кровотечения. Проверяйте показатели протромбинового времени/международного нормализованного отношения (ПВ/МНО) в соответствии с указаниями врача Вашего ребенка или другого медицинского работника. Если Вы не уверены в необходимости проверки показателей протромбинового времени/международного нормализованного отношения (ПВ/МНО), проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка или другим медицинским работником.
- На уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (ПВ/МНО) ребенка может повлиять диета и некоторые препараты. Проконсультируйтесь с врачом.
- Вашему ребенку необходимо избегать действий и занятий спортом, которые могут повысить риск получения травмы.

## Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Препарат применяется для лечения или профилактики тромбов.
- Применяется для снижения риска инфаркта миокарда, инсульта и летального исхода у некоторых людей.

## Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный лекарственный препарат?

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества.

**Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.**

- Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных заболеваний: нарушения со стороны кровеносных сосудов, в том числе: аневризма или расслаивающая аневризма аорты, кровотечения, кровоизлияние в головной мозг, язвенная болезнь в стадии обострения, кровотечение из желудка, кишечника, мочевых путей, половых органов или дыхательных путей, заболевания крови, инфекция сердца, пониженный уровень тромбоцитов, перикардит, недавно перенесенная операция на глазах, головном мозге или позвоночнике; либо очень высокое кровяное давление.
- Если Ваша дочь беременна, или есть вероятность беременности.
- Если Ваш ребенок запланирован на проведение хирургической операции, проконсультируйтесь с врачом.
- Сообщите врачу, что ваш ребенок принимает данный препарат, перед проведением спинальной анестезии или вмешательства на позвоночнике.
- Если ваш ребенок перенес спинномозговую анестезию, серьезную операцию или какие-либо процедуры на спинном мозге, необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
- Если Вы знаете, что Ваш ребенок не будет принимать данный лекарственный препарат или ему не будут проверять уровень протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR) в соответствии с указаниями врача.
- Если у вашего ребенка отмечается понижение уровня тромбоцитов, вызванное гепарином.

## **Если Ваша дочь беременна:**

- Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: определенное заболевание под названием преэклампсия, судороги во время беременности (эклампсия), индукция родов или угроза выкидыша.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

## **Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?**

- Сообщите о том, что Ваш ребенок принимает данный лекарственный препарат, всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинских уход за Вашим ребенком. К ним относятся врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка. Возможно, потребуется приостановить прием данного лекарственного препарата перед проведением определенных типов хирургических вмешательств в соответствии с указаниями врача. В случае приостановки лечения данным лекарственным препаратом врач сообщит Вам, когда можно будет возобновить применение данного лекарственного препарата после хирургического вмешательства или процедуры, проведенной Вашему ребенку.
- Будьте осторожны и оберегайте ребенка от получения травм, падений или аварий.
- Если ваш ребенок упал, поранился или ударился головой, немедленно свяжитесь с врачом. Проконсультируйтесь с врачом, даже если ваш ребенок нормально себя чувствует.
- Ваш ребенок может стать более подверженным кровотечениям. Примите меры, чтобы Ваш ребенок соблюдал осторожность и избегал

получения травм. Проследите, чтобы Ваш ребенок пользовался мягкой зубной щеткой.

- Проконсультируйтесь с детским врачом, если Ваш ребенок часто пьет грейпфрутовый сок или ест грейпфруты.
- Проконсультируйтесь с врачом перед тем, как давать Вашему ребенку препараты, содержащие аспирин, антикоагулянты, чеснок, женьшень, гinkго, ибупрофен или подобные ему соединения, болеутоляющие или витамин Е.
- Некоторые продукты могут повлиять на уровни протромбинового времени/международного нормализованного отношения (PT/INR) Вашего ребенка. Вашему ребенку следует придерживаться диеты, рекомендованной врачом или другим медицинским работником.
- Поговорите с врачом о количестве витамина К в рационе ребенка. Витамин К может влиять на эффективность данного лекарственного препарата. Вашему ребенку не следует избегать употребления всех продуктов питания, содержащих витамин К. Тем не менее, изо дня в день Вам понадобится следить за тем, чтобы количество витамина К в рационе ребенка было примерно одинаковым. Многие продукты питания содержат витамин К. К ним относятся некоторые виды зелени, листовые овощи, брокколи, печень и некоторые растительные масла. Получите перечень продуктов питания, содержащих витамин К, у лечащего врача ребенка. Не вносите значительных изменений в обычный рацион ребенка без консультации с лечащим врачом.
- Не давайте ребенку мультивитамины, натуральные продукты и диетические добавки без консультации с врачом. В них может содержаться витамин К.
- Проследите, чтобы Ваш ребенок всегда носил с собой карту безопасности пациента.
- При появлении у Вашего ребенка диареи, высокой температуры тела или инфекции немедленно обратитесь к врачу.
- Если Ваш ребенок прекратил или начал курить, проконсультируйтесь с врачом. Может потребоваться изменить необходимую Вашему ребенку

дозу лекарственного препарата.

- Если Ваш ребенок уроженец Азии, применяйте этот препарат осторожно. У Вашего ребенка может наблюдаться больше побочных эффектов.
- Применение данного лекарственного препарата сопровождалось очень тяжелым, а иногда смертельно опасным нарушением состояния здоровья, поражающим кожу (кальцифилаксия). Это отмечалось как у пациентов с очень тяжелыми нарушениями со стороны почек, так и у пациентов без таких нарушений. Проконсультируйтесь с врачом.
- Если ваш ребенок находится в детородном возрасте, перед началом приема препарата необходимо провести тест на беременность, чтобы убедиться в отсутствии беременности.

### **Если Ваш ребенок ведет или может вести половую жизнь:**

- При применении Вашей дочерью лекарственного препарата во время беременности возможно вредное влияние препарата на плод.
- Если ваш ребенок может забеременеть, во время применения этого препарата и в течение 1 месяца после приема его последней дозы ему необходимо будет использовать противозачаточные средства. Если ваш ребенок забеременеет, немедленно обратитесь к врачу.

### **Если Ваша дочь кормит ребенка грудью:**

- Сообщите врачу, если Ваша дочь кормит ребенка грудью. Вам необходимо будет проконсультироваться о возможных рисках для ребенка.

### **О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется

любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Слабость на 1 стороне тела, затрудненная речь или мышление, проблемы с сохранением равновесия, обвисание одной стороны лица или нечеткость зрения.
- Боль в груди.
- Сильное головокружение или обморок.
- Воспаление, ощущение тепла, онемение, изменение цвета или боль в ноге или руке.
- Сильная головная боль.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Воспаление.
- Изменение цвета кожи на черный или фиолетовый.
- В редких случаях возможно омертвение кожной ткани. Это может привести к потере части тела (ампутации) и может привести к смерти. В случае возникновения у Вашего ребенка боли, изменения цвета или температуры в любой части тела немедленно обратитесь к врачу.
- Если у Вашего ребенка нарушение функции почек или он перенес его ранее, проконсультируйтесь с врачом. Возможны повреждения почек. Немедленно свяжитесь с врачом в случае возникновения у Вашего ребенка признаков проблем с почками, в т. ч. отсутствие мочеиспускания, изменение объема мочи, кровь в моче либо резкий набор массы тела.

**Каковы некоторые другие побочные эффекты данного**

## **лекарственного препарата?**

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если ребенка беспокоят любые побочные эффекты или если они не проходят.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

## **Как лучше всего давать этот лекарственный препарат?**

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

- Давайте этот препарат строго в соответствии с указаниям врача даже при нормальном самочувствии Вашего ребенка. Это важно для надлежащей эффективности лекарственного препарата и снижения риска возникновения кровотечения.
- Давайте данный препарат в одно и то же время дня.
- Беременным нельзя обращаться с измельченными или разломанными таблетками. Если беременная прикоснется к раздавленной или измельченной таблетке, ей следует немедленно промыть место контакта водой с мылом.

## **Что делать, если мой ребенок пропустит прием дозы лекарственного препарата?**

- Дайте Вашему ребенку пропущенную дозу в тот же день.
- Если прошел день, пропустите пропущенную дозу и вернитесь к

обычному графику приема препарата Вашим ребенком.

- Не давайте более 1 дозы данного препарата в течение одного дня.

## Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

- Хранить при комнатной температуре в защищенном от света месте. Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

## Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## **Использование информации потребителем и ограничение ответственности**

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице

<https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

## **Дата последнего пересмотра**

2023-07-14

## **Авторское право**

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025.  
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

Warfarin - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center