

Инструкции при выписке после лечения лекарством Naxitamab (Danyelza®)

Эта информация поможет вам понять, как ухаживать за собой после иммунотерапии лекарством Naxitamab. В этом материале слово «вы» относится к вам или вашему ребенку.

Вы недавно прошли курс иммунотерапии лекарством Naxitamab по поводу нейробластомы или остеосаркомы. Нейробластома — это рак, который развивается в части периферической нервной системы. Остеосаркома — это разновидность рака костей.

Большинство побочных эффектов после такого лечения обычно проходят через неделю. Есть вероятность, что после выписки из больницы у вас еще будут присутствовать побочные эффекты.

Распространенные побочные эффекты

Боль

Боль является самым распространенным побочным эффектом иммунотерапии лекарством Naxitamab. Обычно она проявляется максимально во время инфузии Naxitamab, но у вас может возникнуть боль и после возвращения домой. Интенсивность боли может меняться в разное время.

Постарайтесь запомнить советы ниже.

- После выписки вы можете испытывать боль. Перед выпиской убедитесь, что у вас есть обезболивающие лекарства, которые мы прописали.
- Не принимайте acetaminophen (Tylenol®) или ibuprofen (Advil® или Motrin®) для облегчения боли, если на это нет наших указаний.
 - Перед приемом этих лекарств всегда измеряйте температуру, т.к они могут скрыть симптомы лихорадки, а любая лихорадка должна контролироваться

вашей лечащей командой.

- Принимайте обезболивающие лекарства только по назначению врача. Если лекарство не помогает или у вас появились побочные эффекты, позвоните нам. Возможные побочные эффекты включают:
 - запоры (когда опорожнение кишечника происходит реже, чем обычно);
 - тошнота (ощущение подступающей рвоты);
 - слабость (чувство сильной усталости);
 - зуд.

Следующую дозу обезболивающего лекарства можно принять в: _____

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для обезболивания.

Аллергические реакции

У вас может возникнуть аллергическая реакция, такая как зудящая сыпь, покраснение или отек. Она может возникнуть в любое время между сеансами лечения paixitab. Мы выпишем вам лекарство от аллергии для приема дома, например hydroxyzine (Vistaril®) или diphenhydramine (Benadryl®).

Что необходимо запомнить:

- Изменения в дыхании или одышка могут быть признаком аллергической реакции. Позвоните по номеру 911 и обратитесь за неотложной помощью, если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего дыхания.
- Мы выпишем вам рецепт для приобретения лекарства от аллергии. Перед выпиской из больницы убедитесь, что у вас есть такое лекарство.

Следующую дозу антигистаминного лекарства можно принять в: _____

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для устранения симптомов аллергии.

Повышенная температура

После лечения у вас может подняться температура. Это может быть связано с лечением или может быть признаком развития инфекции. Убедитесь, что у вас дома есть термометр. Важно позвонить нам и получить указания при появлении следующих симптомов:

- температура от 100,4°F до 100,9°F (от 38 до 38,2 °C), которая держится более 1 часа;
- температура 101 °F (38,3 °C) или выше.

Инфекции центрального венозного катетера

Центральный катетер, или центральный венозный катетер, выполняет функции искусственной вены. Данное устройство облегчит вашей лечащей команде доступ к кровеносным сосудам для введения лекарств и проведения исследований. В центральном катетере могут скапливаться бактерии (микробы), что может привести к развитию инфекции. У вас может подняться температура, появиться покраснение, отек или болезненность в месте установки катетера. Немедленно позвоните нам при появлении у вас какого-либо из следующих симптомов.

Установлен ли у вас центральный катетер, например, Mediport или Broviac™, или периферически вводимый центральный катетер (peripherally inserted central catheter, PICC)? да | нет

Дополнительные указания приведены в разделе комментариев ниже:

Проблемы с посещением туалета

У вас могут быть запоры (проблемы с опорожнением кишечника) или проблемы с мочеиспусканием. Это распространенный побочный эффект многих обезболивающих лекарств. Мы можем назначить лекарства, которые помогут вам при мочеиспускании и опорожнении кишечника.

Вы можете сделать перечисленное ниже.

- Положите на живот ниже пупка теплое полотенце, чтобы облегчить мочеиспускание.
- Пейте достаточно жидкости.
- Соблюдайте наши указания по контролю запоров.

Тошнота и рвота

Вы можете испытывать тошноту и рвоту. Мы можем назначить вам лекарство, которое поможет справиться с этим.

Следующую дозу лекарства от тошноты можно принять в: _____

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для устранения тошноты.

Когда нужно вернуться в клинику

Мы просим вас вернуться в клинику _____ в _____ для:

Когда звонить лечащей команде

Позвоните по номеру 911 и обратитесь за неотложной помощью, если у вас:

- появилась одышка;
- возникли проблемы с дыханием;
- есть какие-либо опасения по поводу дыхания.

Звоните своей лечащей команде, если:

- у вас отекают губы, язык или горло;
- у вас температура от 100,4°F до 100,9°F (от 38 до 38,2 °C), которая держится более 1 часа;
- температура 101°F (38,3°C) или выше;
- у вас бледная кожа, потливость или озноб, это может быть признаком инфекции;
- у вас отсутствует мочеиспускание в течение определенного количества часов (ваша лечащая команда укажет время);
- у вас отсутствует опорожнение кишечника в течение определенного количества дней (ваша лечащая команда укажет время);
- боль, которая не проходит или усиливается после приема обезболивающего лекарства;
- непрекращающаяся тошнота или рвота;
- рвота после употребления какого-либо напитка;
- внезапная головная боль, которая не проходит;
- у вас меняется зрение;
- у вас возник припадок;
- вы замечаете изменения в своем настроении, поведении или уровне внимания;
- у вас непрекращающийся кашель;
- место введения центрального катетера в тело покраснело, опухло или стало болезненным.

Контактная информация

Если у вас появились вопросы, свяжитесь непосредственно с сотрудником вашей лечащей команды. Вы можете связаться с ним с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. Если вы звоните после 18:00, а также в выходные и праздничные дни,

звоните по номеру 212-639-2000 и спросите дежурного специалиста педиатрического отделения.

Если ваш вопрос не требует немедленного ответа, вы можете отправить сообщение своей лечащей команде через MSK MyChart. MSK MyChart — это портал для пациентов центра MSK.

Информация о педиатрическом центре неотложной помощи (Pediatric Urgent Care Center (UCC)) центра MSK

В зависимости от ваших симптомов ваша лечащая команда может рекомендовать вам обратиться в педиатрический UCC центра MSK.

Педиатрический UCC находится на 9-м этаже Memorial Hospital (основной больницы центра MSK). Ближайший вход находится по адресу: 1275 York Avenue (на E. 68 Street). Этот вход открыт круглосуточно. Когда вы войдете в больницу, поднимитесь на лифте М на 9-й этаж и зарегистрируйтесь на стойке регистрации.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Discharge Instructions After Your Naxitamab (Danyelza®) Treatment - Last updated on December 2, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Дата последнего обновления

Декабрь 2, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

Поделитесь своим мнением

Поделитесь своим мнением

Ваш отзыв поможет нам скорректировать образовательные материалы, предоставляемые пациентам. Данные, предоставленные вами в этой форме обратной связи, будут недоступны для сотрудников вашей лечащей команды. Пожалуйста, не используйте эту форму для вопросов о вашем лечении. Если у вас есть вопросы по поводу вашего лечения, обратитесь к своему медицинскому сотруднику.

Хотя мы читаем все отзывы, мы не можем ответить на все вопросы. Мы просим не указывать свое имя или какую-либо персональную информацию в этой форме обратной связи.

Was this information easy to understand?

Yes

Somewhat

No

Что следует объяснить более подробно?

Не вводите свое имя или любую персональную информацию.

Отправить



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center