

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Инструкции при выписке после лечения лекарством Naxitamab (Danyelza®)

Эта информация поможет вам понять, как ухаживать за собой после иммунотерапии лекарством Naxitamab. В этом материале слово «вы» относится к вам или вашему ребенку.

Вы недавно прошли курс иммунотерапии лекарством Naxitamab по поводу нейробластомы или остеосаркомы. Нейробластома — это рак, который развивается в части периферической нервной системы. Остеосаркома — это разновидность рака костей.

Большинство побочных эффектов после такого лечения обычно проходят через неделю. Есть вероятность, что после выписки из больницы у вас еще будут присутствовать побочные эффекты.

Распространенные побочные эффекты

Боль

Боль является самым распространенным побочным эффектом иммунотерапии лекарством Naxitamab. Обычно она проявляется максимально во время инфузии Naxitamab, но у вас может возникнуть боль и после возвращения домой. Интенсивность боли может меняться в разное время.

Постарайтесь запомнить советы ниже.

- После выписки вы можете испытывать боль. Перед выпиской

убедитесь, что у вас есть обезболивающие лекарства, которые мы прописали.

- Не принимайте acetaminophen (Tylenol®) или ibuprofen (Advil® или Motrin®) для облегчения боли, если на это нет наших указаний.
 - Перед приемом этих лекарств всегда измеряйте температуру, т.к они могут скрыть симптомы лихорадки, а любая лихорадка должна контролироваться вашей лечащей командой.
- Принимайте обезболивающие лекарства только по назначению врача. Если лекарство не помогает или у вас появились побочные эффекты, позвоните нам. Возможные побочные эффекты включают:
 - запоры (когда опорожнение кишечника происходит реже, чем обычно);
 - тошнота (ощущение подступающей рвоты);
 - слабость (чувство сильной усталости);
 - зуд.

Следующую дозу обезболивающего лекарства можно принять в:

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для обезболивания.

Аллергические реакции

У вас может возникнуть аллергическая реакция, такая как зудящая сыпь, покраснение или отек. Она может возникнуть в любое время между сеансами лечения paixitamab. Мы выпишем вам лекарство от аллергии для приема дома, например hydroxyzine (Vistaril®) или diphenhydramine (Benadryl®).

Что необходимо запомнить:

- Изменения в дыхании или одышка могут быть признаком аллергической реакции. Позвоните по номеру 911 и обратитесь за неотложной помощью, если у вас есть какие-либо опасения по поводу вашего дыхания.
- Мы выпишем вам рецепт для приобретения лекарства от аллергии. Перед выпиской из больницы убедитесь, что у вас есть такое лекарство.

Следующую дозу антигистаминного лекарства можно принять в:

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для устранения симптомов аллергии.

Повышенная температура

После лечения у вас может подняться температура. Это может быть связано с лечением или может быть признаком развития инфекции. Убедитесь, что у вас дома есть термометр. Важно позвонить нам и получить указания при появлении следующих симптомов:

- температура от 100,4°F до 100,9°F (от 38 до 38,2 °C), которая держится более 1 часа;
- температура 101 °F (38,3 °C) или выше.

Инфекции центрального венозного катетера

Центральный катетер, или центральный венозный катетер, выполняет функции искусственной вены. Данное устройство облегчит вашей лечащей команде доступ к кровеносным сосудам для введения лекарств и проведения исследований. В центральном катетере могут скапливаться

бактерии (микробы), что может привести к развитию инфекции. У вас может подняться температура, появиться покраснение, отек или болезненность в месте установки катетера. Немедленно позвоните нам при появлении у вас какого-либо из следующих симптомов.

Установлен ли у вас центральный катетер, например, Mediport или Broviac™, или периферически вводимый центральный катетер (peripherally inserted central catheter, PICC)? да | нет

Дополнительные указания приведены в разделе комментариев ниже:

Проблемы с посещением туалета

У вас могут быть запоры (проблемы с опорожнением кишечника) или проблемы с мочеиспусканием. Это распространенный побочный эффект многих обезболивающих лекарств. Мы можем назначить лекарства, которые помогут вам при мочеиспускании и опорожнении кишечника.

Вы можете сделать перечисленное ниже.

- Положите на живот ниже пупка теплое полотенце, чтобы облегчить мочеиспускание.
- Пейте достаточно жидкости.
- Соблюдайте наши указания по контролю запоров.

Тошнота и рвота

Вы можете испытывать тошноту и рвоту. Мы можем назначить вам лекарство, которое поможет справиться с этим.

Следующую дозу лекарства от тошноты можно принять в: _____

Название лекарства: _____

Доза лекарства: _____ каждые _____ часа(-ов) по мере необходимости для устранения тошноты.

Когда нужно вернуться в клинику

Мы просим вас вернуться в клинику _____ в _____ для:

Когда звонить лечащей команде

Позвоните по номеру 911 и обратитесь за неотложной помощью, если у вас:

- появилась одышка;
- возникли проблемы с дыханием;
- есть какие-либо опасения по поводу дыхания.

Звоните своей лечащей команде, если:

- у вас отекают губы, язык или горло;
- у вас температура от 100,4°F до 100,9°F (от 38 до 38,2 °C), которая держится более 1 часа;
- температура 101°F (38,3°C) или выше;
- у вас бледная кожа, потливость или озноб, это может быть признаком

инфекции;

- у вас отсутствует мочеиспускание в течение определенного количества часов (ваша лечащая команда укажет время);
- у вас отсутствует опорожнение кишечника в течение определенного количества дней (ваша лечащая команда укажет время);
- боль, которая не проходит или усиливается после приема обезболивающего лекарства;
- непрекращающаяся тошнота или рвота;
- рвота после употребления какого-либо напитка;
- внезапная головная боль, которая не проходит;
- у вас меняется зрение;
- у вас возник припадок;
- вы замечаете изменения в своем настроении, поведении или уровне внимания;
- у вас непрекращающийся кашель;
- место введения центрального катетера в тело покраснело, опухло или стало болезненным.

Контактная информация

Если у вас появились вопросы, свяжитесь непосредственно с сотрудником вашей лечащей команды. Вы можете связаться с ним с понедельника по пятницу с 08:00 до 18:00. Если вы звоните после 18:00, а также в выходные и праздничные дни, звоните по номеру 212-639-2000 и спросите дежурного специалиста педиатрического отделения.

Если ваш вопрос не требует немедленного ответа, вы можете отправить сообщение своей лечащей команде через MSK MyChart. MSK MyChart — это портал для пациентов центра MSK.

Информация о педиатрическом центре неотложной помощи (Pediatric Urgent Care Center (UCC)) центра

MSK

В зависимости от ваших симптомов ваша лечащая команда может рекомендовать вам обратиться в педиатрический UCC центра MSK.

Педиатрический UCC находится на 9-м этаже Memorial Hospital (основной больницы центра MSK). Ближайший вход находится по адресу: 1275 York Avenue (на E. 68 Street). Этот вход открыт круглосуточно. Когда вы войдете в больницу, поднимитесь на лифте М на 9-й этаж и зарегистрируйтесь на стойке регистрации.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Discharge Instructions After Your Naxitamab (Danyelza®) Treatment - Last updated on December 2, 2025

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center