

# Порядок реагирования в экстренных случаях при лечении биспецифическими антителами

	<b>Опасные экстренные ситуации: позвоните 911</b>	<b>Ситуации, не являющиеся экстренными: позвоните своему врачу по лечению</b>	
<b>Ситуации, требующие повышенного внимания</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Пациент не просыпается</li><li>Пациент внезапно не может двигать руками или ногами</li><li>Судороги (неконтролируемая дрожь или скованность тела)</li><li>Внезапное изменение зрения</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Головокружение или предобмороочное состояние</li><li>Тремор или дрожь</li><li>Перепады настроения</li><li>Изменение степени энергичности</li><li>Появление или усугубление симптомов спутанности сознания</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Сложности с подбором слов</li><li>Изменение уровня внимания</li><li>Онемение или покалывание</li><li>Невозможность передвигаться</li><li>Проблемы с глотанием</li></ul>
<b>Дыхание</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Отсутствие дыхания</li><li>Проблемы с дыханием</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Свистящее дыхание (свист или хрипы при дыхании)</li><li>Одышка при незначительной физической активности</li><li>Появившийся кашель или кашель, который не проходит</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Кашель с кровью, зеленой или желтой слизью (желеобразное вещество)</li><li>Проблемы с дыханием в положении лежа</li></ul>
<b>Лихорадка/ озноб или инфекция</b>		<ul style="list-style-type: none"><li>Температура 100,4 °F (38 °C) или выше при измерении температуры через рот</li><li>Потрясающий озноб (температура может быть нормальной)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Симптомы простуды (насморк, слезотечение, чихание, кашель)</li><li>Боль или жжение при мочеиспускании</li></ul>



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center