



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Рекомендации по введению пневмококковой вакцины страдающим раком взрослым

Эта информация разъясняет, что такое пневмококковая вакцина и когда ее необходимо вводить.

Пневмококковая вакцина помогает предотвратить инфицирование пневмококковыми бактериями. Эти бактерии могут вызывать пневмонию (инфекцию легких), менингит (воспаление оболочек вокруг головного мозга) и другие тяжелые заболевания, способные привести к смерти.

Существует 2 типа пневмококковой вакцины: Pnevnar 13[®] и Pnevnoax[®]23. Оба типа вакцины защищают от бактерий нескольких штаммов. Они вводятся в виде инъекции (укола) в мышцу.

График вакцинации

Если вам никогда не вводили пневмококковую вакцину и вы старше 18 лет, рекомендуем вам поставить:

- Pnevnar 13 во время следующего приема у медицинского сотрудника;
- Pnevnoax 23 не раньше чем через 8 недель после Pnevnar 13.

Если вам уже вводили Pnevnoax 23, подождите 1 год, прежде чем вводить Pnevnar 13.

Поговорите со своим медицинским сотрудником, если у вас возникли

какие-либо вопросы о пневмококковых вакцинах.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on September 28, 2021

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center