



Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

# Рекомендации по введению пневмококковой вакцины страдающим раком взрослым

Эта информация разъясняет, что такое пневмококковая вакцина и когда ее необходимо вводить.

Пневмококковая вакцина помогает предотвратить инфицирование пневмококковыми бактериями. Эти бактерии могут вызывать пневмонию (инфекцию легких), менингит (воспаление оболочек вокруг головного мозга) и другие тяжелые заболевания, способные привести к смерти.

Существует 2 типа пневмококковой вакцины: Pnevnar 13<sup>®</sup> и Pnevnoax<sup>®</sup> 23. Оба типа вакцины защищают от бактерий нескольких штаммов. Они вводятся в виде инъекции в мышцу.

## График вакцинации

Если вам никогда не вводили пневмококковую вакцину и вы старше 18 лет, рекомендуем вам поставить:

- Pnevnaр 13 во время следующего приема у врача;
- Pневмовах 23 не раньше чем через 8 недель после Pnevnaр 13.

Если вам уже вводили Pневмовах 23, подождите 1 год, прежде чем вводить Pnevnaр 13.

Обратитесь к своему врачу при наличии вопросов о пневмококковой вакцине.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Pneumococcal Vaccination Guidelines for Adults with Cancer - Last updated on August 29, 2020

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center