

Памятка пациенту и лицу, ухаживающему за ним

## Salicylic Acid

Этот документ, предоставленный Lexicomp<sup>®</sup>, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Фирменные знаки США

Bensal HP; Betasal [OTC]; CeraVe Psoriasis [OTC] [DSC]; Clear Away 1-Step Wart Remover [OTC]; Corn Remover One Step [OTC]; Corn Remover Ultra Thin [OTC] [DSC]; Exuviance Blemish Treatment [OTC] [DSC]; Gordofilm; Ionil [OTC]; Keralyt; Keralyt 5 [OTC] [DSC]; Keralyt Scalp; Keralyt [OTC]; Mediplast [OTC]; Neutrogena Oil-Free Acne Wash [OTC]; One Step Callus Remover [OTC] [DSC]; P & S [OTC]; Psoriasin [OTC]; Sal-Plant [OTC]; SalAc [OTC]; Salactic Film [OTC] [DSC]; Salacyn [DSC]; Salex; Salicylic Acid Wart Remover; Salimez; Salimez Forte; Salisol Forte [DSC]; Salisol [DSC]; Salitech Forte [DSC]; Salitech [DSC]; Salvax; Scalpicin 2 in 1 [OTC] [DSC]; Sebasorb [OTC] [DSC]; Stri-Dex Maximum Strength [OTC] [DSC]; Stri-Dex Sensitive Skin [OTC] [DSC]; Stridex Essential [OTC] [DSC]; UltraSal-ER; Virasal; Xalix

## Для чего применяют этот препарат?

- Применяется для лечения угрей.
- Этот препарат применяют для удаления костных мозолей, мозолей и бородавок.
- Применяется для лечения псориаза.
- Этот препарат применяют для лечения себорейного дерматита.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный препарат?

### **Для всех целей применения данного препарата:**

- Если у вашего ребенка аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу об аллергии и о том, как она проявлялась у ребенка.

### **При мозолях, натоптышах и бородавках:**

- Если у Вашего ребенка имеются любые из перечисленных проблем со здоровьем: повышенный уровень сахара в крови (диабет) или недостаточное кровообращение.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут

неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при заболеваниях вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые он уже принимает. Не следует начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Будьте осторожны при нанесении на большие участки кожи. Проконсультируйтесь с врачом.
- Не наносите данный лекарственный препарат на

родимые пятна, родинки или покрытые волосами бородавки, а также на цервикальные кондиломы, кондиломы в области половых органов и в полости рта.

- Нельзя наносить на открытые раны, порезы или раздраженную кожу.
- Слишком частое применение данного препарата Вашим ребенком может привести к усугублению нарушения со стороны кожи.
- Применение других продуктов для кожи одновременно с этим препаратом может увеличить раздражение.
- Перед нанесением на кожу ребенка других препаратов или продуктов проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего ребенка.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Врачу и лаборантам необходимо сообщить о том, что Ваш ребенок применяет данный лекарственный препарат.
- Некоторые из этих препаратов способны к возгоранию. Не применяйте вблизи открытого огня или во время курения.
- В случае проглатывания данного препарата он может быть вреден. При случайном проглатывании этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

- Не давайте препарат детям и подросткам, у которых присутствуют симптомы или которые находятся в процессе выздоровления при гриппе, ветряной оспе или других вирусных инфекциях из-за риска развития синдрома Рейе. Синдром Рейе приводит к очень тяжелым нарушениям со стороны головного мозга и печени.
- Некоторые препараты против акне, содержащие пероксид бензоила или салициловую кислоту, в редких случаях могут вызывать очень тяжелые и иногда угрожающие жизни аллергические реакции или очень сильное раздражение. Перед первым применением Вам может понадобиться выполнить определенные действия, чтобы убедиться в том, что у Вашего ребенка нет аллергии. Наносите данный препарат в соответствии с инструкциями врача или прочитайте листок-вкладыш. Проконсультируйтесь с врачом.
- У детей применяйте с осторожностью. Проконсультируйтесь с врачом.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

**Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка**

## **грудью:**

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Перемены настроения.

- Учащенное дыхание.
- Тошнота или рвота.
- Звон в ушах, потеря слуха или какие-либо другие изменения слуха.
- Головокружение.
- Чувство крайней усталости или слабости.
- Диарея.

Каковы некоторые побочные эффекты данного препарата?

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

- Кожное раздражение.
- Сухая кожа.
- Ожог.
- Чувство жжения.
- Отслаивание.

Данный список возможных побочных эффектов не является

исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

**Как принимать это лекарство наилучшим образом?**

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

**Для всех целей применения данного препарата:**

- Не для приема внутрь. Только для детской кожи. Следует избегать попадания в рот, нос и глаза Вашего ребенка (возможен ожог).
- Убедитесь, что Ваш ребенок не вдыхает пары.
- При попадании данного лекарственного препарата в глаза промойте глаза холодной водой.
- Мойте руки до и после применения.
- Перед применением промойте пораженный участок. Убедитесь, что кожа хорошо высохла.

**Пена:**



- Подготовьте распылитель перед первым применением.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.
- Нанесите пену на пораженный участок и осторожно вотрите.

### **При угревой сыпи (акне):**

#### **Крем, гель, раствор или лосьон:**

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок, вспеньте и сполосните.
- Некоторые из данных лекарственных препаратов необходимо взбалтывать перед применением. Убедитесь, что Вы точно знаете, нужно ли взбалтывать данный лекарственный препарат перед применением.

#### **Грелка:**

- Пользуйтесь тампоном для нанесения тонкого слоя салициловой кислоты на пораженный участок.
- Не оставляйте подушечку на коже.

#### **При мозолях, натоптышах и бородавках:**

- Можно намочить пораженный участок в течение 5 минут.

- По рекомендации врача можно накрыть тонкой повязкой.

### **Гель и жидкость:**

- Нанесите на пораженную кожу и дайте высохнуть.

### **Крем, лосьон:**

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.

### **При псориазе и себорейном дерматите:**

#### **Крем, гель, жидкость, лосьон и мазь:**

- Нанесите тонкий слой на пораженный участок и слегка вотрите.
- Если препарат предназначен для нанесения на волосистую часть головы, следуйте инструкциям, которые вы получили от врача или прочитали на упаковке.

#### **Шампунь:**

- Иногда этот препарат наносят на влажные волосы. Иногда его нужно наносить на сухие волосы. Убедитесь, что вы точно знаете, как применять данный препарат. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом или

фармацевтом.

- Повторить лечение в соответствии с указаниями врача.

### **Шампунь с набором гелей:**

- Если вы применяете шампунь для лечения кожи головы, **не** мочите волосы. Используйте аппликатор для нанесения на пораженные области. Оставьте в соответствии с указаниями. Тщательно промойте водой. Если хотите, можете вымыть волосы не лечебным, а обычным шампунем.
- Для применения геля на коже головы, нанесите с помощью аппликатора на поврежденные области. Оставьте в соответствии с указаниями. Вымойте теплой водой или с помощью лечебного шампуня.
- При применении геля на коже, используйте во время сна. Перед применением этого препарата пропитайте область в течение, как минимум, 5 минут. Нанесите тонкий слой и осторожно втирайте. Закутайте, как указано. Вымойте утром.

**Что мне необходимо делать, если мой ребенок пропустил прием препарата?**

- Примите пропущенную дозу, как только сможете.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и

затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.

- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительные дозы.

Как мне хранить и/или распорядиться этим лекарством?

### **Все формы выпуска:**

- Храните при комнатной температуре. Не замораживайте.
- Предохраняйте от воздействия тепла или открытого пламени.
- Крышка должна быть плотно закрыта.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

### **Пена:**

- Храните в вертикальном положении с закрытым колпачком.
- Не протыкать.

## Общее утверждение

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## Использование информации потребителей и заявление об ограничении ответственности

Эту информацию не следует использовать для принятия

решения о приеме этого или любого другого препарата. Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты подходят для конкретного пациента. Данная информация не является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены лишь краткие сведения общего характера об этом препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о возможном использовании препарата с инструкциями по применению, предупреждениями, мерами предосторожности, сведениями о взаимодействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть связаны с данным препаратом. Эта информация не должна рассматриваться в качестве руководства по лечению и не заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к лечащему врачу.

## Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2020. Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Salicylic Acid - Last updated on October 18, 2020

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center