



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА НИМИ ЛИЦ

Как избежать обезвоживания после приема умеренной или высокой дозы лекарства cisplatin

Эта информация поможет вам избежать обезвоживания после химиотерапии с использованием cisplatin в высоких дозах.

Cisplatin может повлиять на почки. Чтобы не нанести вреда почкам, после прохождения сеанса химиотерапии с использованием cisplatin вам будет необходимо пить много жидкости. Особенно важно, чтобы вы выпивали достаточное количество жидкости в первые 2 дня после химиотерапии.

Сколько нужно выпить

День проведения химиотерапии

Начиная сразу же по окончании сеанса химиотерапии и до 8:00 следующего дня, выпейте не меньше 4 стаканов (объемом 8 унций (240 мл)) жидкости.

Следующий день после химиотерапии

Выпивайте по 8–12 стаканов (объемом 8 унций (240 мл)) жидкости в день в течение 1 недели после лечения.

Принимайте лекарства от тошноты в соответствии с рекомендациями вашего врача.



Помните, что особенно важно выпивать достаточное количество жидкости в первые 2 дня после сеанса химиотерапии с использованием cisplatin.

Что нужно пить

- Вы должны пить различные жидкости, не содержащие кофеин, например:
 - Вода
 - Молоко
 - Соки
 - Спортивный напиток Gatorade®
 - Вода Propel®
 - Безалкогольные (газированные) напитки без кофеина (например газированный напиток из сока лимона и лайма, имбирный эль или кока-колу без кофеина).
- Не употребляйте напитки, содержащие кофеин или алкоголь. В день можно выпить 1 чашку (8 унций или 240 мл) чая или кофе с кофеином.
- Добавляйте воду в сладкие напитки, например соки (разбавляя их, к примеру, пополам), чтобы снизить количество сахара. Чрезмерное употребление сахара может вызвать диарею (жидкий или водянистый стул).
- Если у вас диабет или имеются проблемы с уровнем сахара в крови, выбирайте напитки без сахара.

Записывайте все, что вы пьете

Чтобы отслеживать количество выпитого, используйте приведенную ниже таблицу. Следуйте ее рекомендациям в первые 2 дня после лечения, но также важно, чтобы вы продолжали ежедневно получать достаточное количество жидкости.



Call your doctor or nurse if you:

- у вас появились признаки проблем с почками, например:
 - невозможность помочиться;
 - более редкое, чем обычно, мочеиспускание;
 - кровь в моче;
 - резкая прибавка в весе
- у вас появились признаки задержки жидкости в организме, например отечность ног или ступней или одышка;
- у вас возникла тошнота (ощущение приближающейся рвоты), рвота или диарея (жидкий, водянистый стул);
- головокружение;
- вы не в состоянии есть или пить в течение более 24 часов после приема cisplatin в высоких дозах;
- у вас температура 100,4° F (38° C) и выше;
- у вас появилась изжога (жгучая боль в груди);
- возникли какие-либо вопросы или опасения.

Если у вас есть вопросы или опасения, позвоните своему медицинскому сотруднику. Специалист вашей лечащей команды ответит на звонок с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 В другое время вы можете оставить сообщение или поговорить с другим врачом центра MSK. Вы всегда можете связаться с дежурным врачом или медсестрой/медбратом. Если вы не знаете, как связаться со своим медицинским сотрудником, позвоните по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Staying Hydrated After Moderate to High-Dose Cisplatin - Last updated on May 28, 2026
Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center