



ОБРАЗОВАНИЕ ПАЦИЕНТОВ И КОРНЯКОВ

## Vitamins (Multiple/Pediatric)

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

### Фирменные знаки США

ABDEK [OTC]; ADEKs [OTC]; Animal Parade [OTC]; AquADEKs [OTC]; Centrum Kids [OTC]; Flintstones Complete [OTC]; Flintstones Gummies [OTC]; Flintstones Plus Bone Building Support Gummies [OTC]; Flintstones Plus Bone Building Support [OTC]; Flintstones Plus Immunity Support Gummies [OTC]; Flintstones Plus Immunity Support [OTC]; Flintstones Plus Iron [OTC]; Flintstones Sour Gummies [OTC]; Floriva; Floriva Plus; My First Flintstones [OTC]; MyKidz Iron FL [DSC]; MyKidz Iron [OTC] [DSC]; NovaMV [OTC]; One A Day Kids Jolly Rancher Gummies [OTC]; One A Day Kids Jolly Rancher Sour Gummies [OTC]; One A Day Kids Scooby-Doo! Complete [OTC]; One A Day Kids Scooby-Doo! Gummies [OTC]; Poly-Vi-Flor FS; Poly-Vi-Sol With Iron [OTC]; Poly-Vi-Sol [OTC]; Quflora; Quflora FE Pediatric; Tri-Vi-Sol [OTC]; Vitalets [OTC]

## Предупреждение

### **Если продукт содержит железо:**

- Случайная передозировка содержащих железо препаратов является одной из наиболее частых причин отравления с летальным исходом у детей в возрасте до 6 лет. Хранить в месте, недоступном для детей. При случайном приеме этого препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.

Для чего применяют этот препарат?

### **Все формы выпуска:**

- Применяется для улучшения роста и развития.

### **Продукты, содержащие фторид:**

- Фтор может содержаться в витаминах, предназначенных для профилактики кариеса.

Что необходимо сообщить врачу, ПРЕЖДЕ ЧЕМ мой ребенок примет данный препарат?

### **Все формы выпуска:**

- Если у Вашего ребенка аллергия на этот препарат или какой-либо иной компонент данного препарата.
- Если у вашего ребенка аллергия на аналогичные препараты или любые другие лекарственные препараты, пищевые продукты или другие вещества. Сообщите врачу о наличии у вашего ребенка аллергии

и ее симптомах, таких как сыпь, крапивница, зуд, одышка, свистящее дыхание, кашель, отек лица, губ, языка или горла или о любых других симптомах.

### **Продукты, содержащие фторид:**

- Если у ребенка имеются любые из перечисленных ниже проблем со здоровьем: проблемы с костями, суставами, проблемы с почками или язвы.
- содержит ли Ваша питьевая вода достаточное количество фторида для Вашего ребенка. В случае сомнений проконсультируйтесь с врачом.

### **Если продукт содержит железо:**

- Если у ребенка в организме слишком много железа.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом относительно всех лекарственных препаратов, которые принимает Ваш ребенок (как рецептурных, так и приобретаемых без рецепта, натуральных препаратах и витаминах), а также о проблемах с его здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного лекарственного препарата безопасен при заболеваниях Вашего ребенка и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые ребенок уже принимает. Не следует

начинать, прекращать прием или изменять дозировку какого-либо лекарственного препарата, который принимает Ваш ребенок, без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока мой ребенок принимает данный препарат?

### **Все формы выпуска:**

- Сообщите всем медицинским работникам, обеспечивающим медицинское обслуживание Вашего ребенка, о том, что Ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи Вашего ребенка.
- Этот лекарственный препарат может влиять на результаты некоторых лабораторных анализов. Сообщите всем медицинским работникам и сотрудникам лабораторий, обеспечивающим медицинское обслуживание вашего ребенка, о том, что ваш ребенок принимает этот лекарственный препарат.
- Доза вашего ребенка может зависеть от его возраста. В случае сомнений относительно дозы препарата, которую следует дать ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

### **Если Ваша дочь беременна или кормит ребенка грудью:**

- Проконсультируйтесь с врачом, если ваша дочь беременна, забеременела или кормит ребенка грудью.

Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вашей дочери и ее ребенка.

### **Жевательные таблетки:**

- Разные торговые марки данного лекарственного препарата могут быть не предназначены для применения у детей младше 4 лет. Возможен повышенный риск поперхнуться. В случае сомнений относительно того, подходит ли данный препарат для применения у Вашего ребенка, проконсультируйтесь с врачом.

### **Продукты, содержащие фторид:**

- Если у ребенка окрасились зубы или на них появились пятна, обратитесь к стоматологу.
- Ухаживайте за зубами ребенка. Регулярно посещайте зубного врача.
- При проглатывании большого количества данный лекарственный препарат может оказывать вредное воздействие. При проглатывании большого количества данного лекарственного препарата немедленно вызовите врача или обратитесь в токсикологический центр.
- Различные торговые марки этого препарата могут быть предназначены для использования у детей разных возрастов. Прежде чем давать данный препарат ребенку, проконсультируйтесь с врачом.

- Не давайте ребенку продукты, содержащие кальций, такие как молочные продукты, в течение 2 после приема данного лекарственного препарата.
- Не давайте продукты, содержащие алюминий или магний, такие как некоторые виды антацидов, в течение 2 часов после приема данного препарата.
- В очищенной воде может не содержаться фтора.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу моего ребенка?

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ/ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** Хотя и в редких случаях, но у некоторых пациентов прием данного лекарственного препарата может вызывать очень серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если у Вашего ребенка имеется любой из перечисленных ниже признаков или симптомов, которые могут быть связаны с очень тяжелым побочным эффектом:

### **Все формы выпуска:**

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и опухшая кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в

области рта, лица, губ, языка или горла.

### **Продукты, содержащие фторид:**

- Изменение внешнего вида зубов и десен.

### **Если продукт содержит железо:**

- Черный, смолистый стул или стул с кровью.
- Высокая температура.
- Сильная тошнота или рвота.
- Сильная боль в животе.
- Рвота кровью или рвотными массами в виде кофейной гущи.
- Желудочные колики.

### **Каковы некоторые побочные эффекты данного препарата?**

Любой лекарственный препарат может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют.

Свяжитесь с врачом Вашего ребенка или обратитесь за медицинской помощью, если любой из этих или других побочных эффектов беспокоит Вашего ребенка, или если он не проходит:

### **Все формы выпуска:**

- Тошнота или рвота.

## **Если продукт содержит железо:**

- Запор.
- Изменение цвета стула на зеленый.
- Диарея.
- Боли в животе.

## **Жидкие продукты, содержащие железо:**

- При приеме данного препарата зубы ребенка могут немного потемнеть. Чистка зубов зубной щеткой поможет отбелить зубы.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у Вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, обратитесь к врачу Вашего ребенка. Проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

## **Как принимать это лекарство наилучшим образом?**

Давайте данный препарат Вашему ребенку в соответствии с предписаниями врача. Прочитайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

## **Все формы выпуска:**



- Давайте данный препарат с пищей или без нее. Если препарат вызывает расстройство желудка, давайте его с пищей.
- Некоторые лекарственные препараты нужно принимать с пищей, а некоторые — натощак. Бывают лекарственные препараты, которые принимаются независимо от приема пищи. Спросите фармацевта, как применять ребенку данный лекарственный препарат.

### **Жидкость (капли):**

- Необходимо следовать указаниям детского лечащего врача или прочесть вкладыш в упаковке.
- Аккуратно отмеряйте дозы жидкости. Используйте мерную емкость, которая входит в комплект с лекарством.
- Хорошо взболтайте перед применением.
- Некоторые препараты можно смешать с детской смесью, фруктовым соком или другим продуктом питания или жидкостью. Некоторые препараты может потребоваться положить прямо в рот ребенку. Убедитесь, что Вы точно знаете, как давать данный препарат ребенку.

### **Жевательные таблетки:**

- Следите за тем, чтобы ребенок тщательно разжевал препарат, прежде чем проглотить. Препараты

некоторых торговых марок можно глотать целиком или после растворения во рту. Если у вас есть вопросы, проконсультируйтесь с фармацевтом.

### **Порошок:**

- Переверните вверх дном несколько раз, чтобы взболтать препарат перед применением.
- Смешайте порошок с влажной пищей или густой жидкостью в соответствии с указаниями.
- Проследите, чтобы ребенок проглотил смесь сразу. Не храните для дальнейшего использования.

### **Жевательные пластинки.**

- Ребенок должен положить пероральную полоску на язык и подождать, пока она растворится.

**Что мне необходимо делать, если мой ребенок пропустил прием препарата?**

- Дайте пропущенную дозу как можно скорее.
- Если Вашему ребенку пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата ребенком.
- Не применяйте одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

**Как мне хранить и/или распорядиться этим**

лекарством?

### **Все формы выпуска:**

- Хранить в оригинальной упаковке при комнатной температуре.
- Хранить в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Не подвергайте воздействию тепла и света.
- Крышка должна быть плотно закрыта.
- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

### **Все жидкие препараты:**

- Не замораживайте.

### **Порошок:**

- После вскрытия упаковки выбросьте все неиспользованные порции по истечении 60 дней.

## Общее утверждение

- Если симптомы или нарушения состояния здоровья Вашего ребенка не уменьшаются, или отмечается ухудшение, обратитесь к врачу Вашего ребенка.
- Не делитесь лекарством вашего ребенка с другими и не давайте чье-либо лекарство вашему ребенку.
- Всегда имейте при себе список всех принимаемых Вашим ребенком препаратов (отпускаемых по рецепту, натуральных средств, витаминов и лекарств, продающихся без рецепта). Этот список необходимо показать лечащему врачу ребенка.
- Проконсультируйтесь с лечащим врачом Вашего ребенка перед тем, как давать ему любой новый лекарственный препарат, включая препараты, отпускаемые по рецепту и без рецепта, натуральные препараты или витамины.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом Вашего ребенка, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за

медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

## Использование информации потребителей и заявление об ограничении ответственности

Эту информацию не следует использовать для принятия решения о приеме этого или любого другого препарата. Только лечащий врач обладает необходимыми знаниями и опытом, чтобы принимать решения о том, какие препараты подходят для конкретного пациента. Данная информация не является гарантией того, что препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения каких-либо заболеваний или конкретных пациентов. Здесь приведены лишь краткие сведения общего характера об этом препарате. Здесь НЕ приводится вся имеющаяся информация о возможном использовании препарата с инструкциями по применению, предупреждениями, мерами предосторожности, сведениями о взаимодействии, нежелательных эффектах и рисках, которые могут быть связаны с данным препаратом. Эта информация не должна рассматриваться в качестве руководства по лечению и не заменяет собой информацию, предоставляемую вам лечащим врачом. Для получения полной информации о возможных рисках и преимуществах приема этого препарата обратитесь к лечащему врачу.

**Авторское право**

© Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2019. Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы, обратитесь непосредственно к сотруднику своей медицинской бригады. Пациенты MSK могут обратиться к поставщику услуг после 17:00 либо в выходной или праздничный день, позвонив по номеру 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe).

---

Vitamins (Multiple/Pediatric) - Generated on July 20, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center