



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И УХАЖИВАЮЩИХ ЗА
НИМИ ЛИЦ

Baclofen

Этот документ, предоставленный Lexicomp®, содержит всю необходимую информацию о препарате, включая показания, способ применения, побочные эффекты и случаи, при которых необходимо связаться с вашим поставщиком медицинских услуг.

Торговые наименования: США

Baclofen Refill Kit-SynchroMed; Fleqsuvy; Gablofen; Lioresal; Lyvispah [DSC]; Ozobax DS; Ozobax [DSC]

Торговые наименования: Канада

APO-Baclofen; Baclofen-10; Baclofen-20; JAMP-Baclofen; Lioresal Intrathecal [DSC]; MYLAN-Baclofen; PMS-Baclofen; RIVA-Baclofen

Предупреждение

Инфузия:

- При резком прекращении приема данного препарата возникали опасные побочные эффекты. Среди таких побочных эффектов были высокая температура, изменения психического состояния, учащение судорог и ригидность мышц. В редких случаях такие побочные эффекты приводили к очень тяжелым нарушениям в работе мышц, органов и становились причиной летального исхода. Не прекращайте прием данного препарата резко, не проконсультировавшись с врачом. Обязательно своевременно пополняйте вашу помпу и ознакомьтесь с ее тревожными сигналами и порядком действий при срабатывании таких сигналов. Сообщите врачу, если у вас когда-либо отмечались признаки синдрома отмены на фоне приема баклофена в таблетках или инъекциях. При возникновении признаков синдрома отмены немедленно свяжитесь с врачом.
- Подробная информация приведена на вкладыше в упаковке.

Для чего используется этот лекарственный препарат?

- Применяется для лечения спазмов при рассеянном склерозе или заболеваниях спинного мозга.
- Данный лекарственный препарат можно применять и по другим показаниям. Проконсультируйтесь с врачом.

Что необходимо сообщить врачу ПЕРЕД приемом данного препарата?

Все формы выпуска:

- Если у вас аллергия на данный препарат, любые его составляющие, другие препараты, продукты питания или вещества. Сообщите врачу о вашей аллергии и о том, как она проявлялась.

Инфузия:

- В случае инфекции.

Данный список лекарств и заболеваний, которые могут неблагоприятно сочетаться с приемом данного препарата, не является исчерпывающим.

Расскажите своему врачу и фармацевту о всех лекарственных препаратах, которые вы принимаете (как рецептурных, так и безрецептурных, натуральных препаратах и витаминах), а также о своих проблемах со здоровьем. Вам необходимо удостовериться, что прием данного препарата безопасен при ваших заболеваниях и в сочетании с другими лекарственными препаратами, которые вы уже принимаете. Не начинайте и не прекращайте прием какого-либо лекарственного препарата, а также не меняйте дозировку без согласования с врачом.

Что мне необходимо знать или делать, пока я принимаю данный препарат?

- Сообщите всем обслуживающим Вас медицинским работникам о том, что Вы принимаете этот препарат. Это врачи, медсестры, фармацевты и стоматологи.
- Избегайте вождения транспортных средств, а также прочих занятий, требующих повышенного внимания, пока вы не увидите, как на вас влияет данный препарат.
- Проконсультируйтесь со своим врачом перед употреблением алкоголя, марихуаны или других форм каннабиса, а также рецептурных и безрецептурных лекарственных препаратов, которые могут замедлить ваши действия.
- Нельзя резко прекращать прием данного препарата. Это может увеличить риск побочных действий. К ним могут относиться галлюцинации (состояние, когда кажется, что видишь или слышишь то, чего нет), судороги, высокая температура, скованность мышц и спутанность сознания. В редких случаях это могло привести к нарушению функционирования органов и даже к смерти. В случае

необходимости прием данного препарата нужно прекращать постепенно, в соответствии с предписаниями Вашего врача. Сообщите врачу, если у Вас возникнут новые симптомы или ухудшатся имеющиеся.

- Если пациент — ребенок, используйте этот препарат с осторожностью. У детей риск возникновения некоторых побочных эффектов может быть более высоким.
- Сообщите врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Необходимо будет обсудить преимущества и риски для вас и вашего ребенка.
- Применение этого препарата во время беременности может привести к развитию синдрома отмены у новорожденного.

Инъекция:

- Если препарат перестал вам помогать, сообщите об этом своему врачу. Не принимайте препарат в более высоких дозах, чем прописал врач.

О каких побочных эффектах мне следует немедленно сообщать лечащему врачу?

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. В редких случаях у некоторых пациентов прием данного препарата может повлечь серьезные, а иногда и смертельно опасные побочные эффекты. Немедленно свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если у вас присутствуют следующие признаки или симптомы, которые могут быть связаны с серьезными побочными эффектами:

- Признаки аллергической реакции, такие как сыпь, крапивница, зуд, покрасневшая и отечная кожа с волдырями или шелушением, возможно в сочетании с лихорадкой, свистящее или хрипящее дыхание, стеснение в груди или горле, затрудненное дыхание, глотание или речь, необычная хриплость, отечность в области рта, лица, губ, языка или горла.
- Сильное головокружение или обморок.

- Спутанность сознания.
- Появление или усугубление психических расстройств, перепадов настроения или изменений поведения.
- Галлюцинации (человек видит или слышит то, чего нет в действительности).
- Судороги.
- Изменение баланса.
- Изменение зрения.
- Боль в груди.
- Мышечная боль или слабость.
- Ригидность мышц.
- Необычные ощущения жжения, онемения или покалывания.
- Затрудненное, медленное или поверхностное дыхание.
- Затруднение при мочеиспускании или изменение количества выделяемой мочи.
- Изменение частоты мочеиспусканий.
- Кровь в моче.
- Отек рук или ног.
- Неконтролируемые движения тела, судорожные движения, нарушение равновесия, трудности с глотанием или речью.
- Потеря контроля над движениями глаз.
- Ощущение ненормального сердцебиения.

Каковы некоторые другие побочные эффекты данного лекарственного препарата?

Любое лекарство может иметь побочные эффекты. Однако у многих людей побочные эффекты либо незначительные, либо вообще отсутствуют. Свяжитесь с лечащим врачом или обратитесь за медицинской помощью, если эти или любые другие побочные эффекты вас

беспокоят или не проходят:

- Чувство головокружения, сонливости, усталости или слабости.
- Нарушения сна.
- Тошнота или рвота.
- Головная боль.
- Запор.

Данный список возможных побочных эффектов не является исчерпывающим. Если у вас возникли вопросы касательно побочных эффектов, свяжитесь со своим врачом. Проконсультируйтесь с врачом относительно побочных эффектов.

Вы можете сообщить о развитии побочных эффектов в национальное управление здравоохранения.

Вы можете сообщить о побочных эффектах в FDA по номеру 1-800-332-1088. Вы также можете сообщить о побочных эффектах на сайте <https://www.fda.gov/medwatch>.

Как лучше всего принимать этот лекарственный препарат?

Применяйте данный препарат в соответствии с предписаниями врача. Прочтайте всю предоставленную Вам информацию. Строго следуйте всем инструкциям.

Таблетки:

- Принимайте этот препарат вместе с пищей или независимо от приема пищи.

Все жидкие препараты:

- Следует отмерять дозы жидкого препарата с осторожностью. Используйте дозатор, продающийся вместе с лекарством. Если дозатор не предусмотрен в упаковке, попросите у фармацевта

средство для дозирования этого препарата.

- Данный препарат нельзя отмерять обычной чайной или столовой ложкой. Это может привести к превышению дозы препарата.

Жидкость (сусpenзия):

- Хорошо взболтайте перед применением.
- Некоторые марки этого препарата можно применять в сочетании с зондами для энтерального питания. Если у вас есть зонд для энтерального питания, необходимо четко знать, можно ли использовать вашу марку препарата. Принимайте в соответствии с указаниями. Промойте зонд для энтерального питания после введения этого препарата.

Гранулы для перорального приема:

- Этот препарат вы можете положить непосредственно в рот. Гранулы растворятся во рту или вы можете сразу проглотить их. При необходимости этот препарат также можно смешивать с жидкостями или мягкими продуктами, такими как яблочное пюре, йогурт или пудинг. Добавьте содержимое 1 пакета в 1 столовую ложку (15 мл) жидкой или мягкой пищи. Если ваша доза превышает 1 пакет, дозу из каждого отдельного пакета смешивайте отдельно. Данный препарат необходимо принимать в течение 2 часов после смешивания.
- Этот препарат могут применять пациенты с питательными трубками. Применяйте в соответствии с указаниями. После применения данного препарата промойте питательную трубку.

Инфузия:

- Для введения в позвоночник.

Что делать в случае пропуска приема дозы лекарственного препарата?

Все пероральные препараты:

- Примите пропущенную дозу как только сможете.
- Если пришло время принять следующую дозу, не принимайте пропущенную дозу и затем вернитесь к обычному графику приема препарата.
- Не следует принимать одновременно 2 дозы или дополнительную дозу.

Инфузия:

- За дальнейшими указаниями обратитесь к врачу.

Как мне хранить и (или) выбросить этот лекарственный препарат?

Таблетки:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Если вы разделите таблетки, может потребоваться выбросить их через определенное время. Вы должны знать, как долго можно хранить разделенные таблетки. Если вы не уверены, позвоните фармацевту.

Жидкость (раствор):

- Препарат одних торговых марок следует хранить в холодильнике. Препарат других торговых марок подлежит хранению при комнатной температуре. Проконсультируйтесь с фармацевтом, как хранить этот препарат.
- Не замораживайте.
- Предохраняйте от света.

Жидкость (сuspензия):

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.
- Выбросьте неиспользованную порцию препарата через 2 месяца после вскрытия упаковки.

Гранулы для перорального приема:

- Хранить при комнатной температуре в сухом месте. Не хранить в ванной.

Инфузия:

- Если Вам необходимо хранить этот лекарственный препарат дома, узнайте условия его хранения у Вашего врача, медсестры или фармацевта.

Все формы выпуска:

- Храните все лекарственные препараты в безопасном месте. Храните все лекарственные препараты в месте, недоступном для детей и домашних животных.
- Утилизируйте неиспользованные лекарственные препараты или препараты с истекшим сроком годности. Не выливайте в туалет или канализацию без соответствующих указаний. Если у вас есть вопросы относительно утилизации лекарственных препаратов, проконсультируйтесь с фармацевтом. В вашем регионе могут действовать программы утилизации лекарственных препаратов.

Общие сведения о лекарственных препаратах

- Если состояние вашего здоровья не улучшается или даже ухудшается, обратитесь к врачу.
- Не следует давать кому-либо свое лекарство и принимать чужие лекарства.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие информационные листки для пациента. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.
- К некоторым лекарственным препаратам могут прилагаться другие

информационные листки для пациента. Уточните у фармацевта. Если у Вас есть вопросы, касающиеся данного лекарственного препарата, проконсультируйтесь с врачом, медсестрой, фармацевтом или другим работником здравоохранения.

- Если вы считаете, что произошла передозировка препарата, немедленно позвоните в токсикологический центр или обратитесь за медицинской помощью. Будьте готовы сообщить или показать, какой препарат вы приняли, в каком количестве и когда это произошло.

Использование информации потребителем и ограничение ответственности

Эта обобщенная информация включает краткие сведения о диагнозе, лечении и/или лекарственном препарате. Она не является всеобъемлющим источником данных и должна использоваться в качестве инструмента, помогающего пользователю понять и (или) оценить потенциальные варианты диагностики и лечения. Она НЕ включает в себя всю информацию о состояниях, методах лечения, лекарствах, побочных эффектах или рисках, которые могут относиться к конкретному пациенту. Она не должна считаться медицинской консультацией или заменой медицинской консультации, диагностики или лечения, предоставляемых врачом на основе врачебного обследования и оценки конкретных и уникальных обстоятельств пациента. Пациенты должны проконсультироваться с врачом для получения полной информации о своем здоровье, медицинских вопросах и вариантах лечения, включая любые риски или преимущества в отношении использования лекарств. Данная информация не является гарантией того, что вид лечения или лекарственный препарат безопасен, эффективен или одобрен для лечения конкретных пациентов. Предприятие UpToDate, Inc. и его дочерние предприятия отказываются от любых гарантий или обязательств, связанных с этой информацией или ее использованием. Использование этой информации регулируется Условиями использования, представленными на веб-странице <https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms>.

Дата последнего пересмотра

Авторское право

© UpToDate, Inc. и ее аффилированные компании и/или лицензиары, 2025.
Все права защищены.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Дополнительную информацию см. в нашей виртуальной библиотеке на сайте www.mskcc.org/pe.

Baclofen - Last updated on December 12, 2022

Все права защищены и принадлежат Memorial Sloan Kettering Cancer Center